

อะเวนาฟิล

ความแรง 50, 100 และ 200 มิลลิกรัม

ชนิดเม็ด

ชื่อการค้า Stendra® (สเดนดรา)

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้มีชื่อว่าอะเวนาฟิล (avanafil) เป็นยาในกลุ่มยับยั้งเอนไซม์พีดีอี 5

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ใช้รักษาอาการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศในชายอายุ 18 ปีขึ้นไป แพทย์พิจารณาแล้วว่าจำเป็นต้องใช้ยานี้

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- X** เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้
- X** กำลังใช้ยาในโตรกลีเซอริน ไอโซซอร์ไบด์โมโนไนเตรต หรือไอโซซอร์ไบด์ไดไนเตรต
- X** กำลังใช้ยาต้านเอชไอวี
- X** กำลังใช้ยาด้านเชื้อราบางชนิด เช่น คีโทโคนาโซล, อีทราโคนาโซล, วอริโคนาโซล หรือยาด้านแบคทีเรียบางชนิด เช่น คลาริโทรไมซิน หรือเทลิโทรไมซิน
- X** เป็นโรคหัวใจ เคยหัวใจวาย เส้นเลือดในสมองแตก หรืออุดตัน ความดันต่ำหรือสูงชนิดที่คุมอาการไม่ได้
- X** เป็นโรคตับ หรือโรคไต ขั้นรุนแรง
- X** เคยมีปัญหาสูญเสียการมองเห็น
- X** คนในครอบครัวมีประวัติเป็นโรคจอตตาผิดปกติ

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

- ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร** หากท่าน
 - เคยมีภาวะองคชาติแข็งตัวนานเกินกว่า 4 ชั่วโมง
 - เป็นโรคโลหิตจาง โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว หรือโรคกระดูกพรุน
 - มีภาวะเลือดออกผิดปกติ แผลในกระเพาะอาหาร
 - มีองคชาติโค้งงอผิดปกติหรือเกิดพังผืด
 - กำลังใช้ยาด้านเชื้อรา ยาด้านแบคทีเรีย ยารักษาความดัน หรือโรคเกี่ยวกับต่อมลูกหมาก ยารักษาโรคหัวใจ ยาแก้ปวด ยาที่ใช้รักษาอาการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศอื่นๆ สมุนไพร อาหารเสริมอื่นๆร่วมด้วย
- ไม่แนะนำให้ใช้** ถ้าอายุต่ำกว่า 18 ปี

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์ หรือเภสัชกร เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรคควรกินยาตอนท้องว่าง โดยกินยาก่อนมีเพศสัมพันธ์อย่างน้อย 15 ถึง 30 นาที
- ห้ามกินยานี้เกินวันละ 1 ครั้ง

3.2 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรง ให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- หากใช้ยาแล้วไม่ค่อยได้ผล หรือมีผลข้างเคียงจากยามากเกินไป ให้ไปพบแพทย์เพื่อปรับขนาดยา
- อย่าปรับขนาดยาเองโดยไม่ได้ปรึกษาแพทย์
- อย่าดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระหว่างใช้ยานี้
- อย่ากินยานี้ ถ้าดื่มน้ำเกรปฟรุตใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา
- ระมัดระวังการขับชียานพาหนะ การทำงานกับเครื่องจักรกล หรืองานที่เสี่ยงต่อการพลัดตกจากที่สูง **เพราะยานี้** อาจทำให้เวียนหัว หรือมองเห็นผิดปกติ

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่เกิดขึ้นแล้วต้องรีบไปพบแพทย์ทันที

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ
 - หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
 - ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีจ้ำเลือดตามผิวหนัง
 - องคชาติแข็งตัวนานเกินกว่า 4 ชั่วโมง
 - ตาพร่า การมองเห็นลดลง หรือสูญเสียการมองเห็น
 - สูญเสียการได้ยิน ได้ยินเสียงในหู
- “ให้หยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที”**

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ ออย.

- <http://www.fda.moph.go.th/sites/oss/Pages/Main.aspx>
- <http://ndi.fda.moph.go.th/>

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

5.2 อาการที่อาจเกิดขึ้นได้

- ปวดหัว หน้าแดง รู้สึกอ่อนวูบวาบ คัดจมูก
- เวียนหัว มึนงง ง่วงซึม
- ใจสั่น หัวใจเต้นผิดปกติ
- หอบเหนื่อย หายใจแรง และเร็ว
- คลื่นไส้ อาเจียน อาหารไม่ย่อย ไม่สบายท้อง
- ปวดหลัง ปวดกล้ามเนื้อ อ่อนเพลีย

“ไม่จำเป็นต้องหยุดยา

แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์”

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บไว้ในภาชนะบรรจุเดิมตามที่ได้รับมา
- ควรแกะยาเมื่อกินในแต่ละครั้งเท่านั้น ห้ามแกะยาออกจากแผงก่อน เพราะยาอาจเสียได้
- เก็บยาในที่แห้ง อย่านำให้โดนแสงโดยตรง ควรเก็บที่อุณหภูมิต่ำกว่า 30 องศาเซลเซียส ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

- ลักษณะของยา :** เม็ดยาวรี สีเหลืองอ่อน ด้านหนึ่งมีตัวเลข มี 3 ความแรง
 - ความแรง 50 มิลลิกรัม มีตัวเลข “50”
 - ความแรง 100 มิลลิกรัม มีตัวเลข “100”
 - ความแรง 200 มิลลิกรัม มีตัวเลข “200”
- ตัวยาสําคัญ :** อะเวนาฟิล
- ส่วนประกอบอื่นๆ :** ไตแค แมนนิทอล (mannitol), กรดฟูมาริก (fumaric acid), ไฮดรอกซีโพรพิลเซลลูโลส (hydroxypropylcellulose), โลว์ซับสตีติวเทด ไฮดรอกซีโพรพิลเซลลูโลส (low substituted hydroxypropyl cellulose), พรีซิพิตาเต็ด แคลเซียมคาร์บอเนต (precipitated calcium carbonate), แมกนีเซียมสเตียเรต (magnesium stearate), เยลโลเฟอริกออกไซด์ (yellow ferric oxide)

ผู้ผลิต ซาโนฟี วินโทรป อินดัสทรี, คาร์บอน บลังค์ ประเทศฝรั่งเศส และเมนาเรนี-วอน เฮเดน ลีเอ็มบีเอช, เดรสเดน, ประเทศเยอรมนี
ผู้นำเข้า บริษัท เอ.เมนาเรนี (ประเทศไทย) จำกัด กรุงเทพฯ
เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ 4 พฤศจิกายน 2563