

เด็กซ์เมเดโทมิดีนไฮโดรคลอไรด์
ความแรง 100 ไมโครกรัม ต่อ 1 มิลลิลิตร
สารละลายสำหรับหยดเข้าทาง
หลอดเลือดดำ
ชื่อการค้า Dexmedetomidine
B. Braun 100 mcg/ml
(เด็กซ์เมเดโทมิดีน บี. บราวน์ 100
ไมโครกรัม/มล.)

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

ยานี้มีชื่อว่าเด็กซ์เมเดโทมิดีนไฮโดรคลอไรด์ (dexmedetomidine hydrochloride) เป็นยาในกลุ่มยาระงับประสาท

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ใช้ทำให้ง่วงในผู้ป่วยวิกฤตผู้ใหญ่
- ใช้ระงับประสาทในการวินิจฉัยโรคหรือระหว่างผ่าตัด

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- ⊗ เคยแพ้ยานี้หรือส่วนประกอบของยานี้
- ⊗ มีอาการโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะหรือหัวใจเต้นช้า
- ⊗ ความดันโลหิตต่ำมากที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษา
- ⊗ เคยเป็นโรคหลอดเลือดสมองหรือภาวะอื่น ๆ ซึ่งมีผลต่อการส่งเลือดไปเลี้ยงสมอง

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

- ให้ปรึกษาแพทย์ในกรณีต่อไปนี้
 - เป็นโรคหัวใจ หัวใจเต้นช้าผิดปกติ
 - ความดันโลหิตต่ำ เป็นคนเลือดน้อย
 - มีความผิดปกติของระบบประสาท
 - มีความผิดปกติเกี่ยวกับตับ
 - เป็นผู้สูงอายุ สตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตร
 - เคยมีอาการไข้ขึ้นสูงหลังได้รับยาสลบ
 - กำลังใช้ยาอื่น ๆ อยู่ เช่น ยานอนหลับ/สลบ ยาแก้ปวด ยารักษาความดันหรือโรคหัวใจ

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

แพทย์หรือพยาบาลจะเป็นผู้ฉีดยานี้ให้ท่าน

3.2 ถ้าสงสัยว่าได้รับยาเกินขนาด ควรทำอย่างไร

หากสงสัยว่าได้รับยานี้เกินขนาดแล้วมีอาการความดันโลหิตเพิ่มขึ้นหรือลดลง หายใจช้าลงและรู้สึกง่วงซึม ให้รีบแจ้งแพทย์หรือพยาบาล

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- ผู้ติดตามควรดูแลให้ผู้ป่วยหลีกเลี่ยงการขับชี่ ยานพาหนะ การทำงานกับเครื่องจักรหรืองานที่เสี่ยงต่อการพลัดตกจากที่สูง เพราะยานี้อาจทำให้ง่วงซึม

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องแจ้งแพทย์ พยาบาล หรือ

เภสัชกรทันที

- ลมพิษ บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก หรือส่วนอื่น ๆ ของร่างกาย
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีจ้ำตามผิวหนังหรือเลือดออกผิปกติ
- ถ่ายปัสสาวะมาก และหิวน้ำมาก

5.2 อาการที่อาจเกิดได้และให้รอดอาการ

แต่ถ้ามีอาการรุนแรง ให้แจ้งแพทย์ พยาบาล หรือเภสัชกร

- หัวใจเต้นช้าหรือเร็ว
- ความดันโลหิตเพิ่มขึ้นหรือลดลง
- เจ็บหน้าอก
- คลื่นไส้ อาเจียน หรือปากแห้ง
- กระสับกระส่าย
- อุณหภูมิร่างกายสูง

“ให้รอดอาการ แต่ถ้ามีอาการรุนแรง ให้แจ้งแพทย์ พยาบาล หรือเภสัชกร”

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

ยานี้เก็บไว้ที่โรงพยาบาล ท่านจะไม่ได้รับกลับบ้าน

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

- **ลักษณะยา:** นํ้ายาปราศจากเชื้อสำหรับฉีดใส ไม่มีสี
- **ตัวยาสําคัญ:** เด็กซ์เมเดโทมิดีนไฮโดรคลอไรด์ 100 ไมโครกรัม ต่อ 1 มิลลิลิตร
- **ส่วนประกอบอื่น ๆ:** โซเดียมคลอไรด์ และ นํ้าสำหรับยาฉีด

ผู้ผลิต:

บริษัท บี. บราวน์ เมดิคอล เอสเอ ประเทศสเปน

ผู้นำส่ง:

บริษัท บี. บราวน์ (ประเทศไทย) จำกัด กรุงเทพฯ ประเทศไทย

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งครั้งล่าสุดเมื่อ:
เมษายน 2566

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของอย.

- <http://www.fda.moph.go.th/sites/oss/Pages/Main.aspx>
- <http://ndi.fda.moph.go.th/>

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร