

เพอร์ทูซูแมบ และ ทราสทูซูแมบ

ความแรง 1200 มิลลิกรัม+600 มิลลิกรัม ใน 15 มิลลิลิตร
หรือ 600 มิลลิกรัม+600 มิลลิกรัม ใน 10 มิลลิลิตร

ชนิดสารละลายสำหรับฉีดเข้าใต้ผิวหนัง

ชื่อการค้า Phesgo (เฟสโก)

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

ยานี้มีชื่อว่าเพอร์ทูซูแมบ ผสมกับ ทราสทูซูแมบ

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

ยานี้ใช้เพื่อรักษามะเร็งเต้านมซึ่งมีเฮอรัททูเป็นบวก (Her2-positive) ในระยะแรกและระยะแพร่กระจายโดยใช้ร่วมกับยาเคมีบำบัดอื่นตามที่แพทย์เห็นสมควร

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

x เคยแพ้ยานี้, เอ็นไซม์ไฮยาลูโรนเดส หรือ ส่วนประกอบอื่นๆ ของยานี้

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

ให้ปรึกษาแพทย์ หรือ เภสัชกร ในกรณีต่อไปนี้

- หัวใจห้องล่างซ้ายทำงานผิดปกติ
- ตั้งครรภ์ หรือวางแผนจะตั้งครรภ์
- กำลังให้น้ำนมลูก หรือมีแผนจะให้น้ำนมลูก
- โรคตับ
- โรคระบบประสาท
- กำลังรักษาอาการติดเชื้อใดๆ อยู่

“หากเข้าข่ายกรณีเหล่านี้ให้ปรึกษาแพทย์ หรือ เภสัชกร”

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์ เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค
- แพทย์จะให้ยานี้โดยการฉีดเข้าใต้ผิวหนัง
- ท่านจะได้รับยานี้ทุกๆ 3 สัปดาห์ ตามแพทย์สั่ง

3.2 หากลืมไปฉีดยา ควรทำอย่างไร

- หากท่านลืมนัด ให้ท่านติดต่อแพทย์โดยด่วนเพื่อปรับตารางการให้ยาใหม่

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- พบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตามผลการรักษาหรืออันตรายจากยา
- ผู้ป่วยหญิงให้คุมกำเนิดตลอดเวลาที่ได้รับยานี้และต่อไปอีกอย่างน้อย 7 เดือน หลังจากหยุดยา
- หยุดให้นมลูกระหว่างได้รับยานี้และต่อไปอีกอย่างน้อย 7 เดือน หลังจากหยุดยา

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องแจ้งแพทย์หรือรีบไปพบแพทย์ทันที

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีจ้ำตามผิวหนังหรือเลือดออกผิปกติ
- ตัวเหลืองตาเหลือง คลื่นไส้อาเจียนรุนแรง เจ็บชายโครงขวา เชื่องซึม บัสสาวะสีเข้ม(สีชา) เลือดออกง่ายกว่าปกติ หิวบ่อยลง
- ท้องเสียรุนแรง ถ่ายเหลว ถ่ายบ่อย ถ่ายปนเลือด อุจจาระมีสีดำหรือเหนียว ปวดท้องรุนแรง
- หัวใจเต้นช้าหรือเร็วกว่าปกติ หัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะ ไอ หายใจสั้น ขาหรือแขนบวมเนื่องจากมีน้ำคั่ง
- ไข้ สั่น ปวดหัว อยากรักษาอาหารลดลง ปวดบริเวณข้อและกล้ามเนื้อ ร้อนวูบวาบ

- ภาวะที่เกิดจากการสลายตัวของก้อนเนื้อ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อไต อาจพบอาการต่างๆ ได้แก่ อ่อนเพลีย หายใจสั้น เมื่อยล้า มึนงง
- ภาวะที่เกิดจากการสลายตัวของก้อนเนื้อ ซึ่งอาจทำให้เกิดลมชัก อาจพบอาการต่างๆ ได้แก่ อาเจียน ขาหรือเสียวที่บริเวณปาก มือ หรือเท้า
- อักเสบที่บริเวณทางเดินอาหาร
- เลือดกำเดาไหล

“หากมีอาการเหล่านี้ให้รีบไปพบแพทย์ทันที”

5.2 อาการที่อาจเกิดขึ้นได้ แต่ถ้ามมีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์ทันที

- ผมร่วง
 - ผื่น
 - กล้ามเนื้ออ่อนแรง
 - ท้องผูก
 - การรับรสน้อยลง หรือเปลี่ยนแปลงไป
 - นอนหลับยาก
 - แสบร้อนกลางอก
 - ผิวแห้ง คันหรือเป็นสิ่ว
 - ปวด แดง ข้ำบริเวณที่ฉีด
 - เล็บเปลี่ยนสี
 - เจ็บคอ คอแดง น้ำมูกไหล มีอาการคล้ายเป็นหวัดและมีไข้
 - มีน้ำตาลปริมาณมากขึ้น
 - ปวดที่บริเวณร่างกาย แขน ขา และท้อง
- “ให้รอดูอาการ แต่ถ้ามารุนแรงให้ไปพบแพทย์”

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- โดยทั่วไปยานี้เก็บไว้ที่โรงพยาบาล ท่านจะไม่ได้รับกลับบ้าน
- อย่าให้โดนแสงโดยตรง โดยทั่วไปควรเก็บที่อุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- ห้ามแช่แข็ง ห้ามเขย่า

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

- ลักษณะ: สารละลายปราศจากเชื้อสำหรับฉีดใส ไม่มีสีถึงสีน้ำตาลอ่อน บรรจุในขวดแก้วใส มี 2 ความแรง ได้แก่
 - 1) ขนาดบรรจุ 15 มิลลิลิตร (ฉลากสีเขียว) มีตัวยาสำคัญ เพอร์ทูลูแอมบ 1200 มิลลิกรัม ผสมกับ ทราสทูซูแอมบ 600 มิลลิกรัม
 - 2) ขนาดบรรจุ 10 มิลลิลิตร (ฉลากสีเหลือง) มีตัวยาสำคัญเพอร์ทูลูแอมบ 600 มิลลิกรัม ผสมกับ ทราสทูซูแอมบ 600 มิลลิกรัม
- ส่วนประกอบอื่นๆ ได้แก่ เอ็นไซม์ไฮยาลูโรนิเดส แอล-ฮีสทีดิน ฮีสทีดินไฮโดรคลอไรด์ แอลฟา-แอลฟาเทรฮาโลสไดไฮเดรท ซูโครส โพลีซอร์เบท 20 แอล-เมไธโอนีน และน้ำปราศจากเชื้อสำหรับฉีด

ผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่าย:

ผลิตโดย บริษัท เอฟ ฮอฟมันน์ – ลา โรช จำกัด
สวิสเซอร์แลนด์

ผู้นำเข้า บริษัท โรช ไทยแลนด์ จำกัด กรุงเทพฯ

ผู้แทนจำหน่าย บริษัท ดีเคเอสเอช จำกัด กรุงเทพฯ

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ พฤษภาคม 2563

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.

- <http://www.fda.moph.go.th/sites/oss/Pages/Main.aspx>
- <http://ndi.fda.moph.go.th/>

**เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร**

ใขยานี้ภายใต้การควบคุมของแพทย์เท่านั้น
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในเอกสารกำกับยา