

โคลทาร์แชมพู 20% TA-TAR Shampoo (ทา-ทาร์ แชมพู)

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อสามัญว่าอะไร

- ยานี้มีชื่อว่า โคลทาร์ (coal tar topical solution) มีตัวยา 0.2 กรัมต่อมิลลิลิตร เป็นยาในกลุ่มน้ำมันดิน รักษาโรคผิวหนัง

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- เพื่อรักษาโรคสะเก็ดเงินบนหนังศีรษะ

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- หากเป็นโรคสะเก็ดเงินระยะเฉียบพลัน มีอาการปวด มีตุ่มหนองหรือภาวะติดเชื้อที่หนังศีรษะ
- เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

- ระวังแชมพูเข้าตา จมูกและปาก
- หากอาการของโรคไม่ดีขึ้นภายใน 4 สัปดาห์ หรืออาการของหนังศีรษะแย่ลง หยุดใช้ยานี้แล้วไปพบแพทย์ เภสัชกรหรือพยาบาล

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น เนื่องจากขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค
- ใช้ ทา-ทาร์ แชมพู แทนแชมพูปกติทุกวัน เมื่ออาการดีขึ้นให้ลดเหลือ 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์ หลังจากนั้นอาจใช้เป็นครั้งคราว

วิธีใช้ทา-ทาร์ แชมพู

- วดน้ส้สะอาดบริเวณศีรษะเพื่อทำให้งน้ส้สะอาดเปียก
- ชโลม ทา-ทาร์ แชมพู บริเวณหนังศีรษะที่มีอาการ
- ใช้ปลายนิ้วนวดศีรษะให้ทั่วจนเกิดฟอง
- ทิ้งไว้ 2-3 นาที
- ใช้มือถูฟองส่วนเกินออกให้ได้มากที่สุด
- ล้างออกด้วยน้ำสะอาด
- เริ่มต้นชโลม ทา-ทาร์ แชมพู ใหม่อีกครั้งหากจำเป็น
- ทำผมให้แห้งตามปกติ

3.2 หากลืมใช้ยา ควรทำอย่างไร

- ใช้ ทา-ทาร์ แชมพู ตามปกติ ไม่ต้องเพิ่มขนาดยาเป็น 2 เท่า

3.3 ถ้าใช้ยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ล้างออกด้วยน้ำสะอาดและใช้ยานี้ต่อตามปกติ
- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรง เช่น อาการระคายเคืองมากผิดปกติ ให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- พบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตามผลการรักษาหรืออันตรายจากยา
- **ข้อควรปฏิบัติเมื่อ ทา-ทาร์ แชมพู เข้าตา**
 - ล้างออกด้วยน้ำสะอาดปริมาณมาก
 - กรณีเข้าตาข้างเดียว ให้ระวังเข้าตาอีกข้างหนึ่งขณะล้างออก
 - หากอาการระคายเคืองไม่ดีขึ้นควรรีบไปพบแพทย์

**เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร**

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ ออย.
<http://www.fda.moph.go.th/sites/oss/Pages/Main.aspx> หรือ <http://ndi.fda.moph.go.th/>

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

- ลมพิษ บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีจ้ำตามผิวหนังหรือเลือดออกผิดปกติ

“ให้หยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที”

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่มีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์ทันที

- ระคายเคือง
- ผื่นหรือตุ่มที่มีลักษณะคล้ายสิ่ว
- ผิวหนังไวต่อแสง

**“ไม่จำเป็นต้องหยุดยา
แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์”**

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บยาไว้ในภาชนะบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อบอุ่นโดยตรง โดยทั่วไปควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส
- ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องนำห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก
- ปิดฝาให้สนิทหลังจากเปิดใช้

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

ลักษณะยา : ของเหลวสีน้ำตาลอมเหลือง มีกลิ่นเฉพาะ

ตัวยาสำคัญ : โคลทาร์ (coal tar topical solution)

ส่วนประกอบ : กรดซาลิไซลิก โซเดียมลอริลซัลเฟต เมทิลเซลลูโลส กลีเซอริน โพลีเอทิลีนไกลคอล โคคาไมด์ ไดเอทาโนลาไมด์ โพลีซอร์เบต 20 ซอร์บิแทนลอเรต และน้ำบริสุทธิ์

ผู้ผลิต : องค์การเภสัชกรรม 75/1 ถนนพระรามที่ 6
ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 ประเทศไทย
เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ : 1 มีนาคม พ.ศ.
2565