

คานากลิโฟลซิน
100 และ 300 มิลลิกรัม
ชนิดเม็ดเคลือบฟิล์ม
ชื่อการค้า Invokana® (อินโนคานา)

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้ชื่อว่า คา-นา-กลี-โฟล-ซิน (canagliflozin)

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- รักษาโรคเบาหวานประเภทที่ 2

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้

2.2 เพื่อความปลอดภัย ให้ออกแพทย์หากท่านมี ภาวะต่อไปนี้

- ใช้ยา สมุนไพร อาหารเสริมอื่นอยู่
- เป็นเบาหวานประเภทที่ 1
- โรคไตหรือมีปัญหากเกี่ยวกับไต หรือต้องฟอกไต
- ดื่บมีปัญหาหรือทำงานผิดปกติอย่างรุนแรง
- โรคหัวใจหรือโรคหลอดเลือดสมอง
- ตั้งครรภ์หรือกำลังให้นมทารก
- เคยได้รับการรักษาโดยการตัดเท้าหรือตัดนิ้วเท้า
- เคยเกิดภาวะ "เลือดเป็นกรดจากคีโตนจากโรคเบาหวาน" โดยมีอาการ กินและหิวบ่อย กระหายน้ำ น้ำหนักลดรวดเร็วไม่ทราบสาเหตุ หายใจหอบลึก ได้กลิ่นหวานผิดปกติเวลาหายใจ ปากและลิ้นได้รสโลหะหรือหวานผิดปกติ

"สอบถามแพทย์หรือเภสัชกร

ถ้าไม่แน่ใจว่ามีภาวะดังกล่าวหรือไม่"

3. วิธีใช้ยา

3.1 กินยานี้อย่างไร

- กินยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกร หรือตามฉลากยาที่ได้รับจากโรงพยาบาล

3.2 หากลืมกินยาควรทำอย่างไร

- กินยาที่ลืมทันทีที่นึกขึ้นได้ แต่หากใกล้เวลาที่ต้องกินอีกครั้งไม่ต้องกินยาที่ลืม แล้วกินต่อไปตามปกติ
- ห้ามกินยาเพิ่มเพื่อชดเชย เพราะยาอาจเกินขนาด

3.3 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด และรีบไปโรงพยาบาลพร้อมยานี้หรือภาชนะบรรจุทันทีหากมีอาการผิดปกติ

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยานี้

- ไม่นำยานี้ให้ผู้อื่นกิน ถึงแม้ว่าจะมีอาการหรือโรคเช่นเดียวกัน
- ไม่หยุดยาหรือปรับขนาดยาเอง ควรกินยานี้อย่างต่อเนื่องตามคำแนะนำของแพทย์ หรือเภสัชกร เพื่อผลการรักษาที่ดี
- กินยาทุกวัน ในเวลาเดิมหรือใกล้เคียง จะช่วยให้ไม่ลืมกินยาได้
- พบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตามผลการรักษาหรือผลจากการใช้ยา
- คุมกำเนิดหรือหลีกเลี่ยงการตั้งครรภ์ ระหว่างการใช้ยานี้ เพราะยาอาจส่งผลเสียต่อทารกหากตั้งครรภ์
- ตรวจติดตามเท้าอย่างสม่ำเสมอ เพราะมีรายงานการศึกษาว่าการใช้ยานี้อาจเพิ่มความเสี่ยงในการรักษาโดยการตัดเท้า หรือนิ้วเท้าได้
- คุมอาหารและออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ เพื่อผลการรักษาและสุขภาพของท่าน

**เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร**

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีไข้
- กินและหิวบ่อย กระหายน้ำ น้ำหนักลดรวดเร็วไม่ทราบสาเหตุ หายใจหอบลึก ได้กลิ่นหวานผิดปกติเวลาหายใจ ปากและลิ้นได้รสโลหะหรือหวานผิดปกติ ซึ่งเป็นอาการของภาวะ "เลือดเป็นกรดจากคีโตนจากโรคเบาหวาน"

"มีอาการดังกล่าว ให้หยุดยาและไปพบแพทย์"

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์ทันที

- คันที่ช่องคลอด ตกขาวมีกลิ่นหรือสีผิดปกติ หรือมีผื่นแดงที่อวัยวะเพศชาย
- บัสสาวะมากหรือบ่อยผิดปกติ บัสสาวะแสบขัด ปวดเวลาบัสสาวะ หรือบัสสาวะไม่สุด
- ท้องผูก คลื่นไส้

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บไว้ในภาชนะบรรจุเดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อบอุ่นโดยแสงโดยตรง ควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส ไม่ควรเก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

นำเข้าโดยบริษัท แจนเซน-ซีแลก จำกัด
106 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ถนนฉลองกรุง แขวง
ลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520
โทรศัพท์: 02-792-7200 โทรสาร: 02-792-7222
เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ 20 ธันวาคม 2561
"โปรดอ่านเอกสารกำกับยาสำหรับแพทย์ฉบับเต็มได้ทาง
เว็บไซต์ <http://ndi.fda.moph.go.th/>"