

ดีออกซีลามีน 10 มิลลิกรัม และ ไพริดอกซิน 10 มิลลิกรัม ชนิดเม็ดเคลือบแตกตัวที่ละลาย ของการค้า Diclegis® (ได-คลี-จิส)

1. ยานี้คืออะไร

1.1. ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้เป็นยาสูตรผสม มีตัวยา ดีออก-ซี-ลา-มิน (suxylamine) 10 มิลลิกรัม และ ไพ-ริ-ด็อก-ซิน (pyridoxine) 10 มิลลิกรัม

1.2. ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ใช้เพื่อรักษาอาการคลื่นไส้ อาเจียน ในหญิงตั้งครรภ์ที่ใช้วิธีอื่นไม่ได้ผล เช่น การปรับเปลี่ยนอาหาร เป็นต้น

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1. ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้ หรือยาอื่นในกลุ่มยาแก้แพ้ เช่น ไดเฟนไฮดรามีน ไดเมนไฮดริเนต เป็นต้น
- กำลังใช้ยาต้านซึมเศร้าในกลุ่มยายับยั้งโมโนเอมีนออกซิเดส (MAOIs) เช่น ยาเซเลกิลีน ฟิเนลซีน ราชากิลีน หรือยาฆ่าเชื้อ ไลเนโซลิด เป็นต้น

2.2. ข้อควรระวัง เพื่อความปลอดภัย ให้ออกแพทย์ เมื่อท่านมีภาวะต่อไปนี้

- โรคหอบหืด
- ความดันในลูกตาสองหรือต้อหิน
- แผลในกระเพาะอาหารหรือลำไส้อุดตัน
- กระเพาะปัสสาวะอุดตัน
- ผู้ที่มีอายุน้อยกว่า 18 ปี
- เคยแพ้ส่วนประกอบของสารย้อมสีเม็ดยา
- กำลังอยู่ระหว่างให้นมบุตร
- กำลังใช้ยา สมุนไพร หรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เพราะอาจส่งผลต่อการรักษาหรือเกิดอันตรายได้

**“สอบถามแพทย์หรือเภสัชกร
หากท่านไม่แน่ใจว่ามีภาวะดังกล่าวหรือไม่”**

3. วิธีใช้ยา

3.1. ขนาดและวิธีใช้

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น เพราะขนาดยาและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นอยู่กับชนิดและความรุนแรงของโรค
- ให้กินยานี้ตอนท้องว่าง และดื่มน้ำตาม
- กลืนยาทั้งเม็ด ห้ามหัก แบ่ง บด เคี้ยว เม็ดยา
- ห้ามกินยานี้เกิน 4 เม็ดต่อวัน

3.2. ถ้าลืมกินยาควรทำอย่างไร

- กินยาทันทีที่นึกขึ้นได้ แต่ถ้าใกล้เวลาของมื้อต่อไปให้รอ กินยาของมื้อต่อไป ห้ามกินยาเพิ่มเป็น 2 เท่า

3.3. ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรง เช่น กระสับกระส่าย รมานตาขยาย หัวใจเต้นเร็ว เป็นต้น ให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- พบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตามผลการรักษาหรืออันตรายจากยา
- ไม่ควรหยุดยาเองโดยไม่ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร เพราะอาจทำให้อาการคลื่นไส้ อาเจียน กลับมาได้
- หลีกเลี่ยงการขับรถ การทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร หลังจากใช้ยานี้ เนื่องจากยานี้อาจทำให้ง่วงซึมได้
- ห้ามดื่มแอลกอฮอล์หรือใช้ยาที่มีผลต่อการทำงานของระบบประสาทระหว่างที่ใช้ยานี้ เนื่องจากจะทำให้ง่วงซึมมากกว่าปกติได้
- ยานี้มีส่วนประกอบของวิตามินบี 6 หากจะกินวิตามินบี เสริม ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อน

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1. อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

- ลมพิษ บวมที่ใบหน้า เปลือกตาริมฝีปาก
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก หรือมีจ้ำตามผิวหนัง
- สับสน หัวใจเต้นเร็ว ชัก

“ให้หยุดยา แล้วรีบไปพบแพทย์ทันที”

**เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร**

5.2. อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการ รุนแรงให้ไปพบแพทย์

- ง่วงซึม อ่อนเพลีย
- ปากแห้ง
- มึนงง ตามัว
- ปัสสาวะขัด

**“ไม่จำเป็นต้องหยุดยา
แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์”**

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บยาไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อบอุ่นโดยตรง โดยทั่วไปควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยา

- ลักษณะยา** เม็ดกลมเคลือบฟิล์มสีขาว ด้านหนึ่งมีรูปผู้หญิงตั้งครรภ์สีชมพู
- ตัวยาสาคัญ** คือ ดีออกซีลามีนซัคซิเนต และไพริดอกซินไฮโดรคลอไรด์ (วิตามินบี 6)
- ส่วนประกอบอื่น** ได้แก่ ไนโคคริสตัลลีนเซลลูโลส, แมกนีเซียมไตรซิลิเกต, ครอสคาเมลโลสโซเดียม, แมกนีเซียมสเตียเรต, ซิลิกาคอลลอยด์แอนไฮดรัส, ไฮโปรมेलโลส(อี 464), แม็คโครกอล(400) (อี1521), แม็คโครกอล(8000), เมทาคริลิกเอไซด์-เอทิลอะครีเลทโคโพลิเมอร์ (1:1), ทาลคัม, โซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนต, โซเดียมลอริลซัลเฟต, ไตรเอทิลซิเตรต, โพลีดีเมทิลไซโลเซน, โพลีเอทิลีนไกลคอลซอลบีแทนไตรสเตียเรต, ซิลิกาเจล, เมทิลเซลลูโลส, ไดเมทิลไซโลเซนไฮดรอกซิลเทอร์มินเทต, กลีเซอรอล 14-18 โมโนแอนดไรด์, ซัลฟิวริกเอไซด์, ซอบิกเอไซด์, เบนโซอิกเอไซด์, ไททาเนียมไดออกไซด์ (อี171), โพลีซอเบท80 (อี433), คานูนาแว็กซ์, เซลแล็ก (อี904), อัลลูราเรอเอซีอะลูมิเนียมเลด (อี129), โพรพิลีนไกลคอล (อี1520), อินดิโกคาร์มินอะลูมิเนียมเลด (อี132), เอ็นบีวีทิลแอลกอฮอล์, แอมโมเนียมไฮดรอกไซด์, ไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์, ไซเมทโคน

ผู้ผลิต Duchesnay Inc., Blainville, QC ประเทศแคนาดา
ผู้นำเข้าบริษัท เอ็กเซลทิส (ประเทศไทย) จำกัด กรุงเทพฯ
เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ 7 มีนาคม 2566

ศึกษาข้อมูลยาเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.
<http://www.fda.moph.go.th/sites/oss/Pages/Main.aspx>
<http://ndi.fda.moph.go.th/>

Science Package Leaflet - Thai
คำเตือนตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข

1. ยานี้ทำให้วงซึม จึงไม่ควรขับขียานยนต์ หรือทำงานเกี่ยวกับ เครื่องจักรกล หรือทำงานที่เสี่ยงต่อการพลัดตกจากที่สูง
2. ไม่ควรรับประทานร่วมกับสุรา หรือสิ่งที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบ
3. ห้ามใช้ในเด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี ผู้ที่กำลังมีอาการหอบหืด โรคต่อหิน ต่อมลูกหมากโตหรือปัสสาวะขัด นอกจากแพทย์สั่ง
4. ระวังการใช้ยานี้ในสตรีมีครรภ์ระยะ 3 เดือนแรกและสตรีที่ให้นมบุตร
5. ยานี้ทำให้ปากแห้ง ปัสสาวะขัด เสมหะเหนียวข้น ตาพร่า วิงเวียน สับสน และเม็ดเลือดผิดปกติได้
6. เด็กและผู้สูงอายุ จะไวต่อยานี้มากขึ้น ทำให้วงนอน วิงเวียน ประสาทหลอน ปากแห้ง ปัสสาวะคั่ง ความดันโลหิตต่ำ หงุดหงิด นอนไม่หลับและบางรายอาจมีอาการชักได้ (paradoxical reaction)
7. ระวังการใช้ยานี้ร่วมกับยาที่มีฤทธิ์กดระบบประสาทส่วนกลาง เช่น ยากลุ่ม Benzodiazepines ยาที่มีฤทธิ์แอนติโคลิเนอร์จิกและยาด้านอาการซึมเศร้าชนิดต่างๆ
8. ระวังการใช้ยานี้ในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด ต่อมไทรอยด์ทำงานมากกว่าปกติ ผู้ที่มีประวัติโรคหอบหืด โรคถุงลมโป่งพอง