

คาลแฟคแทนต์
ความแรง 35 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร
ชนิดสารละลายแขวนตะกอนสำหรับให้
ทางหลอดเลือด
Infasurf (อินฟาเซิร์ฟ)

1. ยานี้คืออะไร

- 1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร**
- ยานี้มีชื่อว่า อินฟาเซิร์ฟ (Infasurf) มีตัวยา คาลแฟคแทนต์ 35 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร
- 1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร**
- ยานี้ใช้ป้องกันและรักษาภาวะการหายใจลำบากในทารกที่คลอดก่อนกำหนด

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

- 2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร**
- เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้
- 2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้**
- ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร ในกรณีต่อไปนี้
 - อาการเขียวคล้ำเนื่องจากขาดออกซิเจน
 - การหายใจติดขัด
 - ภาวะหัวใจเต้นช้า
 - การไหลย้อนของตัวยาคเข้าสู่ท่อช่วยหายใจ
 - การหลุดออกของท่อช่วยหายใจ
 - ภาวะที่มีการหายใจผิดปกติ

3. วิธีใช้ยา

- 3.1 ขนาดและวิธีใช้**
- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค
 - ขนาดการให้ยาอินฟาเซิร์ฟแต่ละครั้ง คือ 3 มล./กก. ของน้ำหนักแรกเกิด ให้ยาอินฟาเซิร์ฟทุกๆ 12 ชั่วโมง จำนวน รวมไม่เกิน 3 ครั้ง

- ขนาดยา ความถี่ และความจำเป็นที่จะต้องได้รับยาเพิ่มขึ้นต้องอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์เท่านั้น

- 3.2 หากลืมบริหาร ยาควรทำอย่างไร**
- ต้องรีบแจ้งให้แพทย์ให้ทราบ
- 3.3 ถ้าบริหาร ยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร**
- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรงเช่น ทารกอาการเขียวคล้ำ การหายใจติดขัด ภาวะหัวใจเต้นช้า ให้รีบแจ้งแพทย์หรือพยาบาลทันที

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- ควรมีการติดตามผู้ป่วยระหว่างใช้ยาอย่างใกล้ชิด

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

- 5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที**
- ลมพิษ บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก
 - หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
 - ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีจ้ำตามผิวหนังหรือเลือดออกผิดปกติ
 - อาการเขียวคล้ำเนื่องจากขาดออกซิเจน การหายใจติดขัด ภาวะหัวใจเต้นช้า การไหลย้อนของตัวยาคเข้าสู่ท่อช่วยหายใจ
- “ให้หยุดยาแล้วรีบรายงานแพทย์ทันที”**

- 5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์**
-

“ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์”

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อย่านำให้โดนแสงโดยตรง เก็บรักษาอินฟาเซิร์ฟ (คาลแฟคแทนต์)

สารละลายแขวนตะกอนสำหรับให้ทางหลอดเลือดไว้ในตู้เย็นที่อุณหภูมิ 2 ถึง 8 องศาเซลเซียส

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

- ลักษณะยา** สารละลายแขวนตะกอนสีขาวขุ่น บรรจุในขวดแก้วใสในขนาด 3 มิลลิลิตร และ 6 มิลลิลิตร
- ตัวยาสำคัญ** คาลแฟคแทนต์ 35 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร
- ส่วนประกอบอื่น ๆ** ได้แก่ 0.9% Normal Saline (น้ำเกลือ 0.9%), Sterile water for injection (น้ำกลั่นปราศจากเชื้อสำหรับฉีด) และ Nitrogen (ก๊าซไนโตรเจน)

ผู้ผลิต ONY Biotech Inc.
ผู้นำเข้า บริษัท แปซิฟิก เฮลท์แคร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
ผู้แทนจำหน่าย บริษัท แปซิฟิก เฮลท์แคร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ กรกฎาคม 2563

ศึกษาข้อมูลยาเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.

- <http://www.fda.moph.go.th/sites/oss/Pages/Main.aspx>
- <http://ndi.fda.moph.go.th/>
-