

พิเพอราซิลลิน/ทาโซแบ็กแอม 4 กรัม/0.5 กรัม ชนิดฉีด

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อสามัญว่าอะไร

- ยานี้มีชื่อสามัญว่าพิเพอราซิลลินโซเดียม/ทาโซแบ็กแอมโซเดียม (piperacillin sodium/tazobactam sodium) เป็นยาปฏิชีวนะในกลุ่มเพนิซิลลินผสมกับยาต้านเอนไซม์เบตาแล็กทามเอสที่เชื่อมแบคทีเรียปล่อยออกมาลายยาพิเพอราซิลลิน

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ยานี้ใช้เพื่อรักษาโรคติดเชื้อแบคทีเรียแบบรุนแรงที่ไวต่อยานี้ ได้แก่
 - ติดเชื้อภายในช่องท้อง เช่น ไส้ติ่งอักเสบ เยื่อช่องท้องอักเสบ
 - ติดเชื้อในท่อทางเดินน้ำดี
 - ปอดอักเสบจากการติดเชื้อ
 - ติดเชื้อที่ผิวหนัง
 - ติดเชื้อในเลือด
 - ติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ
 - มีไข้และตรวจพบเม็ดเลือดขาวชนิดนิวโทรฟิลต่ำ

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้ หรือยาอื่นในกลุ่มเพนิซิลลิน กลุ่มเซฟาโลสปอริน หรือยาอื่นในกลุ่มเบตาแล็กแอม

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

- แจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกร ทราบหากท่านมีภาวะต่อไปนี้
 - มีประวัติการแพ้ยาหลายชนิด
 - มีอาการผื่นแดง ระบายเคืองหรือบวม
 - ท้องร่วง
 - โรคไตบกพร่อง หรือกำลังฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
 - ระดับโพแทสเซียมในเลือดต่ำ
 - ต้องจำกัดเกลือโซเดียม
 - เป็นโรคซิสติกไฟโบรซิสซึ่งเป็นโรคทางกรรมพันธุ์ชนิดหนึ่ง

ไม่ควรใช้ยานี้ร่วมกับยา อาหาร สมุนไพร หรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบางชนิด เพราะอาจมีผลต่อการรักษาหรือเกิดอันตรายได้ เช่น

- ยาคลายกล้ามเนื้อบางชนิด เช่น เวคูโรเนียม
- ยาต้านการแข็งตัวของเลือด เช่น วอร์ฟารินโซเดียม
- ยาเมโทเทริกเซตซึ่งใช้รักษามะเร็ง โรคข้อ และเรื้อนกวาง
- ยาโพรบะเนซิดซึ่งใช้รักษาโรคเก๊าต์
- ยาด้านเชื้อแบคทีเรียอื่นบางชนิด เช่น แวนโคไมซิน ยาเทระไซคลิน

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกร เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค
- ยานี้ใช้สำหรับหยดเข้าสู่หลอดเลือดดำภายใต้การดูแลของแพทย์หรือพยาบาล

3.2 ถ้าฉีดยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- หากมีอาการผิดปกติ เช่น ชัก หรือสงสัยว่าได้รับยานี้เกินขนาด ให้แจ้งแพทย์ทันที

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- ให้รับยานี้ติดต่อกันทุกวันจนครบตามคำแนะนำของแพทย์ หรือเภสัชกร แม้อาการจะดีขึ้นแล้วก็ตาม

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องแจ้งแพทย์เพื่อหยุดยาหรือหากเกิดอาการหลังจากออกจากโรงพยาบาลต้องรีบไปพบแพทย์

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลิ้นบวม
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีจุดตามผิวหนังหรือเลือดออกผิดปกติ
- ตาเหลือง ตัวเหลือง
- ท้องร่วงรุนแรง ร่วมกับมีไข้ หรืออ่อนเพลีย
- ปัสสาวะมีสีแดง หรือน้ำตาล
- เลือดกำเดาไหล มีรอยฟกช้ำ
- ชัก

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้แจ้งแพทย์หรือหากเกิดอาการหลังจากออกจากโรงพยาบาลให้ไปพบแพทย์ทันที

- ปวดศีรษะ นอนไม่หลับ
- เยื่อช่องปากอักเสบ
- คลื่นไส้ อาเจียน ท้องผูก อาหารไม่ย่อย ปวดท้อง
- ความดันเลือดต่ำ
- ปวด บวม หลอดเลือดดำอักเสบบริเวณที่ฉีดยา
- ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ปวดข้อ

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บยาในที่แห้ง อย่านำให้โดนแสงโดยตรง โดยทั่วไปควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส
- ห้ามเก็บยาในช่องแช่แข็ง
- ยานี้จะเก็บไว้ที่โรงพยาบาล ท่านจะไม่ได้รับกลับบ้าน

ผู้ผลิต

บริษัท สยามเภสัช จำกัด
123 ซอยโชคชัยร่วมมิตร ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ประเทศไทย และเลขที่ 9 ซอยโชคชัยร่วมมิตร 3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 ประเทศไทย

ผู้แทนจำหน่าย

บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด
171/1-2 ซอยโชคชัยร่วมมิตร ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ประเทศไทย
โทร. 02-6259999

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ (ว/ด/ป) ที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

**เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร**