

แคปซีทาบิน
ความแรง 500 มิลลิกรัม
ชนิดเม็ดเคลือบฟิล์ม
ชื่อการค้า Capecitabine Teva
(แคปซีทาบิน เทวา)

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- แคปซีทาบิน (capecitabine) เป็นยาหยุดการเจริญการเติบโตของเซลล์มะเร็ง

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ใช้รักษามะเร็งลำไส้ใหญ่ มะเร็งลำไส้ใหญ่ส่วนปลาย มะเร็งกระเพาะอาหาร หรือมะเร็งเต้านม และใช้ป้องกันการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่ซ้ำอีกหลังจากตัดก้อนมะเร็งออกแล้ว

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบอื่นๆ ในยานี้
- เคยแพ้ยากลุ่มฟลูโอโรไพริมิดีนอย่างรุนแรง (กลุ่มยาที่รักษามะเร็ง เช่น ฟลูโอโรยูราซิล)
- กำลังตั้งครรภ์ หรือกำลังให้นมลูก
- ระดับเม็ดเลือดขาวต่ำ หรือเกล็ดเลือดต่ำมาก
- มีปัญหาตับ หรือไตอย่างรุนแรง
- มีภาวะขาดเอนไซม์ ดีพีดี

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

- แจ้งแพทย์หากมีปัญหาตับ หรือ ไต
- แจ้งแพทย์หากมีหรือเคยมีปัญหาหัวใจ
- แจ้งแพทย์หากมีโรคทางสมอง ทางระบบประสาท หรือทางตา
- แจ้งแพทย์หากเป็นโรคเบาหวาน
- แจ้งแพทย์หากมีอาการคลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสียอย่างรุนแรง

- แจ้งแพทย์หากกำลังใช้ยานี้ร่วมกับยารักษาโรคเกาต์ ได้แก่ อัลโลพูรินอล ยาละลายลิ่มเลือด เช่น วอร์ฟาริน ยาแก้อักเสบ เช่น เฟนิโทอิน หรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร หรือสมุนไพรบางชนิด

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ควรใช้ยาตามขนาดและวิธีใช้ตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค
- กินยานี้วันละ 2 ครั้ง หลังอาหารไม่เกิน 30 นาที เช้าและเย็น

3.2 หากลืมกินยา ควรทำอย่างไร

- ให้รอกินยาของมื้อต่อไป และห้ามกินยาเพิ่มเป็น 2 เท่า

3.3 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้ติดต่อแพทย์โดยเร็วที่สุดก่อนทานยามื้อต่อไป โดยท่านอาจมีอาการผิดปกติที่รุนแรง เช่น ท้องร่วง แผลในปาก ปวดท้อง

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- ห้ามหยุดยาเอง และให้กินยานี้อย่างต่อเนื่องตามคำแนะนำของแพทย์ หรือเภสัชกร
- คุมกำเนิด เพราะยาอาจเป็นอันตรายต่อเด็กในครรภ์
- พบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตามผลการรักษา หรืออันตรายจากยา
- ระวังการขับขี่ยานยนต์ หรือทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกล หรือทำงานที่เสี่ยงต่อการพลัดตกจากที่สูง เพราะยาอาจทำให้ง่วง และอ่อนเพลีย

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ
- หนาวมีด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผื่นหนังหลุดลอก มีจุดตามผิวหนังหรือเลือดออก ผิดปกติ
- ท้องร่วงมากกว่า 4 ครั้ง หรือท้องร่วงตอนกลางคืน
- อาเจียนมากกว่า 1 ครั้งใน 24 ชั่วโมง
- เมื่ออาหารจมนกินได้น้อยกว่าปกติ ตัวเหลือง ตาเหลือง
- เจ็บ บวม แดง มีแผลที่ปาก

- ใช้สูง หนาวสั่น รู้สึกเหนื่อย ปวดท้อง
- ปวด บวม แดง รู้สึกชา ที่มือหรือเท้า
- เจ็บหน้าอก หัวใจเต้นผิดปกติ
- เดินเซ

“ให้หยุดยา แล้วรีบไปพบแพทย์ทันที”

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์ทันที

- ปวดท้อง
- อ่อนเพลีย
- คัน ผื่นที่ผิวหนัง

“ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงควรไปพบแพทย์”

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บยาไว้ในภาชนะบรรจุเดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อบอุ่นแสงโดยตรง โดยทั่วไปสามารถเก็บที่อุณหภูมิเกิน 30 องศาเซลเซียสได้ไม่เกิน 3 เดือน ไม่เก็บยาในตู้ร้อนหรือขึ้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

ลักษณะยา ยาเม็ดรูปยาว ปลายมนทั้งสองข้าง เคลือบฟิล์มสีส้ม ออกชมพู ด้านหนึ่งมีตัวเลข “500” อีกด้านหนึ่งเรียบ ส่วนประกอบของยานี้ คือ ครอบสารเมลโลส ไฮเดียม, ไมโครคริสตัลลิน เซลลูโลส, ไฮโพรเมลโลส, ซิลิกา คอลลอยด์คอลลแอนไฮดรัส, แมกนีเซียมสเตียเรท, โทเทเนียม ไดออกไซด์, แมโครกอล 400, เรด ไอรอน ออกไซด์, เยลโล ไอรอน ออกไซด์

ผู้ผลิต Remedica Ltd., Limas, Cyprus

นำเข้าโดย บริษัท สยามการแพทย์ จำกัด กรุงเทพฯ ประเทศไทย เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ กรกฎาคม 2562

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
 หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร