

ดาซาทีนิบ
ความแรง 20, 50, 70 และ 140 มิลลิกรัม
ชนิดเม็ดเคลือบฟิล์ม
ชื่อการค้า Dasatinib Scigen
(ดาซาทีนิบ ไซเจน)

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้มีชื่อว่า ดาซาทีนิบ (Dasatinib)

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

ยานี้ใช้เพื่อรักษาโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวซึ่งแพทย์ตรวจแล้วว่าต้องใช้ยานี้

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

X ห้ามใช้ในผู้ที่แพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้

X ห้ามใช้ในเด็กอายุน้อยกว่า 1 ปี

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

- ให้ปรึกษาแพทย์ หรือเภสัชกรในกรณีต่อไปนี้
 - กำลังใช้ยาป้องกันการเกิดลิ่มเลือด
 - เคยเป็น หรือกำลังเป็นโรคตับ
 - เคยเป็น หรือกำลังเป็นโรคหัวใจ
 - เคยเป็น หรือกำลังติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี
 - กำลังตั้งท้อง หรือวางแผนที่จะมีลูก
 - กำลังให้นมลูก
 - ใช้ยา สมุนไพร หรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอื่นอยู่

สอบถามแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยานี้
หากไม่แน่ใจว่ามีอาการดังกล่าวหรือไม่

คำเตือน: ยานี้อาจทำให้เกิดอันตรายร้ายแรงได้
ต้องใช้ภายใต้การควบคุมของแพทย์เท่านั้น

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือ เภสัชกร เท่านั้น เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค
- กินยานี้ก่อนหรือหลังอาหารก็ได้
- กินยาเวลาเดียวกันทุกวัน
- กลืนยาทั้งเม็ด ห้ามบด ดัด หรือเคี้ยวยา

3.2 หากลืมนกินยาควรทำอย่างไร

ให้รอกินยาเวลาเดิมในวันถัดไป ห้ามกินยาเพิ่มเป็น 2 เท่า

3.3 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้รีบไปพบแพทย์ทันที

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- พบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตามผลการรักษาหรืออันตรายจากยา
- ห้ามหยุดยาเอง และให้กินยานี้อย่างต่อเนื่องตามคำแนะนำของแพทย์ หรือเภสัชกร
- อย่ากินยาลดกรด 2 ชั่วโมงก่อน หรือ 2 ชั่วโมงหลังกินยานี้
- อย่ากินเกรปฟรุตหรือน้ำเกรปฟรุตระหว่างที่ใช้ยานี้ เพราะอาจเกิดอันตรายเพิ่มขึ้นจากยาได้
- ผู้หญิงวัยเจริญพันธุ์และผู้ชายที่ได้รับยานี้ต้องคุมกำเนิดด้วยวิธีที่มีประสิทธิภาพตลอดระยะเวลาการรักษา
- ผู้หญิงที่กำลังให้นมลูก ต้องงดให้นมลูกตลอดระยะเวลาการรักษา
- ระมัดระวังการขับชี่ยานยนต์ หรือทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกล หรือการทำงานที่เสี่ยงต่อการพลัดตกจากที่สูงเพราะยานี้อาจทำให้เวียนหัว ตาพร่าได้

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

- ลมพิษ บวมที่ใบหน้า เปลือกตาริมฝีปาก
- หนาวมีด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีจ้ำตามผิวหนังหรือเลือดออกผิดปกติ
- เจ็บหน้าอก ใจสั่น ไอ
- อาเจียนเป็นเลือด อุจจาระเป็นเลือด ปัสสาวะเป็นเลือด อุจจาระสีดำ
- ใช้ หนาวสั่นรุนแรง เจ็บปากหรือคอ

“ให้หยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที”

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์

- ท้องเสีย คลื่นไส้ อาเจียน
- ปวดหัว รู้สึกเหนื่อยหรืออ่อนแรง
- ปวดกล้ามเนื้อ ปวดท้อง
- เริ่ม งูสวัด หรืออีสุกอีใส
- การรับรสเปลี่ยนไป มีแผลในปาก ท้องอืด ท้องผูก
- น้ำหนักเพิ่มขึ้น หรือลดลง
- ค้นผิวหนัง ผิวแห้ง สีผิว ผื่น ผื่นแดง ผื่นคัน ผื่นแพ้

“ไม่จำเป็นต้องหยุดยา
แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์”

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อย่าให้โดนแสงโดยตรง โดยทั่วไป ควรเก็บที่อุณหภูมิต่ำกว่า 30 องศาเซลเซียส ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

• ลักษณะยา มี 4 ความแรง ได้แก่

ความแรง 20 มิลลิกรัม ยาเม็ดเคลือบฟิล์ม รูปกลม นูนทั้งสองด้าน สีขาวถึงขาวนวล มีข้อความ D7SB บนด้านหนึ่ง และมีตัวเลข 20 บนอีกด้านหนึ่ง

ความแรง 50 มิลลิกรัม ยาเม็ดเคลือบฟิล์ม รูปรี นูนทั้งสองด้าน สีขาวถึงขาวนวล มีข้อความ D7SB บนด้านหนึ่ง และมีตัวเลข 50 บนอีกด้านหนึ่ง

ความแรง 70 มิลลิกรัม ยาเม็ดเคลือบฟิล์ม รูปกลม นูนทั้งสองด้าน สีขาวถึงขาวนวล มีข้อความ D7SB บนด้านหนึ่ง และมีตัวเลข 70 บนอีกด้านหนึ่ง

ความแรง 140 มิลลิกรัม ยาเม็ดเคลือบฟิล์ม รูปกลม นูนทั้งสองด้าน สีขาวถึงขาวนวล มีข้อความ D7SB บนด้านหนึ่ง และมีตัวเลข 140 บนอีกด้านหนึ่ง

• ดัวยาสำคัญ ดาชาทินิบ

• ส่วนประกอบอื่นๆ ได้แก่

แลคโตส โมโนไฮเดรต, ไมโครคริสตัลลีน เซลลูโลส, ไฮดรอกซีโพรพิล เซลลูโลส, คרוสคาลเมลโลส โซเดียม, แมกนีเซียม สเตียเรต, โอฟราดรายไวท์

ผู้ผลิต ชินรอน อีสเพนเนีย เอสแอล, ประเทศสเปน

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ 2 กรกฎาคม 2567

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.

- <http://www.fda.moph.go.th/sites/oss/Pages/Main.aspx>
- <http://ndi.fda.moph.go.th/>

**เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร**