

น้ำยาสกัดจาก
Dermatophagoides farinae
ความแรง**10,000 AU/ml**
ชนิดสารละลายสำหรับฉีด
AllerVAC HDM-Df
)อัลเลอร์เว็กซ์ เอชดีเอ็ม-ดีเอฟ(

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้มีชื่อว่า *Dermatophagoides farinae* Allergen Extract มีด้วยยา 10,000AU/ml

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

เป็นวัคซีนเพื่อรักษาโรคภูมิแพ้ สำหรับผู้ป่วยโรคภูมิแพ้ทางระบบหายใจ ได้แก่ โรคจมูกอักเสบภูมิแพ้ โรคหืดภูมิแพ้ และผู้ป่วยโรคตาอักเสบภูมิแพ้ที่มักพบร่วมกับโรคจมูกอักเสบภูมิแพ้ ซึ่งมีประวัติอาการและผลการทดสอบภูมิแพ้แสดงว่าแพ้ไรฝุ่น

2. ข้อควรรู้ก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ส่วนประกอบอื่นๆของยานี้ ที่ไม่ใช่ตัวยาสัญญาตามทีระบุในหัวข้อที่ 7

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

- ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร ในกรณีต่อไปนี้
 - เมื่อดังครรภ์ หรือวางแผนจะตั้งครรภ์
 - ผู้ป่วยที่ได้รับยา Beta-blocker เช่น ยา Atenolol ที่ใช้สำหรับรักษาโรคความดันโลหิตสูง หรือโรคหัวใจ
 - ผู้ป่วยที่มีประวัติเป็นโรคหัวใจหรือหลอดเลือด โรคความดันเลือดสูงที่ยังควบคุมไม่ได้ โรคปอด

หรือหลอดลม (วัดอัตราการไหลของอากาศหายใจออกที่สูงที่สุด(PEFR) ได้น้อยกว่า 70%) และโรคหืดที่มีอาการรุนแรงและยังไม่สามารถควบคุมให้คงที่ได้ด้วยยา ซึ่งอาจเป็นอันตรายหากเกิดปฏิกิริยาภูมิแพ้ทั่วร่างกายอย่างรุนแรง

- ผู้ป่วยเด็กอายุน้อยกว่า 5 ปี และ ผู้ป่วยสูงอายุ
- ผู้ป่วยที่เป็นโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง (immunodeficiency) และภูมิคุ้มกันตนเอง (autoimmune diseases)

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- **ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือ เภสัชกร** เท่านั้น เนื่องจากขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค
- **การใช้ยาจะกระทำภายใต้การดูแลของแพทย์** เท่านั้น ซึ่งมีการเตรียมอุปกรณ์ช่วยชีวิต ในกรณีที่เกิดปฏิกิริยาภูมิแพ้ขึ้น
- การใช้ยานี้ แพทย์ผู้ทำการใช้ฉีดเข้าในผิวหนังหรือใต้ผิวหนัง บริเวณแขน โดยการรักษา แบ่งเป็น 2 ระยะ
 1. ระยะกระตุ้นการสร้างภูมิคุ้มกัน: ฉีดสัปดาห์ละ 1-3 ครั้ง โดยขนาดและความเข้มข้นของน้ำยาสกัดสารก่อภูมิแพ้ที่ฉีดจะเพิ่มขึ้นจนถึงความเข้มข้นถึงระดับ Maintenance
 2. ระยะควบคุมอาการ: ฉีดทุก 2-4 สัปดาห์ โดยขนาดและความเข้มข้นของน้ำยาสกัดสารก่อภูมิแพ้จะคงที่ในขนาดที่ให้ผลในการรักษา ระยะเวลาในการรักษา 3-5 ปี

3.2 ถ้าฉีดยานี้เกินขนาดที่แนะนำควรทำอย่างไร

- หากผู้ป่วยได้รับวัคซีนโรคภูมิแพ้เกินขนาด อาจเกิดปฏิกิริยาทั่วร่างกาย (systemic reaction)

ซึ่งหากเกิดปฏิกิริยาแพ้ทั่วร่างกาย ต้องได้รับการรักษาโดยฉีด Epinephrine ควรอยู่ในความดูแลของแพทย์ในที่มีความพร้อมในการดูแล

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- การฉีดวัคซีนโรคภูมิแพ้ ควรทำในสถานที่ที่มีความพร้อมที่จะให้การวินิจฉัยและให้การรักษาปฏิกิริยาภูมิแพ้ทั่วร่างกายที่อาจเกิดขึ้น โดยมีแพทย์และบุคลากรที่ได้รับการฝึกอบรมที่จะให้การวินิจฉัยและรักษาได้อย่างทันท่วงที และผู้ป่วยควรอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างน้อย 30 นาทีหลังการฉีด

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วแจ้งแพทย์ทันที

- ลมพิษบวมที่ใบหน้าเปลือกตาริมฝีปาก
 - หน้ามืดเป็นลม แน่นหน้าอกหายใจลำบาก
 - ผื่นแดงตุ่มพองผิวหนังหลุดลอก มีจ้ำตามผิวหนังหรือเลือดออกผิวดก
 - ภาวะหัวใจเสียจังหวะ, หหมดสติ, ช็อก
- หากมีอาการเหล่านี้“
ให้แจ้งแพทย์ พยาบาล หรือเภสัชกรทันที”**

5.2 อาการที่อาจเกิดได้และให้รอดูอาการ แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้แจ้งแพทย์หรือพยาบาล

- การเกิดปฏิกิริยาเฉพาะที่ (local reaction) ได้แก่ บวมแดง คันบริเวณที่ฉีด

“ให้รอดูอาการ แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้แจ้งแพทย์ พยาบาล หรือเภสัชกร”

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อย่าให้โดนแสงโดยตรง โดยทั่วไป ควรเก็บที่อุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก
- เก็บยานี้ไว้ในตู้เย็น ห้ามแช่แข็ง
- ยานี้เก็บไว้ที่โรงพยาบาล ท่านจะไม่ได้รับกลับบ้าน

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ 5 กุมภาพันธ์ 2562

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

น้ำยาปราศจากเชื้อ ใส ไม่มีสีจนถึงสีเหลืองอ่อน

บรรจุในขวดแก้ว ขวดละ 5 มิลลิลิตร

ส่วนประกอบสำคัญคือ

Dermatophagoides farinae Allergen Extract

10,000 AU/ml

ส่วนประกอบอื่นๆในตำรับได้แก่

Sodium chloride

Dibasic sodium phosphate

Monobasic potassium phosphate

Phenol

Glycerin

Water for injection

ผู้ผลิต: บริษัท โรงงานเภสัชกรรมเกร็ดเดอร์ฟาร์ม่า จำกัด

เลขที่ 55/2, หมู่ที่ 11/551 ถนนบางเตย-วัดสุวรรณ

ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

โทร .0-28868190-9