

กาบาเพนติน 600 มิลลิกรัม ชนิดเม็ด

ชื่อการค้า Berlontin (เบอร์ลอนติน)

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อสามัญว่าอะไร

- ยานี้มีชื่อว่า กาบาเพนติน (gabapentin) อยู่ใน
กลุ่มยากันชัก

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ใช้ร่วมกับยาอื่นในการรักษาอาการ
- เพื่อบรรเทาอาการปวดปลายประสาท

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

- แจ้งแพทย์ก่อนใช้ยาในกรณีต่อไปนี้เพราะอาจ
ทำให้โรครุนแรงขึ้นหรือเกิดอันตรายจากยานี้
มากขึ้น เช่น
 - เป็นโรคไตหรืออยู่ระหว่างการฟอกไต
 - มีประวัติเป็นโรคซึมเศร้าหรือเคยมีอาการ
ผิดปกติทางจิต
 - ปวดกล้ามเนื้อ
 - อ่อนเพลีย
 - ปวดท้องตลอดเวลา
- แจ้งแพทย์หากกำลังตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร
- ไม่ควรใช้ยานี้ร่วมกับยาลดกรด ยาคุมกำเนิดชนิด
รับประทาน มอร์ฟิน เพราะอาจมีผลต่อการรักษา
หรือเกิดอันตรายได้

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือ
เภสัชกรอย่างเคร่งครัด เพราะขนาดและ
ระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นกับชนิดและความรุนแรง
ของโรค
- กลืนยาทั้งเม็ดโดยกินพร้อมอาหารหรือไม่ก็ได้

3.2 หากลืมกินยาควรทำอย่างไร

- ให้กินยาทันทีที่นึกได้ แต่ถ้าใกล้เวลาของมื้อต่อไป
ให้รอกินยาของมื้อต่อไป และห้ามกินยาเพิ่มเป็น 2
เท่า

3.3 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติ
ที่รุนแรงให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- ระวังการขับขี่ยานยนต์หรือทำงานเกี่ยวกับ
เครื่องจักรกล หรือทำงานที่เสี่ยงต่อการพลัดตก
จากที่สูง
- ห้ามหยุดยาเอง และให้กินยานี้อย่างต่อเนื่องตาม
คำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกร
- พบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตาม
ผลการรักษาหรืออันตรายจากยา เพราะยานี้อาจ
เพิ่มอาการซึมเศร้าและทำให้มีความคิดที่จะฆ่าตัว
ตาย ให้ปรึกษาแพทย์ทันทีเมื่อเริ่มมีความรู้สึก
ซึมเศร้าหรืออยากทำร้ายตัวเอง

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีจ้ำตามผิวหนัง
หรือเลือดออกผิดปกติ
- ปัสสาวะผิดปกติ เช่น ปัสสาวะบ่อย ปัสสาวะมีเลือด
- คลื่นอุจจาระไม่อยู่ เลือดออกทางกัน อาเจียนเป็น
เลือด
- ตอม่น้ำเหลืองบริเวณคอ รักแร้ ขาหนีบบวม
- การเคลื่อนไหวผิดปกติ น้ำหนักเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
- อารมณ์ผิดปกติ ทำร้ายร่างกายตนเอง ซึมเศร้า
"หากมีอาการข้างต้นหรืออาการผิดปกติอื่นๆ
ที่รุนแรงให้รีบไปพบแพทย์ทันที"

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการ รุนแรงให้ไปพบแพทย์ทันที

- มึนงง ง่วงนอน อ่อนล้า
- บวมที่แขน ขา

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บไว้ในภาชนะบรรจุเดิมตามที่ได้รับมา
- แกะออกจากแผงเมื่อกินในแต่ละครั้งเท่านั้น
- เก็บยาในที่แห้ง อย่าให้โดนแสงโดยตรง
โดยทั่วไปควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศา
เซลเซียส ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ
ห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

ยาเบอร์ลอนทิน 600 เป็นยาเม็ดรูปยาวรี นูนทั้งสองด้าน เคลือบฟิล์มสีขาว มีขีดแบ่งครึ่งทั้งสองด้าน ด้านหนึ่ง มีอักษร "BT" และ "6" อยู่คนละด้านของขีดแบ่งครึ่ง

ส่วนประกอบ

แต่ละเม็ด ประกอบด้วยตัวยาเพนดิน 600

มิลลิกรัม

ส่วนประกอบอื่นๆ ได้แก่ mannitol, hydroxypropyl cellulose-L, poloxamer 407, magnesium stearate, purified water และ opadry II white

ผู้ผลิต บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี จำกัด
เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ 7 มีนาคม 2562

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร