

ลินาไลโดไมด์

ความแรง 5, 10, 15, และ 25 มิลลิกรัม
ชนิดแคปซูล
ชื่อการค้า **Lenalidomide Alvogen**
(ลินาไลโดไมด์ อัลโวเจน)

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อสามัญว่าอะไร

ยานี้มีชื่อว่า ลินาไลโดไมด์ (Lenalidomide) มี 4 ความแรง ได้แก่ 5, 10, 15 และ 25 มิลลิกรัม

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

ใช้เมื่อแพทย์ตรวจแล้วว่าต้องใช้นานี้ เพื่อรักษา

- โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดมัลติเพิลไมอีโลมา
 - โรคไขกระดูกเสื่อม
 - โรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิดเซลล์แมนเทิล
 - โรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิดพอลิคลูลาร์
- “ซึ่งแพทย์ตรวจแล้วว่าต้องใช้นานี้”

2. ข้อควรระวังก่อนใช้นานี้

2.1 ห้ามใช้นานี้เมื่อไร

- ⊗ ห้ามใช้ในผู้ที่แพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้
- ⊗ ห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์หรือวางแผนที่จะมีลูก เพราะทำให้เกิดอันตรายร้ายแรงต่อทารก
- ⊗ ห้ามใช้ในผู้ป่วยหญิงวัยเจริญพันธุ์ที่ไม่ได้คุมกำเนิด

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้นานี้

แจ้งแพทย์ หรือเภสัชกรก่อนใช้นานี้ หากท่าน

- เป็นผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวี ผู้ป่วยที่เคยติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี ผู้ป่วยงูสวัด
- เป็นผู้สูงอายุมากกว่า 85 ปี หรือมีอายุน้อยกว่า 18 ปี
- เป็นผู้ป่วยที่เคยเป็นโรคล้มเลือดอุดตัน
- เป็นผู้ที่มีน้ำหนักตัวลดลง (แลคโทส) เนื่องจากตัวยามีส่วนผสมของแลคโทส
- เป็นผู้ป่วยโรคตับ ผู้ป่วยโรคไต
- เป็นต่อกระดูก

“ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้นานี้”

3. วิธีใช้นานี้

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้นานี้ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค
- กินยาให้ตรงเวลา
- ห้ามเคี้ยว แกะ บด แคปซูล

3.2 หากลืมกินยาควรทำอย่างไร

- ถ้าลืมกินยาน้อยกว่า 12 ชั่วโมง ให้กินยาทันทีที่นึกได้
- ถ้าลืมกินยามากกว่า 12 ชั่วโมง ให้รอกินยาของมื้อต่อไป และห้ามกินยาเพิ่มเป็น 2 เท่า

3.3 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้ปรึกษาแพทย์

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้นานี้

- พบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตามผลการรักษา หรืออันตรายจากยา
- ผู้ชายต้องใส่ถุงยางทุกครั้งเมื่อมีเพศสัมพันธ์ในระหว่างได้รับยานี้ และคุมต่อไปอีก 7 วันหลังหยุดยา เพราะอาจมีตัวยาปนไปกับอสุจิ และทำอันตรายต่อทารกได้
- ผู้หญิงต้องตรวจการตั้งครรภ์ และคุมกำเนิด ก่อนได้รับยา 4 อาทิตย์ ในระหว่างได้รับยา และคุมต่อไปหลังหยุดยาอีก 4 อาทิตย์ เพราะอาจทำให้เกิดอันตรายร้ายแรงต่อทารก
- หากประจำเดือนผิดปกติ หรือประจำเดือนขาดต้องตรวจการตั้งครรภ์และปรึกษาแพทย์
- หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่
- ระมัดระวังการขับขี่ยานยนต์ หรือการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกล หรือการทำงานที่เสี่ยงต่อการพลัดตกจากที่สูง เพราะยานี้อาจทำให้อ่อนเพลีย เวียนหัว ง่วงซึม และตาพร่า
- ระมัดระวังในหญิงให้นมลูก เนื่องจากยาอาจผ่านน้ำนมสู่เด็กและเกิดอันตรายได้
- งดการบริจาดเลือดในระหว่างใช้นานี้ และงดต่อไปอีก 7 วันหลังหยุดยา

**เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร**

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

- ลมพิษ บวมที่ใบหน้า เปลือกตาริมฝีปาก
 - หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
 - ผื่นแดง ตุ่มพอง ผื่นหนังหลุดลอก มีจ้ำเลือดตามผิวหนัง
 - มีไข้หนาวสั่น เจ็บคอ ไอ มีแผลในปาก ติดเชื้อ
 - มีอาการเห็นบข่า เจ็บตามมือและเท้า
 - บัสสาวะไม่ออก น้ำหนักขึ้น ตัวบวม แขน ขาบวม
 - แน่นหน้าอก เจ็บหน้าอก ปวดขาารุนแรง ขาบวมแดง
 - ปวดหน้าอกลามมาที่แขน คอ กราม หลัง หรือท้อง
 - มีเหงื่อออกมากผิดปกติ รู้สึกไม่สบาย อาเจียน
 - มองเห็นไม่ชัด พุดลำบาก เดินเซ ปวดหัวรุนแรง
 - ปวดกระดูก กล้ามเนื้ออ่อนแรง รู้สึกสับสน
 - ใจสั่น ชัก
 - ตัวเหลือง ตาเหลือง บัสสาวะสีเข้ม
- “ให้หยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที”**

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องไปพบแพทย์ แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์

- ผื่นแดง ปากแห้ง คอแห้ง
 - คลื่นไส้ อาเจียน ปวดมวนท้อง ท้องร่วง ท้องผูก ท้องอืด
 - ง่วงซึม วิงเวียน นอนไม่หลับ อ่อนเพลีย
 - เบื่ออาหาร การรับรสผิดปกติ น้ำหนักลด
 - ผื่นสีม่วง ขาที่ผิวหนัง
 - ซึมเศร้า อารมณ์เปลี่ยนแปลง
 - เจ็บข้อ หลัง หรือกล้ามเนื้อ
- “ไม่จำเป็นต้องหยุดยา
แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์”**

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บไว้ในภาชนะบรรจุเดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อบอุ่นโดยแสงโดยตรง โดยทั่วไปควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

คำเตือน : ยานี้อาจทำให้เกิดอันตรายร้ายแรงได้
ต้องใช้ภายใต้การควบคุมของแพทย์เท่านั้น

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

ลักษณะยา

แคปซูลสีเขียว-น้ำตาลอ่อน มีตัวยา 5 มิลลิกรัม

แคปซูลสีเหลือง-เทา มีตัวยา 10 มิลลิกรัม

แคปซูลสีน้ำตาล-เทา มีตัวยา 15 มิลลิกรัม

แคปซูลสีขาว มีตัวยา 25 มิลลิกรัม

ตัวยาสำคัญ ลินาโลโดไมด์

ส่วนประกอบอื่นๆ ได้แก่

แลคโทส ไมโครคริสตัลลีนเซลลูโลส

โครสคาร์เมลโลสโซเดียม แมกนีเซียมสเตียเรต

ผู้ผลิต Lotus Pharmaceutical Co., Ltd.

30 Chenggong 1st rd., Sinsing Village,

Nantou City, Nantou Country 540, Taiwan

ผู้นำเข้า/ผู้แทนจำหน่าย

บริษัท อีลโวเจน (ประเทศไทย) จำกัด

1126/2 อาคารวานิช 2 ชั้น 15 ห้องเลขที่ 1501-1502

ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ 6 มีนาคม 2563