

เพมีเทรกเซด
ความแรง 100 และ 500 มิลลิกรัม
ชนิดผงยาเพื่อเตรียมเป็น
สารละลายเข้มข้นสำหรับ
ให้ทางหลอดเลือดดำแบบหยด
ชื่อการค้า Pexarite (เพ็กซาไรท์)

1. ยานี้คือยาอะไร

1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้มีชื่อว่า เพมีเทรกเซด (pemetrexed) เป็นยารักษาโรคมะเร็ง

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ยานี้ใช้เพื่อรักษาโรคมะเร็งเยื่อหุ้มปอด หลังแพทย์ตรวจรักษาแล้วเห็นว่าต้องให้ยานี้
- ยานี้ใช้รักษาโรคมะเร็งปอดชนิดไม่ใช้เซลล์เล็ก หลังแพทย์ตรวจรักษาแล้วเห็นว่าต้องให้ยานี้

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เมื่อได้รับหรือกำลังจะได้รับวัคซีนป้องกันโรคไขเหลือง
- เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้ หรือยาในกลุ่มกรดโฟลิก
- เมื่ออยู่ในระยะให้นมลูก เพราะทำให้เกิดอันตรายร้ายแรงต่อเด็ก

2.2 ข้อควรระวังเมื่อให้ยานี้

- ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร หากท่านมีภาวะต่อไปนี้
 - มีภาวะโรคตับ ไต หัวใจ หรือ น้ำท่วมปอด
 - กำลังหรืออยู่ระหว่างการฉายรังสี
 - กำลังกินหรือฉีดยาแก้ปวด อักเสบ หรือฉีดวัคซีน
 - ผู้หญิงที่วางแผนมีลูกหรือกำลังตั้งท้อง
 - ผู้ชายที่ต้องการมีลูก เพราะยาอาจทำให้มีลูกยาก

3. วิธีการใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกร เพราะขนาดและระยะเวลาในการให้ยานี้ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค
- บุคลากรทางการแพทย์จะเป็นผู้เตรียมยาและให้ยากับท่าน โดยการหยดยาเข้าทางหลอดเลือดดำ

- บุคลากรทางการแพทย์จะเป็นผู้เตรียมยาและให้ยากับท่าน โดยการหยดยาเข้าทางหลอดเลือดดำ

3.2 หากลืมมาฉีดยา ควรทำอย่างไร

- ปรึกษาแพทย์ หรือเภสัชกร

3.3 หากฉีดยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรง เช่น มีไข้ ท้องเสีย มีแผลในปาก เลือดออกและหยุดยาก อาการคันหรือตุ่มพอง หายใจลำบาก เจ็บหน้าอก ให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- **พบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตามผลการรักษาหรืออันตรายจากยา**
- แจ้งแพทย์ เภสัชกร หรือพยาบาลว่ากำลังให้ยานี้
- ระหว่างใช้ยานี้ ผู้หญิงต้องคุมกำเนิดและหยุดให้นมลูก
- ระมัดระวังการขับขี้นานยนต์หรือทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกลหรือทำงานที่เสี่ยงต่อการพลัดตกจากที่สูง
- ห้ามฉีดวัคซีนป้องกันไขเหลือง กรณีจำเป็นต้องฉีดวัคซีน ให้ใช้วัคซีนชนิดเชื้อตาย

5. อันตรายจากยา

5.1 อาการที่ต้องแจ้งแพทย์ พยาบาล หรือเภสัชกรทันที

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ
 - หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก ไอแบบมีเสมหะเป็นเลือด
 - ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีจ้ำตามผิวหนังหรือเลือดออกผิดปกติ
 - มีไข้สูงกว่า 38 องศาเซลเซียส เหงื่อออก หนาวสั่น
 - มีอาการเลือดออกจากระลอก ปาก จมูก บัสสาวะสีแดงหรือชมพู
 - หยุดหายใจชั่วคราว เจ็บหน้าอก
 - รู้สึกอ่อนล้า หน้าซีด
- “หากมีอาการเหล่านี้ ให้แจ้งแพทย์ พยาบาล หรือเภสัชกรทันที”**

5.2 อาการที่อาจเกิดขึ้นได้และให้รอดูอาการ แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้แจ้งแพทย์ เภสัชกร หรือพยาบาล

- คลื่นไส้ อาเจียน คออักเสบ ท้องร่วง ท้องผูก ปวดท้อง อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร
 - ผม่ว้ง การปรับรสเปลี่ยนไป
- “หากมีอาการรุนแรงหรือทนไม่ได้ ให้ไปพบแพทย์”**

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- ยานี้เก็บไว้ที่โรงพยาบาล ท่านจะไม่ได้รับกลับบ้าน

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยา

- เพ็กซาไรท์ เป็นผงยาสีขาวถึงเหลืองอ่อนหรือสีเหลืองออกเขียว บรรจุในขวดแก้วใส สำหรับเตรียมเป็นสารละลายและเจือจางเพื่อหยดเข้าหลอดเลือดดำ
- เพ็กซาไรท์ ประกอบด้วย ตัวยาสำคัญเพมีเทรกเซด
- ส่วนประกอบอื่น ๆ ได้แก่ แมนนิทอล โซโดรคลอริก แอซิด และ โซเดียมไฮดรอกไซด์

ผู้ผลิต: Eugia Pharma Specialities Limited, Survey No. 550, 551 & 552, Kolthur Village, Shameerpet Mandal, Medchal-Malkajgiri District, Telangana, India.

ผู้นำเข้า/ผู้แทนจำหน่าย: บริษัท เอพีแอล ฟาร์มา ไทย เลขที่ 438 ซอยพัฒนาการ 30 ถ. พัฒนาการ สวนหลวง กรุงเทพฯ

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ...2 กันยายน 2565

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.

- <http://www.fda.moph.go.th/sites/oss/Pages/Main.aspx>
- <http://ndi.fda.moph.go.th/>

ข้อมูลยานี้เป็นข้อมูลโดยย่อ หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

ยานี้อาจทำให้เกิดอันตรายร้ายแรงได้ ต้องใช้ภายใต้การควบคุมของแพทย์เท่านั้น