

**บาลอกซาเวียร์
ยาเม็ดเคลือบฟิล์ม
ความแรง 20 และ 40 มิลลิกรัม และ
ยาผงแห้งละลายน้ำสำหรับกิน
ความแรง 2 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร
ชื่อการค้า Xofluza (โซ-ฟลู-ซา)**

1. ยานี้คือยาอะไร

1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้มีชื่อว่า บา-ลอก-ซา-เวียร์-มาร์-บอก-ซิล (baloxavir marboxil) เป็นยาในกลุ่มต้านไวรัส

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ใช้รักษาโรคไข้หวัดใหญ่ในผู้ป่วยอายุ 12 ปีขึ้นไป ที่แพทย์วินิจฉัยแล้วว่า มีอาการของโรคไข้หวัดใหญ่ไม่เกิน 48 ชั่วโมง
- ใช้ป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ในผู้ป่วยอายุ 12 ปีขึ้นไป

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

X เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร ในกรณีต่อไปนี้

- หญิงตั้งครรภ์หรือให้นมลูก
- มีภาวะไตหรือตับบกพร่อง
- กำลังกินยาหรืออาหารเสริมบางชนิด

**“หากมีภาวะดังกล่าว
ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร”**

ผู้ผลิต: บริษัท ชิโอบิ ฟาร์มา โค จำกัด ประเทศญี่ปุ่น
ผู้นำเข้า: บริษัท โรช ไทยแลนด์ จำกัด, กรุงเทพฯ
ผู้แทนจำหน่าย: บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ 17 สิงหาคม 2564

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น เพราะการใช้ยานี้ขึ้นอยู่กับ การประเมินโรคและขนาดน้ำหนักตัวของผู้ป่วย
 - กรณีที่ไต่ยาผงบรรจุขวด แพทย์ พยาบาล หรือเภสัชกรจะเป็นผู้ผสมยาให้
 - เมื่อได้รับยาแล้ว ให้กินยาทันที
- X** อย่ากินยานี้พร้อมกับยาหรืออาหารเสริมบางชนิด เช่น นม ยาลดกรด ยาระบายบางชนิด ธาตุเหล็ก สังกะสี แคลเซียม ซีลีเนียม แมกนีเซียม

3.2 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการ หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรง ให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- (ไม่มีข้อมูล)

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องรีบไปพบแพทย์ทันที

- ลมพิษ บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก
 - หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
 - ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีจุดตามผิวหนัง หรือเลือดออกผิดปกติ
- “ถ้ามีอาการเหล่านี้ ให้รีบไปพบแพทย์ทันที”**

5.2 อาการที่อาจเกิดขึ้นได้

- อาการคัน

**“ให้รอดอาการ
แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์”**

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.


- <http://www.fda.moph.go.th/sites/oss/Pages/Main.aspx>
- <http://ndi.fda.moph.go.th/>

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บไว้ในภาชนะบรรจุเดิมที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อย่าให้โดนแสงโดยตรง
- โดยทั่วไปควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถห้องนำ ห้องครัว
- หากจำเป็นต้องเก็บผงยาบรรจุขวดที่ละลายน้ำแล้ว สามารถเก็บที่อุณหภูมิต่ำกว่า 30 องศาเซลเซียสได้ไม่เกิน 2 ชั่วโมง
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

• ลักษณะยา

- ยาเม็ดขนาด 20 มิลลิกรัม เม็ดรูปยาวรี เคลือบฟิล์มสีขาวถึงเหลืองอ่อน เม็ดยาด้านหนึ่งมีรอยเครื่องหมาย  และอักษร "772" เม็ดยาดีกด้านหนึ่งมีรอยอักษรระบุความแรง "20"
- ยาเม็ดขนาด 40 มิลลิกรัม เม็ดรูปยาวรี เคลือบฟิล์มสีขาวถึงเหลืองอ่อน ด้านหนึ่งมีรอยอักษร "BXM" และรอยอักษรระบุความแรง "40"
- ยาผงแห้งละลายน้ำสำหรับกิน ขวดแก้วสีขาปิดด้วยฝาชนิดกันเด็กเปิดภายในบรรจุผงยาสีขาวถึงสีเหลืองอ่อน

- **ตัวยาสำคัญ** บาลอกซาเวียร์มาร์บอกซิล
- **ส่วนประกอบอื่นๆ ของยาเม็ด** ได้แก่ แล็กโทส โมโนไฮเดรต, ครอสคาร์เมลโลสโซเดียม, โพรโตน, ไมโครคริสทัลไลน์เซลลูโลส, โซเดียมสเตียริลฟูมาเรต, ไฮโปรมีลโลส, ทาลคัม, ไทเทเนียมไดออกไซด์
- **ส่วนประกอบอื่นๆ ของยาผง** ได้แก่ แมนนิทอล, มอลทิทอล, โซเดียมคลอไรด์, ไฮโปรมีลโลส, โพรโตน, คอลลอยด์ซิลิคอนไดออกไซด์, ซุคราโลส, ทาลคัม, สารแต่งรสชาติสตรอเบอร์รี่

**เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร**