

## เอนเทกคาเวียร์ เทวา 0.5 มิลลิกรัม เอนเทกคาเวียร์ เทวา 1 มิลลิกรัม ชนิดเม็ด

### 1. ยานี้คืออะไร

#### 1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้มีชื่อว่า เอนเทกคาเวียร์ (entecavir) เป็นยาในกลุ่มยาต้านไวรัส

#### 1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ยานี้ใช้รักษาโรคติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีเรื้อรังในผู้ป่วยที่แพทย์ตรวจแล้วว่าต้องใชยานี้

### 2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

#### 2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้

#### 2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

- ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร ในกรณีต่อไปนี้
  - ติดต่อยาลามิวดีน
  - เป็นโรคตับหรือโรคไต
  - ติดเชื้อเอชไอวี (HIV)
  - เคยรักษาโรคติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีเรื้อรัง
  - แพ้น้ำตาลนม
  - กำลังตั้งท้อง วางแผนจะตั้งท้อง หรืออยู่ในระยะให้นมลูก เนื่องจากไม่มีข้อมูลยืนยันความปลอดภัย
  - กำลังใช้ยา สมุนไพร หรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบางชนิด เพราะอาจมีผลต่อการรักษา

### 3. วิธีใช้ยา

#### 3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค

- ในผู้ป่วยที่ไม่เคยได้รับยาก่อนหน้านี้มาก่อน สามารถกินยาพร้อมกับอาหารหรือไม่ก็ได้
- สำหรับผู้ป่วยที่รักษาด้วยยามิวูดีนไม่ได้ผล และผู้ป่วยโรคตับขั้นรุนแรง ควรกินยาขณะท้องว่าง เช่น กินยาก่อนอาหารอย่างน้อย 2 ชั่วโมงหรือหลังอาหารอย่างน้อย 2 ชั่วโมง)

#### 3.2 หากลืมกินยาควรทำอย่างไร

- ให้กินยาทันทีที่นึกได้ แต่หากใกล้เวลาของมื้อถัดไป ให้รอกินยาของมื้อถัดไป โดยไม่เพิ่มขนาดยาเป็น 2 เท่า

#### 3.3 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรง ให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที

### 4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- ห้ามหยุดยาเอง และให้กินยาอย่างต่อเนื่องตามคำแนะนำของแพทย์ หรือเภสัชกร เพราะการหยุดยาอาจทำให้อาการของโรครุนแรงขึ้น
- พบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตามผลการรักษาหรืออันตรายจากยา

### 5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

#### 5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

- ลมพิษ บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีจ้ำตามผิวหนังหรือเลือดออกผิดปกติ

“ให้หยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที”

#### 5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์

- ปวดหัว เวียนหัว นอนไม่หลับ ง่วงซึม
- คลื่นไส้ อาเจียน อาหารไม่ย่อย ปวดท้อง ท้องร่วง

“ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์”

### 6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อย่าให้โดนแสงโดยตรง โดยทั่วไปควรเก็บที่อุณหภูมิต่ำกว่า 30 องศาเซลเซียส ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

### 7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

- **ลักษณะยา :** ยาเม็ดเคลือบฟิล์มรูปสามเหลี่ยม มีตัวยาสำคัญคือเอนเทกคาเวียร์ มี 2 ความแรง
  - ความแรง **0.5 มิลลิกรัม** เป็นเม็ดสีขาวถึงขาวนวล ด้านหนึ่งมีตัวอักษร “0.5”
  - ความแรง **1.0 มิลลิกรัม** เป็นยาเม็ดสีชมพู ด้านหนึ่งมีตัวอักษร “1”
- **ส่วนประกอบอื่นๆ** ได้แก่ แลคโตสโมโนไฮเดรต, ไมโครคริสตัลลินเซลลูโลส, ไฮดรอกซีโพรพิลเซลลูโลส, ครอสโพรโตนไทป์เอ, แมกนีเซียมสเตียเรต, ไฮโปรมีโลส, มาโครกอล 400, โททานเนียมไดออกไซด์, สำหรับความแรง 1 มิลลิกรัมรมอนมีไอออกไซด์

ผู้ผลิต : บริษัท รีเมดิกา ลิมาซบอล อินดัสเทรียล เอสเตท เมืองลิมาซบอล ประเทศไชปรัส

ผู้นำเข้า : บริษัท เทวา ฟาร์มา (ประเทศไทย) จำกัด กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

ผู้แทนจำหน่าย : บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ 23 กันยายน 2563

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ **อย.**

- <http://www.fda.moph.go.th/sites/oss/Pages/Main.aspx>
- <http://ndi.fda.moph.go.th/>

**เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ  
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร**