

เอนแท็กคาโพน
ความแรง 200 มิลลิกรัม
ชนิดเม็ดเคลือบฟิล์ม
ชื่อการค้า Entacapone Teva
(เอนแท็กคาโพน เทวา)

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้มีชื่อว่า เอนแท็กคาโพน (entacapone) มีตัวยา 200 มิลลิกรัม

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ยานี้ใช้เพื่อรักษาโรคพาร์กินสัน โดยใช้ยานี้ร่วมกับยาที่มีส่วนประกอบของลีโวโดปา

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- X** เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้
- X** เคยแพ้ถั่วลิสง หรือถั่วเหลือง
- X** มีเนื้องอกต่อมหมวกไต
- X** เป็นโรคตับ
- X** มีประวัติอาการไม่พึงประสงค์ร้ายแรงจากยาด้านอาการทางจิต
- X** มีประวัติเกิดภาวะกล้ามเนื้อลายสลาย
- X** ห้ามใช้ร่วมกับยาด้านซึมเศร้าบางชนิด แต่หากท่านไม่แน่ใจว่าใช้ยาเหล่านี้อยู่ โปรดปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

- ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร ในกรณีต่อไปนี้
 - โรคหัวใจ
 - เคยกินยาอื่นแล้วมีอาการเวียนหัวเมื่อลุกขึ้นยืน
 - เคยมีอาการท้องเสียเรื้อรัง
 - น้ำหนักลดรุนแรงจากอาการท้องเสีย
 - เบื่ออาหาร อ่อนเพลีย จนทำให้น้ำหนักลดในระยะเวลาอันสั้น
 - ขาดความยับยั้งชั่งใจ เช่น เล่นการพนัน ความต้องการทางเพศสูง การกินอาหารมากผิดปกติ
- กำลังตั้งท้องหรือให้นมลูก
- ไม่แนะนำให้ใช้ในผู้อายุต่ำกว่า 18 ปี เพราะไม่มีข้อมูล
- ไม่ควรใช้ยานี้ร่วมกับยา อาหาร สมุนไพร หรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบางชนิด เช่น ยาวาร์ฟาริน เพราะอาจมีผลต่อการรักษาหรือเกิดอันตรายได้

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค
- กินยานี้พร้อมกับยาที่มีส่วนประกอบของลีโวโดปา
- กินยานี้ก่อนหรือหลังอาหารก็ได้

3.2 หากลืมกินยาควรทำอย่างไร

- ให้ข้ามมื้อที่ลืม แล้วกินยามื้อต่อไปตามปกติ ห้ามกินยาเพิ่มเป็น 2 เท่า

3.3 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติรุนแรง ให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- พบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตามผลการรักษาหรืออันตรายจากยา
- ห้ามหยุดยาเอง และให้กินยานี้อย่างต่อเนื่องตามคำแนะนำของแพทย์ หรือเภสัชกร
- ระมัดระวังการขับชี่ยานยนต์ หรือทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกล หรือทำงานที่เสี่ยงต่อการผลัดตกจากที่สูง เพราะยานี้อาจทำให้เวียนหัวหรือง่วงซึม

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

- ลมพิษ บวมที่ใบหน้า เปลือกตาริมฝีปาก
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีจ้ำตามผิวหนังหรือเลือดออกผิดปกติ
- สับสน อารมณ์และพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงผิดปกติ
- ง่วงนอนรุนแรง หน้ามืด วิงเวียน เป็นลม
- ปวดกล้ามเนื้อ กล้ามเนื้อเกร็ง กล้ามเนื้ออ่อนแรง
- ท้องเสียรุนแรง
- ผิวเปลี่ยนสี
- กล้ามเนื้อกระตุก หรือมีการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อที่ควบคุมไม่ได้ ตัวสั่น มีปัญหาเกี่ยวกับการทรงตัวหรือการเดิน
- กล้ามเนื้อกระตุกรั่ว มีไข้ ร่วมกับ อาการสั่น สับสน กระสับกระส่าย เหงื่อแตก หัวใจเต้นเร็ว

“ให้หยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที”

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์

- เห็น ไม้ยืน ไม้ก่อกองหรือรู้สึกถึงสิ่งที่ไม่มียูจริง
- ควบคุมตนเองหรือยับยั้งชั่งใจไม่ได้
- บัสสาวะสีน้ำตาล
- คลื่นไส้ ปวดท้อง

“ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์”

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ

หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

6. ควรเก็บยาอย่างไร

- เก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อย่าให้โดนแสงโดยตรง โดยทั่วไปควรเก็บที่อุณหภูมิต่ำกว่า 30 องศาเซลเซียส
- ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- ห้ามยืมยาออกจากขวดเมื่อจะกินในแต่ละครั้งเท่านั้น
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

- **ลักษณะยา** ยาเม็ด รี นูนทั้งสองด้าน เคลือบฟิล์มสีน้ำตาลอ่อน มีสัญลักษณ์ E200 บนเม็ดยาด้านหนึ่ง อีกด้านหนึ่งเรียบ
- **ตัวยาสำคัญ** เอนแท็กคาโพน
- **ส่วนประกอบอื่น ๆ** ได้แก่ microcrystalline cellulose (ไมโครคริสตัลลีนเซลลูโลส), povidone (โพลีโอดิน), pregelatinized starch (พรีเจลาติไนซ์สตาร์ช), magnesium stearate (แมกนีเซียมสเตียเรต), polyvinyl alcohol (โพลีไวนิลแอลกอฮอล์), talc (ทัลก์), titanium dioxide (ไททาเนียมไดออกไซด์), macrogol (แมคโครกอล), iron oxide yellow (ไอออนออกไซด์สีเหลือง), lecithin (soya) (เลซิธิน (ถั่วเหลือง)), iron oxide red (ไอออนออกไซด์สีแดง)

ผู้ผลิต: TEVA Gyógyszergyár Zrt., Debrecen, Hungary

ผู้นำเข้า: บริษัท เทวา ฟาร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
กรุงเทพฯ ประเทศไทย

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ มิถุนายน 2565

ศึกษาข้อมูลยาเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.

- <http://www.fda.moph.go.th/sites/oss/Pages/Main.aspx>
- <http://ndi.fda.moph.go.th/>

**เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร**