

ไรวารีอกซาแบน
ความแรง 15 และ 20 มิลลิกรัม
ชนิดเม็ดเคลือบฟิล์ม
ชื่อการค้า
RIVAXORED 15® (ไรวาชอเรด 15)
และ
RIVAXORED 20® (ไรวาชอเรด 20)

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

ยานี้มีชื่อว่า ไรวารีอกซาแบน
เป็นยาในกลุ่มยาต้านการแข็งตัวของเลือด

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ยานี้ใช้ในผู้ใหญ่เพื่อป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดสมองและลิ่มเลือดอุดตันหลอดเลือดอื่นๆ
- ยานี้ใช้ในผู้ใหญ่เพื่อรักษาภาวะลิ่มเลือดอุดตันหลอดเลือดดำที่ขา และภาวะลิ่มเลือดอุดตันหลอดเลือดที่ปอดและป้องกันการกลับมาเป็นซ้ำ

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- × ห้ามใช้ในผู้ที่แพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้
- × ห้ามใช้ในผู้ที่กำลังมีเลือดออกมากผิดปกติ
- × ห้ามใช้ในผู้ที่มีโรคหรือภาวะที่เพิ่มความเสี่ยงต่อการมีเลือดออกอย่างรุนแรง (เช่น แผลในกระเพาะอาหาร, อาการบาดเจ็บหรือมีเลือดออกในสมอง, เพิ่งผ่าตัดสมองหรือดวงตาเมื่อไม่นานมานี้)
- × ห้ามใช้ในผู้ที่กำลังใช้ยาอื่นเพื่อป้องกันการแข็งตัวของเลือด ได้แก่ วาร์ฟาริน ดาบีคาเทรน เอพิซาแบน หรือเฮพาริน
- × ห้ามใช้ในผู้ป่วยโรคตับ
- × ห้ามใช้ในหญิงกำลังตั้งครรภ์หรือวางแผนที่จะมีลูก
- × ห้ามใช้ในหญิงกำลังให้นมลูก

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

- ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร ในกรณีต่อไปนี้
 - มีความเสี่ยงต่อการเกิดเลือดออกเพิ่มขึ้น ซึ่งอาจมีได้ในกรณีต่อไปนี้
 - ภาวะไตทำงานบกพร่องรุนแรง
 - มีความดันเลือดสูงขั้นรุนแรงที่ควบคุมไม่ได้
 - มีแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้เมื่อเร็วๆ นี้
 - ใส่ลิ่มหัวใจเทียม
 - มีความดันเลือดไม่คงที่หรือมีกำลังจะผ่าตัดเพื่อเอาลิ่มเลือดออกจากปอด
 - มีความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกันที่เป็นสาเหตุให้เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดลิ่มเลือดอุดตันหลอดเลือด
- เป็นเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี
- ใช้ยา สมุนไพร หรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอื่นอยู่

สอบถามแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยานี้
หากไม่แน่ใจว่ามีอาการดังกล่าวหรือไม่

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค

- กินยานี้พร้อมอาหาร

3.2 หากลืมหินยานี้ ควรทำอย่างไร

- ให้กินยาทันทีที่นึกได้ และกินยาเม็ดต่อไปในวันถัดไปตามที่กำหนด ห้ามกินยาเพิ่มเป็น 2 เท่า

3.3 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรง เช่น เลือดออกผิดปกติ ให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- ห้ามหยุดยาเอง และให้กินยานี้อย่างต่อเนื่องตามคำแนะนำของแพทย์ หรือเภสัชกร
- ผู้หญิงต้องคุมกำเนิดด้วยวิธีที่มีประสิทธิภาพในระหว่างได้รับยา
- ระมัดระวังการขับชี่ยานยนต์ การทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร หรือการทำงานที่เสี่ยงต่อการพลัดตกจากที่สูง เพราะยานี้อาจทำให้วิงเวียนหรือเป็นลมได้

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

- ลมพิษ บวมที่ใบหน้า เปลือกตาริมฝีปาก
- หน้ามืด เป็นลม แขนหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีจ้ำตามผิวหนัง
- ปวดหัว อาเจียน ชัก หมดสติ หรือคอแข็ง
- เลือดออกมากหรือนานผิดปกติ เช่น เลือดออกในตา เลือดกำเดาไหล เลือดออกที่เหงือก ไขมีเลือดปน ปัสสาวะมีเลือดออก ประจำเดือนมากผิดปกติ
- อ่อนแรง อ่อนเพลีย เวียนศีรษะ บวมโดยไม่มีสาเหตุ หายใจหอบ

“ให้หยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที”

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์

- ผิวหนังช้ำ
- รู้สึกไม่สบาย มีไข้
- ปวดแขนขา
- ปวดท้อง อาหารไม่ย่อย คลื่นไส้ ท้องผูก ท้องเสีย

“ไม่จำเป็นต้องหยุดยา
แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์”

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อย่าให้โดนแสงโดยตรง โดยทั่วไปควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

- **ลักษณะยา:**
เป็นเม็ดสีแดง รูปร่างกลมมนทั้งสองด้าน ด้านหนึ่งมีตัวเลข "15"
หรือ เป็นเม็ดสีแดงเข้ม รูปร่างกลมมนทั้งสองด้าน ด้านหนึ่งมีตัวเลข "20"
- **ตัวยาสําคัญ:** ไรวาร็อกซาแบน 15 หรือ 20 มิลลิกรัม
- **ส่วนประกอบอื่นๆ**
ไมโครคริสตัลลีนเซลลูโลส แลคโตสโมโนไฮเดรต
โครสคาเมลโลสโซเดียม ไฮโปรมะลอส
โซเดียมลอริลซัลเฟต แมกนีเซียมสเตียเรต

ผู้ผลิต: บริษัท ด็อกเตอร์เรดดีส์ แลบบอราทอรีส์
จำกัด ประเทศอินเดีย

ผู้นำเข้า: บริษัท ด็อกเตอร์เรดดีส์ แลบบอราทอรีส์
(ประเทศไทย) จำกัด

ผู้แทนจำหน่าย: บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ 13 ธันวาคม 2564

**เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร**