

เบนดามัสติน
ความแรง 2.5 มิลลิกรัมต่อ 1 มิลลิลิตร
ชนิดผงสำหรับผสมน้ำเพื่อฉีด
ชื่อการค้า BENDOKEY (เบนโดคีย์)

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้มีชื่อว่า เบน-ดา-มัส-ติน-ไฮ-โดร-คลอ-ไรด์ (Bendamustine hydrochloride) เป็นยาในกลุ่ม ยา รักษาโรคมะเร็ง

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- รักษาโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวลิมโฟไซต์แบบเรื้อรัง
- รักษาโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิดนอนฮอดจ์กิน
- รักษาโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิดแมนเทิลเซลล์

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้
- อยู่ระหว่างการให้นมบุตร
- การทำงานของตับบกพร่องอย่างรุนแรง
- มีโรคไตขั้น หรือ ตัวเหลือง ตาเหลือง ซึ่งเป็นอาการของโรคไตขั้น
- การทำงานของไขกระดูกผิดปกติอย่างรุนแรง
- เข้ารับการผ่าตัดในช่วง 30 วันก่อนการได้รับยา
- มีโรคติดเชื้อโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ภาวะเม็ดเลือดขาวมีระดับน้อยกว่าปกติ
- เพิ่งได้รับการฉีดวัคซีนไขว้เหลือง

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

- ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร ในกรณีต่อไปนี้
 - มีโรคหัวใจ
 - มีอาการปวดศีรษะ ปัสสาวะน้อยลง หรือมีเลือดปนออกมาจากปัสสาวะ
 - ใช้ยา สมุนไพร หรืออาหารเสริมอยู่
 - ตั้งครรภ์ หรือวางแผนตั้งครรภ์

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค
- ยานี้ใช้สำหรับฉีดเข้าหลอดเลือดเท่านั้น
- การฉีดยาแต่ละครั้งจะต้องใช้เวลา 30-60 นาที
- ขนาดยาขึ้นอยู่กับชนิดของโรคมะเร็ง และขนาดร่างกายของผู้ป่วย
- ระยะเวลาในการรักษาขึ้นกับชนิดของโรคมะเร็ง และการตอบสนองต่อยาของผู้ป่วย

3.2 หากลืมฉีดยาควรทำอย่างไร

- ควรติดต่อแพทย์เพื่อทำการนัดหมายการฉีดยาครั้งต่อไป

3.3 ถ้าฉีดยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรง ให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- พบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอ
- ห้ามหยุดการรักษาด้วยตัวเอง
- ต้องคุมกำเนิดก่อนใช้ยา และระหว่างใช้ยานี้
- ผู้ป่วยต้องได้รับการตรวจจำนวนเม็ดเลือด ก่อนการเริ่มใช้ยา และระหว่างการรักษา
- หลังใช้ยา อาจมีอาการมึนงงได้ ไม่ควรขับรถ หรือทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร
- สังเกตอาการที่เกิดขึ้นหลังจากฉีดยา โดยเฉพาะการฉีดยาครั้งแรก เพื่อเฝ้าระวังการแพ้ยา

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

- ลมพิษ บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีจุดตามผิวหนัง หรือเลือดออกผิดปกติ
- มีปัญหาเกี่ยวกับความคิด ความทรงจำ หรือการมองเห็นผิดปกติ ซึ่งเป็นอาการของการติดเชื้อในสมอง
- ผิวหนังเปลี่ยนแปลง ซึ่งอาจเป็นอาการเบื้องต้นของมะเร็งผิวหนัง

"ให้หยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที"

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์

- มีไข้ ปวดหัว เวียนหัว อ่อนเพลีย คลื่นไส้ อาเจียน
- ความดันโลหิตเพิ่มสูงขึ้น
- หน้ามืด ใจสั่น
- ประจำเดือนมาผิดปกติ
- มีแผลในปาก
- ท้องเสีย ท้องผูก
- ผมร่วง มีผื่นคัน
- เจ็บคอ หลอดลมอักเสบ หายใจได้ไม่เต็มที่

"ไม่จำเป็นต้องหยุดยา
แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์"

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง ปล่อยให้โดนแสงโดยตรง โดยทั่วไปควรเก็บที่อุณหภูมิต่ำกว่า 30 องศาเซลเซียส ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- ยาที่ผสมน้ำแล้วจะมีอายุ 3 ชั่วโมงครึ่ง ที่อุณหภูมิห้อง และมีอายุ 2 วันถ้าเก็บไว้ในตู้เย็น
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

- ลักษณะยา ก่อนยาหรือผงยาสีขาวถึงสีขาวออกเหลือง บรรจุในขวดแก้ว
- ตัวยาสาคัญคือ เบนดามัสตินไฮโดรคลอไรด์ 25 มิลลิกรัม และ 100 มิลลิกรัม ต่อ 1 ขวดแก้ว
- ส่วนประกอบอื่น ได้แก่ แมนนิทอล (Mannitol) และเทอร์เชียรีบิวทานอล (tert-butanol)

ผู้ผลิต บริษัท ยูเจีย ฟาร์มา สเปนเซียลิตีส์ จำกัด ประเทศไทย

ผู้นำเข้า/ผู้แทนจำหน่าย บริษัท เอพีแอล ฟาร์มา ไทย จำกัด ประเทศไทย

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อมีนาคม 2567

ศึกษาข้อมูลยาเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.

▪ <https://ndi.fda.moph.go.th/>