

131 PIL_DTP

วัคซีนรวมป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก และไอกรน ชนิดน้ำยาแขวนตะกอนสำหรับฉีด ชื่อการค้า Tripvac (ทริฟแวก)

1. วัคซีนนี้คือวัคซีนอะไร

1.1 วัคซีนนี้มีชื่อว่าอะไร
วัคซีนนี้มีชื่อว่า วัคซีนรวมป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก และไอกรน

1.2 วัคซีนนี้ใช้เพื่ออะไร
ใช้สำหรับป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก และไอกรน ในเด็กทารกที่มีอายุ 6 สัปดาห์ขึ้นไป

2. ข้อควรระวังก่อนใช้วัคซีน

2.1 ห้ามใช้วัคซีนนี้เมื่อไร

- เคยแพ้วัคซีนนี้
- เคยแพ้วัคซีนเดี่ยวหรือวัคซีนรวมที่มีส่วนประกอบเดียวกันกับวัคซีนนี้
- มีอาการผิดปกติทางสมองหรือทางระบบประสาทที่แพทย์วินิจฉัยว่าห้ามใช้วัคซีนนี้
- ผู้ที่มีเกล็ดเลือดต่ำ หรือผู้ที่มีการแข็งตัวของเลือดผิดปกติ
- ห้ามใช้วัคซีนนี้กับผู้ที่เคยเกิดอาการผิดปกติของเนื้อเยื่อสมองหลังจากได้รับวัคซีนในครั้งก่อน

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้วัคซีนนี้

- แจ้งแพทย์ก่อนใช้วัคซีนในกรณีต่อไปนี้
 - เด็กทารกที่มีโรคทางสมอง เช่น อาการชัก ควรแจ้งแพทย์ เพราะอาจจำเป็นต้องเลื่อนการฉีดวัคซีนออกไป
 - ผู้ที่มีประวัติการชัก หรือคนในครอบครัวมีประวัติการชัก
 - ผู้ที่ได้รับการฉายรังสี
- ไม่แนะนำให้ฉีดวัคซีนให้แก่ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป
- หากมีความจำเป็นต้องได้รับยาดังต่อไปนี้ ให้ปรึกษาแพทย์
 - ยาต้านการแข็งตัวของเกล็ดเลือด
 - ยากดภูมิคุ้มกัน

- ยาเคมีบำบัด
- ยาในกลุ่มสเตียรอยด์ที่ใช้ในปริมาณสูงกว่าขนาดแนะนำ

3. วิธีใช้วัคซีน

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ควรใช้วัคซีนตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น
- ฉีดวัคซีนขนาด 0.5 มิลลิลิตร จำนวน 3 เข็มเข้ากล้ามเนื้อตามตารางต่อไปนี้

วัคซีน	อายุทารก		
	6 สัปดาห์	10 สัปดาห์	14 สัปดาห์
วัคซีนรวมป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก และไอกรน	เข็มที่ 1	เข็มที่ 2	เข็มที่ 3

3.2 หากไม่ได้รับวัคซีนตามกำหนด

หากมารับวัคซีนเลยกำหนดนัดสามารถให้วัคซีนครั้งต่อไปได้ ไม่ว่าจะเว้นช่วงห่างไปนานเท่าใด

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้วัคซีน

- พบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตามผลการรักษาหรืออันตรายจากยา
- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติให้รีบแจ้งแพทย์

5. อันตรายที่อาจเกิดจากวัคซีน

5.1 อาการที่ต้องรีบไปพบแพทย์ทันที

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก
- ชักร่วมกับมีหรือไม่มีไข้ ซึ่งเกิดขึ้นภายใน 3 วัน
- มีความผิดปกติที่ระบบประสาท
- เกิดอาการเหล่านี้ภายใน 48 ชั่วโมงหลังฉีดวัคซีน
 - มีไข้สูงตั้งแต่ 40 องศาเซลเซียสขึ้นไป โดยไม่ทราบสาเหตุ
 - มีอาการตัวอ่อนหรือไม่ตอบสนอง
 - กรีดร้อง/ร้องกวนติดต่อกันเกินกว่า 3 ชั่วโมง

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดการใช้วัคซีน แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์ทันที

- บวม กดเจ็บ แดงบริเวณที่ฉีดยา ซึ่งเกิดร่วมกับไข้
- มีไข้ (มีและไม่มีอาการหนาวสั่นร่วมด้วย) และกรีดร้อง/ร้องกวน แนะนำให้กินยาลดไข้ และเช็ดตัวเด็กด้วยน้ำอุ่น

"หากมีอาการข้างต้น ให้รอดอาการ แต่ถ้ามีอาการรุนแรง ควรไปพบแพทย์ และต้องพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนรับวัคซีนเข็มถัดไป "

6. ควรเก็บวัคซีนนี้อย่างไร

- เก็บวัคซีนนี้ไว้ในตู้เย็นช่องปกติที่อุณหภูมิ 2 องศาเซลเซียส ถึง 8 องศาเซลเซียส)
- ห้ามแช่แข็ง ถ้าแช่แข็ง ให้ทิ้งวัคซีนที่แช่แข็งทันที

7. ลักษณะและส่วนประกอบของวัคซีนนี้

วัคซีนขนาด 1 และ 10 โดสิ มีลักษณะและส่วนประกอบดังต่อไปนี้

ส่วนประกอบ

แต่ละ 0.5 มิลลิลิตรของวัคซีน ประกอบด้วย
 ท็อกซอยด์ของเชื้อคอตีบ 25 Lf (≥ 30 อนุตสากล)
 ท็อกซอยด์ของเชื้อบาดทะยัก 5.5 Lf (≥ 60 อนุตสากล)
 เชื้อไอกรนชนิดเต็มเซลล์ 16 IOU (≥ 4 อนุตสากล)
 ส่วนประกอบอื่น ๆ ได้แก่
 อลูมิเนียมฟอสเฟต ไธโอเมอซอล โซเดียมคลอไรด์ โซเดียมไฮดรอกไซด์ กรดไฮโดรคลอริก น้ำกลั่นสำหรับฉีด

ผู้ผลิต

Biological E. Limited
 Plot No. 1, S.P. Biotechnology Park, Phase-II, Kolthur Village, Shameerpet Mandal, Medchal-Malkajgiri District-500078, Telangana INDIA

ผู้นำเข้า

บริษัท ไบโอบีเทค จำกัด
 18 ซอยอุดมสุข 37 ถนนสุขุมวิท 103 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260
 โทรศัพท์ 02 748 9333 โทรสาร 02 748 9393
 เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2562

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
 หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร