

**ยูริพริสทอล  
ความแรง 5 มิลลิกรัม  
ชนิดเม็ด  
แอสเมียร์**

**1. ยานี้คืออะไร**

**1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร**

- แอสเมียร์มีชื่อว่า ยูริพริสทอล อะซิเตท (Ulipristal acetate) เป็นยาในกลุ่มฮอร์โมน

**1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร**

- ยานี้ใช้รักษาอาการที่เกิดจากเนื้องอกในมดลูกเช่น เลือดประจำเดือนออกมาก ปวดอุ้งเชิงกราน ซึ่งมีอาการรุนแรงหรือปานกลางในสตรีวัยก่อนหมดประจำเดือนที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป

**2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา**

**2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร**

- เคยแพ้ยานี้หรือส่วนประกอบของยานี้
- มีภาวะตับผิดปกติ
- มีครรภ์หรือให้นมบุตร
- มีเลือดออกทางช่องคลอดที่ไม่ได้เกิดจากเนื้องอกในมดลูก
- เป็นมะเร็งมดลูก มะเร็งปากมดลูก มะเร็งรังไข่ หรือมะเร็งเต้านม

**2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้**

- หากท่านเป็นโรคตับ โรคไต หรือโรคหอบหืด ให้แจ้งแพทย์หรือเภสัชกร
- ใช้ถุงยางอนามัยหรือวิธีอื่นที่แพทย์หรือเภสัชกรแนะนำ เพราะยานี้ลดประสิทธิภาพในการคุมกำเนิดด้วยวิธีกินยาเม็ดคุมกำเนิด การฝังหรือฉีดยาฮอร์โมนคุมกำเนิด

- แจ้งแพทย์หรือเภสัชกร หากท่านใช้ยาโรคหัวใจ ยาลดความดันเลือด ยาป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง ยาป้องกันการแข็งตัวของเลือด ยารักษาโรคลมชัก ยาแก้ปวด ยาต้านโรคซึมเศร้า ยารักษาโรควิตกกังวล ยารักษาเอชไอวี ยารักษาโรคติดเชื้อแบคทีเรียหรือเชื้อรา เนื่องจากอาจมีผลต่อการรักษาหรือเกิดอันตรายได้

**3. วิธีใช้ยา**

**3.1 ขนาดและวิธีใช้**

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์ หรือเภสัชกรเท่านั้น เนื่องจากขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค
- เริ่มกินยาให้เร็วที่สุดในช่วง 1 สัปดาห์แรกของรอบเดือน

**3.2 หากลืมกินยาควรทำอย่างไร**

- กินยาทันทีที่นึกได้ แต่ถ้าลืมเกิน 12 ชั่วโมงให้รอ กินยาของมื้อต่อไป ห้ามกินยาเพิ่มเป็น 2 เท่า

**3.3 ถ้าใช้ยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร**

- ให้รีบแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทันที

**4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา**

- ใช้ยาตามแพทย์สั่งและพบแพทย์ตามนัด เพื่อติดตามผลการรักษาและตรวจการทำงานของตับ เพราะยาอาจทำให้ตับอักเสบ
- หลังกินยานี้ไม่เกิน 10 วัน ท่านจะมีเลือดประจำเดือนลดลงหรือไม่มีเลย หากท่านยังคงมีเลือดประจำเดือนออกมากควรแจ้งให้แพทย์ทราบ
- ยานี้อาจทำให้มีนงง ระมัดระวังการขับขี่ยานยนต์หรือทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกล หรือทำงานที่เสี่ยงต่อการพลัดตกจากที่สูง

- ท่านจะมีประจำเดือนตามปกติหลังหยุดยานี้เป็นเวลา 4 สัปดาห์ และผนังมดลูกจะกลับมาเป็นปกติหลังมีประจำเดือน

**5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา**

**5.1 หากท่านมีอาการต่อไปนี้**

- หน้าบวม ลื่นบวม ตัวบวม กลืนยาก หายใจลำบาก ผื่นลมพิษ
- คลื่นไส้ อาเจียน เหนื่อยง่าย ตัวเหลือง ตาเหลือง บัสสาวะสีเข้ม ปวดท้องชวบบน

ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

**5.2 หากท่านมีอาการต่อไปนี้**

- ไม่มีประจำเดือน เลือดประจำเดือนลดลง
  - เต้านมคัดตึง ปวดท้องน้อย ร้อนวูบวาบ อารมณ์แปรปรวน
  - ปวดหัว บ้านหมุน งุนงง
  - ปวดกล้ามเนื้อ ปวดกระดูก ปวดหลัง
  - ปวดท้อง ท้องผูก คลื่นไส้
  - บัสสาวะไม่ออก
  - อ่อนเพลีย
  - ปากแห้ง ผิวแห้ง มีเหงื่อมาก
  - เป็นสิว ผมหงอก น้ำหนักเพิ่ม
- ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์ทันที

**6. ควรเก็บยานี้อย่างไร**

- เก็บไว้ในภาชนะบรรจุเดิมตามที่ได้รับมา
  - เก็บยาในที่แห้ง อบอุ่นโดยแสงโดยตรง ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว โดยทั่วไปควรเก็บอุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส
  - เก็บยาให้พ้นมือเด็ก
- ผู้นำเข้า บริษัท ซิลลิด ฟาร์มา จำกัด  
เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ 25 ตุลาคม 2561

**เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร**