

**เลโทรโซล**  
**ความแรง 2.5 มิลลิกรัม**  
**ชนิดเม็ดเคลือบฟิล์ม**  
**ชื่อการค้า LETROVITAE**  
**(เลโทรวิเต)**

**1. ยานี้คืออะไร**

**1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร**

- ยานี้มีชื่อว่าเลโทรวิเต

**1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร**

- ยานี้ใช้รักษาโรคมาเร็งเต้านมในหญิงที่หมดประจำเดือน และแพทย์ตรวจแล้วว่าจำเป็นต้องใช้ยานี้

**2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา**

**2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร**

- ⊗ เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบอื่นในยานี้
- ⊗ ห้ามใช้ในหญิงที่ยังไม่หมดประจำเดือน
- ⊗ ห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์หรือกำลังให้นมบุตร

**2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้**

- ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร ในกรณีต่อไปนี้
  - เป็นโรคไต โรคตับ
  - เคยกระดูกหัก หรือ เป็นโรคกระดูกพรุน
  - ใช้ยา สมุนไพร หรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอื่นอยู่ เพราะอาจมีผลต่อการรักษาหรือเกิดอันตรายได้
- ยานี้มีส่วนผสมของน้ำตาลแลคโตส ควรระวังหากมีประวัติแพ้ น้ำตาลบางชนิด

**3. วิธีใช้ยา**

**3.1 ขนาดและวิธีใช้**

- ควรกินยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกร เท่านั้น เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค
- กลืนเม็ดยาทั้งเม็ด พร้อมดื่มน้ำตามอย่างน้อยหนึ่งแก้ว
- กินยานี้วันละหนึ่งครั้ง
- ควรกินยาให้ตรงเวลาทุกวัน โดยกินยานี้พร้อมอาหาร หรือตอนท้องว่างก็ได้
- ห้ามหยุดยาเอง

**3.2 หากลืมกินยาควรทำอย่างไร**

- ให้รีบกินยาทันทีที่นึกได้ แต่ถ้าใกล้กับการกินยาครั้งถัดไป ให้ข้ามเม็ดที่ลืม แล้วรอกินยาเม็ดต่อไป
- ห้ามกินยาเพิ่มเป็น 2 เท่า

**3.3 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร**

- ให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีและยานี้ติดตัวไปด้วย

**4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา**

- พบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้เพื่อติดตามผลการรักษา หรืออันตรายจากยา
- หากกินยานี้แล้วง่วงนอน วิงเวียน ควรหลีกเลี่ยงการขับรถหรือใช้เครื่องจักรกล
- แจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทุกครั้งว่ากินยานี้อยู่
- ค่าเดือน ยานี้อาจทำให้เกิดอันตรายร้ายแรงได้ ต้องใช้ภายใต้การควบคุมของแพทย์เท่านั้น

**5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา**

**5.1 อาการที่ต้องรีบไปพบแพทย์ทันที**

- ลมพิษ บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีจุดตามผิวหนัง
- ตัวเหลือง ตาเหลือง ปัสสาวะสีเข้ม
- มีอาการอ่อนแรง ขาดมร่างกาย พุดหรือหายใจลำบาก
- เจ็บหน้าอกอย่างรุนแรง
- บวมแดงตามเส้นเลือดดำ กัดแล้วเจ็บ
- ใช้สูง หนาวสั่น มีแผลในปาก
- เส้นเอ็นอักเสบ หรือฉีกขาด
- หัวใจเต้นเร็ว เจ็บหน้าอก ผิวซีดเขียว ปวดขาหรือเท้าจับปล้น

**“ให้รีบไปพบแพทย์ทันที”**

**5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์**

- ผิวแห้ง ปากแห้ง คอแห้ง
- ท้องเสีย คลื่นไส้ อาเจียน มีไข้
- เบื่ออาหาร อ่อนเพลีย ผมร่วง
- ร้อนวูบวาบ เหงื่อออกมาก
- ปวดในกระดูกหรือในข้อ

**“ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์”**

**6. ควรเก็บยานี้อย่างไร**

- เก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อย่าให้โดนแสงโดยตรง โดยทั่วไป ควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- ควรแกะยาเมื่อกินในแต่ละครั้งเท่านั้น ห้ามแกะยาออกจากแผงก่อน เพราะยาอาจเสียได้
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

**7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้**

- **ลักษณะยา** เป็นยาเม็ดกลม ขุนทั้งสองข้าง เคลือบฟิล์มสีเหลือง ผิวเรียบทั้งสองด้าน
- **ตัวยาสำคัญ** เลโทรโซล 2.5 มิลลิกรัม
- **ส่วนประกอบอื่นๆ** ได้แก่ lactose monohydrate (แลคโตสโมโนไฮเดรต), microcrystalline cellulose (ไมโครคริสตัลไลน์เซลลูโลส), magnesium stearate (แมกนีเซียมสเตียเรท), colloidal anhydrous silica (คอลลอยด์ซิลิกา), sodium starch glycolate (โซเดียมสตาร์ชไกลโคเลต), hypromellose (ไฮโปรมลโลส) และสารเคลือบฟิล์มแบบพร้อมใช้

ผู้ผลิต : SAG Manufacturing S.L.U., Madrid, Spain

ผู้นำเข้า/ผู้แทนจำหน่าย :

บริษัท แชนิฟิค เฮลท์แคร์ (ไทยแลนด์) จำกัด กรุงเทพฯ

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ 7 มกราคม 2565

**ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.**

- <http://www.fda.moph.go.th/sites/oss/Pages/Main.aspx>
- <http://ndi.fda.moph.go.th/>

**เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ**

**หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร**