

ฟลูติคาโซนและแซลมเทอรอล แคปซูลสำหรับสูดพ่นทางปาก ชื่อการค้า FLUTEROL (ฟลูเทอรอล)

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้ชื่อว่า ฟลูติคาโซน (fluticasone) ผสมกับ แซลมเทอรอล (salmeterol)

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ใช้เพื่อรักษาโรคหอบหืด โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
ไม่ใช่ยาบรรเทาอาการหอบหืดเฉียบพลัน

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้ ฟลูติคาโซน หรือ แซลมเทอรอล หรือ ส่วนประกอบของยานี้

2.2 เพื่อความปลอดภัย ให้ออกแพทย์หากท่านมี ภาวะต่อไปนี้

- ใช้ยา สมุนไพร อาหารเสริมอื่นอยู่
- เป็นโรคหัวใจ หัวใจทำงานผิดปกติ หัวใจเต้นผิดปกติ
- ความดันเลือดสูง
- ต่อมไทรอยด์ทำงานมากผิดปกติ
- เป็นวัณโรค หรือ มีภาวะติดเชื้อที่ปอด
- เป็นโรคเบาหวาน
- วางแผนจะตั้งครรภ์ หญิงตั้งครรภ์ หรือ หญิงให้นมทารก

**เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร**

3. วิธีใช้ยา

3.1 ใช้ยานี้อย่างไร

- ใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกร หรือ ตามฉลากยาที่ได้รับจากโรงพยาบาล
- วิธีการใช้ยาสูดเข้าทางปาก ปฏิบัติดังนี้
 - วางแคปซูลลงในเครื่องพ่นยา
 - หายใจออกให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้ โดยระวังไม่ให้ลมหายใจเข้าสู่ช่องเปิดของเครื่องพ่นยา
 - วางปลายเครื่องพ่นยาระหว่างริมฝีปากแล้วหายใจเข้าโดยเร็วและลึก
 - นำเครื่องพ่นยาออก หุบปากแล้วกลืนหายใจไว้สักครู่จากนั้นจึงหายใจออกช้าๆ
 - ทิ้งแคปซูลที่ใช้แล้วและปิดอุปกรณ์ไว้เช่นเดิม
 - บ้วนปากด้วยน้ำสะอาด หรือ แปรงฟันทุกครั้งหลังพ่นยา เพื่อป้องกันการเกิดฝ้าขาวในช่องปาก

3.2 หากลืมใช้ยาควรทำอย่างไร

- ไม่ต้องพ่นยาที่ลืม แล้วพ่นยาในครั้งต่อไปตามเวลาปกติ
- ห้ามพ่นยาเพิ่มเพื่อชดเชย

3.3 ถ้าใช้ยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด และรีบไปโรงพยาบาลพร้อมยานี้หรือภาชนะบรรจุทันทีหากมีอาการผิดปกติ

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยานี้

- ไม่นำยานี้ให้ผู้อื่นใช้ แม้ว่าจะเป็นโรคหรือมีอาการเดียวกัน
- ใช้ยานี้อย่างต่อเนื่องตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกร ห้ามหยุดยาเอง เพราะอาจทำให้การรักษาไม่ได้ผล และอาการของโรคกำเริบ

- พบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตามผลการรักษา และผลข้างเคียงจากยา
- หากอาการของโรคแย่ลง หรือมีการกำเริบของอาการบ่อยขึ้น ควรแจ้งแพทย์หรือเภสัชกร

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วไปพบแพทย์ทันที

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีไข้
- ปวดบวม โดยมีไข้สูง หนาวสั่น ปวดเมื่อยร่างกาย เสมหะมากผิดปกติ ไอ และหายใจติดขัด

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์ทันที

- ปวดหัว
- ฝ้าขาวในช่องปากและลำคอ
- กล้ามเนื้อเป็นตะคริว

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บไว้ในภาชนะบรรจุเดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อย่าให้โดนแสงโดยตรง ควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส ไม่ควรเก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว พับมือเด็ก
- ปิดฝาทุกครั้งหลังใช้ ใช้ผ้าแห้งเช็ดทำความสะอาด
- ห้ามนำเครื่องไปล้างน้ำหรือใช้ผ้าเปียกเช็ดทำความสะอาด

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยา

- ฟลูเทอรอล ความแรง 250 ไมโครกรัม ฉลาก
กล่องสีเหลือง
- ฟลูเทอรอล ความแรง 500 ไมโครกรัม ฉลาก
กล่องสีเขียว
- ภายในกล่อง ประกอบด้วย เครื่องพ่นยา และขวด
บรรจุแคปซูลที่ไม่มีสี ภายในแคปซูลบรรจุผงสีขาว
หรือขาวออกเหลือง
- ส่วนประกอบอื่น ได้แก่ แลคโตส โมโนไฮเดรต

นำเข้าโดยบริษัท เอ็กเซลทิส (ประเทศไทย) จำกัด
กรุงเทพฯ ประเทศไทย

เอกสารฉบับนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุด 9 ตุลาคม 2562

