

เนราทีนิบ
ความแรง 40 มิลลิกรัม
ชนิดเม็ด
ชื่อการค้า Nerlynx (เนอรัลิ่งซ์)

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้มีชื่อว่าเนราทีนิบ Neratinib เป็นยาในกลุ่ม ยาต้านมะเร็งที่มีฤทธิ์ยับยั้งโปรตีนไคเนส

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ยานี้ใช้เพื่อรักษาเสริมของโรคมะเร็งเต้านม ซึ่งแพทย์ต้องตรวจแล้วว่าเหมาะสมที่จะใช้ยานี้

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้
- ห้ามใช้ในผู้ที่กำลังใช้ยาRifampicin(ไรแฟมพิซิน) (ยารักษาวัณโรค)
- ห้ามใช้ในผู้ที่กำลังใช้ยาCarbamazepine (คาร์บามาซีปีน) หรือPhenytoin (ฟีนีโทอิน) (ยากันชัก)
- ห้ามใช้ในผู้ที่กำลังใช้ยาสมุนไพรเซนต์จอห์นเวิร์ต (St John's wort)
- ห้ามใช้ในผู้เป็นโรคตับรุนแรง

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

- ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร ในกรณีต่อไปนี้
 - ท้องเสีย
 - ผู้ที่มีหรือเคยมีปัญหาที่ระบบทางเดินอาหาร ดับไต่ หัวใจหรือผิวหนัง
 - แจ้งแพทย์หากท่านกำลังตั้งครรภ์ วางแผนจะตั้งครรภ์ หรืออยู่ในระยะให้นมบุตร เพราะอาจทำให้เกิดอันตรายต่อทารก
 - หากท่านใช้ ยาอื่นๆ อาหารเสริมหรือสมุนไพร เช่น เกรปฟรุต ทับทิม เพราะอาจส่งผลต่อการรักษาของยานี้

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค
- กินยาในเวลาเดียวกันทุกวัน
- กินยาทั้งเม็ดพร้อมอาหาร แล้วดื่มน้ำตามมากๆ
- ห้ามเคี้ยว บด แยก หรือละลายก่อนกลืน

3.2 หากลืมกิน ยาควรทำอย่างไร

- กินยาครั้งถัดไปในเวลาเดิม ห้ามกินยาเพิ่มเป็น 2 เท่า

3.3 ถ้ากิน ยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- พบแพทย์ทันทีและนำขวดยาที่ เหลือไปด้วย แม้จะไม่มีอาการผิดปกติ
- อาจมีอาการท้องเสีย เวียนหัว คลื่นไส้และอ่อนเพลียได้

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- พบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตามผลการรักษาหรืออันตรายจากยา
- ห้ามหยุดยาเอง และให้ใช้ยานี้อย่างต่อเนื่องตามคำแนะนำของแพทย์
- แพทย์จะติดตามการรักษาต่อเนื่อง ซึ่งอาจเพิ่มหรือลดขนาดยาของท่านตามผลการรักษา
- ระมัดระวังการขับชี่ยานยนต์ การทำงานกับเครื่องจักรกล เพราะยานี้อาจทำให้เวียนหัว มึนงง เหนื่อยล้า

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

- ลมพิษ บวมที่ใบหน้า เปลือกตาริมฝีปาก
 - หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
 - ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีจ้ำตามผิวหนัง
- “ให้หยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที”

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์

- ท้องเสีย
- อ่อนเพลีย
- มึนงง
- มีไข้

“ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์”

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อบอุ่นให้โดนแสงโดยตรง โดยทั่วไปควรเก็บที่อุณหภูมิต่ำกว่า 30 องศาเซลเซียส ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

ลักษณะยา ยาเม็ดเคลือบฟิล์มสีแดง ทรงรีด้านหนึ่งมีรอยบาก “W104” และอีกด้านหนึ่งเป็นผิวเรียบ

- ตัวยาสำคัญ เนราทีนิบ
- ส่วนประกอบอื่น ๆ ได้แก่ แมนนิทอล(Mannitol) ไมโครคริสตัลไลน์ เซลลูโลส(Microcrystalline Cellulose) ครอสโพรโดน (Crospovidone) โพรโดน (Povidone) คลอลอยดอลซิลิโคนไดออกไซด์(Colloidal Silicone Dioxide) แมกนีเซียมสเตียเรท (Magnesium Stearate) สารเคลือบเม็ดยา โพลีไวนิลแอลกอฮอล์ (Polyvinyl Alcohol) ไทเทเนียมไดออกไซด์(Titanium Dioxide) โพลีเอทิลีน ไกลคอล (Polyethylene Glycol) ทาลคัม (Talcum) ไอออนออกไซด์ เรด (Iron oxide red)

ผู้ผลิต บริษัท เอ็กเซลลา จีเอ็มบีเอช ประเทศเยอรมนี

ผู้นำเข้า บริษัท ฟาร์มา ทู มาร์เก็ต จำกัด

ผู้แทนจำหน่าย บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ 15 พฤศจิกายน2567

ศึกษาข้อมูลยาเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.

- <https://ndi.fda.moph.go.th/>

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

คำเตือน : ยานี้อาจทำให้เกิดอันตรายร้ายแรงได้
ต้องใช้ภายใต้การควบคุมของแพทย์เท่านั้น