

ไฮโปรมेलโลส
ความแรง 3.00 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร
ยาหยอดตา
ชื่อการค้า MILTEAR (มิวเทียร์)

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้มีชื่อว่า ไฮโปรมेलโลส (hypromellose) เป็นยาในกลุ่มน้ำตาเทียมที่ไม่มีสารกันเสีย

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ใช้ทดแทนน้ำตาเพื่อรักษาอาการตาแห้งและบรรเทาอาการระคายเคืองของตาที่เกิดจากสาเหตุต่างๆ

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- ⊗ เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

- ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร ในกรณีต่อไปนี้
 - กำลังใช้ยาหยอดตาอื่นอยู่

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ล้างมือให้สะอาดก่อนใช้ยาหยอดตา
- ตรวจสอบสภาพของยาก่อนใช้
 - อย่าใช้ยานี้ถ้าภาชนะบรรจุอยู่ในสภาพไม่สมบูรณ์
 - อย่าใช้ยานี้ถ้ามีน้ำยา มีสี หรือขุ่น
- หักปลายหลอดเพื่อเปิดใช้
- เมื่อเปิดแล้วให้หยอดยาทันทีเพื่อป้องกันการปนเปื้อน
- หยอดตาข้างที่เป็นครั้งละ 1-2 หยด วันละ 3 ครั้งหรือตามที่ต้องการ
- ระวังไม่ให้ปลายหลอดสัมผัสกับดวงตาหรือสิ่งอื่น
- หยอดยา 2-3 หยด บนคอนแทคเลนส์ ก่อนใส่เลนส์เข้าตา เพื่อลดอาการระคายเคืองจากคอนแทคเลนส์

- ไม่จำเป็นต้องถอดคอนแทคเลนส์ก่อนใช้ยานี้
- ขนาดบรรจุ 0.3, 0.4 และ 0.5 มิลลิลิตร เมื่อหยอดยาเสร็จแล้วให้ทิ้งทันที ห้ามนำกลับมาใช้ซ้ำ
- ขนาดบรรจุ 0.8 และ 1 มิลลิลิตร หลังเปิดใช้ยาแล้วควรปิดจุกยาให้สนิท เก็บที่อุณหภูมิต่ำกว่า 30 องศาเซลเซียส และควรใช้ยาให้หมดภายใน 24 ชั่วโมง หลังการเปิดใช้ครั้งแรก
- หากใช้ยาหยอดตาหรือยาป้ายตาชนิดอื่นร่วมด้วย ควรใช้ห่างกัน 5-15 นาที

3.2 หากลืมหยอดตาควรทำอย่างไร

- หากยังมีอาการ ให้หยอดยาทันทีที่นึกขึ้นได้หรือตามต้องการ โดยไม่จำเป็นต้องเพิ่มยาเป็น 2 เท่า

3.3 ถ้าหยอดยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- โดยปกติการได้รับยานี้เกินขนาดไม่ก่อให้เกิดอันตราย หรือล้างออกด้วยน้ำสะอาด

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- งดการขยี้ขยาดตาหรือทำกิจกรรมที่ต้องใช้สายตา จนกว่าสายตาจะกลับมามองเห็นได้ปกติ เพราะยานี้อาจทำให้ตาพร่ามัวชั่วคราว
- ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรหากใช้ยาแล้วอาการตาแห้งไม่ดีขึ้นหรืออาการแยลง

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

- ลมพิษ บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีจุดตามผิวหนัง หรือเลือดออกผิดปกติ
- ปวดตา ตาแดง เป็นสะเก็ดที่ขอบเปลือกตา

"ให้หยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที"

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์

- ความสามารถในการมองเห็นลดลง ตาพร่ามัว
- ปวดตา ระคายเคืองตา รู้สึกเหมือนมีสิ่งแปลกปลอมในตา ตาแดง

"ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์"

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อบอุ่น โดยทั่วไปควรเก็บที่อุณหภูมิต่ำกว่า 30 องศาเซลเซียส ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

- ลักษณะของยา น้ำยาปราศจากเชื้อ ใส ไม่มีสี บรรจุในหลอดพลาสติก หลอดละ 0.3, 0.4, 0.5, 0.8 และ 1 มิลลิลิตร
- ตัวยาสำคัญ ไฮโปรมेलโลส
- ส่วนประกอบอื่นๆ ได้แก่ กรดบอริก, โซเดียมบอเรต, โซเดียมคลอไรด์, โพแทสเซียมคลอไรด์, แมกนีเซียมคลอไรด์, แคลเซียมคลอไรด์, ซิงค์ซัลเฟต, กรดไฮโดรคลอริก, โซเดียมไฮดรอกไซด์, น้ำ

ผู้ผลิตและผู้แทนจำหน่าย

บริษัท มิลลิเมต บีเอฟเอส จำกัด
179 หมู่ที่ 8 ตำบลบางาม อำเภอเวียงชัย
จังหวัดเชียงราย 57210
Call center 0 2945 9555

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ 27 พฤษภาคม 2565

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.

- <http://www.fda.moph.go.th/sites/oss/Pages/Main.aspx>
- <http://ndi.fda.moph.go.th/>

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร