

ลูบิพรอสโตน 8 ไมโครกรัม
ลูบิพรอสโตน 24 ไมโครกรัม
ชนิดแคปซูลนิม
(อามิทixa)

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อสามัญอะไร

- ยานี้มีชื่อว่า ลูบิพรอสโตน (Lubiprostone) ชนิดสี่ขมพูมียา 8 ไมโครกรัม และชนิดสี่เหลี่ยมมียา 24 ไมโครกรัม เป็นยาในกลุ่มยาระบาย

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- **ชนิดสี่เหลี่ยมขนาด 24 ไมโครกรัม** ใช้รักษาอาการท้องผูกเรื้อรังในผู้ป่วยอายุ 18 ปีขึ้นไป ซึ่งแพทย์วินิจฉัยว่าเหมาะสมที่จะใช้ยานี้
- **ชนิดสี่ขมพูขนาด 8 ไมโครกรัม** ใช้รักษาโรคลำไส้แปรปรวนชนิดท้องผูกเด่นในสตรีอายุ 18 ปี ขึ้นไป

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้
- มีภาวะทางเดินอาหารอุดตัน หรือสงสัยว่าอุดตัน

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

- แจ้งแพทย์และเภสัชกรก่อนใช้ยานี้หากท่านมีอาการท้องเสียรุนแรง แพ้น้ำตาลบางชนิด ตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้ ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกร เพราะแพทย์ต้องวินิจฉัยสาเหตุของโรคเพื่อกำหนดขนาดและระยะเวลาในการใช้ยา

- กินยาทั้งแคปซูล ห้ามเคี้ยว บดหรือเปิดแคปซูล
- กินยาพร้อมอาหารและดื่มน้ำตามเพื่อลดอาการคลื่นไส้ อาเจียนที่เกิดจากยานี้

3.2 หากลืมกินยาควรทำอย่างไร

- ไม่กินยามื้อที่ลืม ให้รอกินมื้อต่อไป ห้ามกินยาเพิ่มเป็น 2 เท่า

3.3 ถ้าได้รับยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ไปพบแพทย์หรือเภสัชกรทันที ถ้าทำได้ให้นายาที่ติดตัวไปด้วย

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- พบแพทย์ตามนัด เพื่อติดตามผลการรักษา
- ห้ามหยุดยาเอง และให้กินยาน้อยอย่างต่อเนื่องตามคำแนะนำของแพทย์ หรือเภสัชกร
- หากใช้ยานี้แล้วปวดท้องมาก ให้ไปพบแพทย์ เพื่อตรวจภาวะอุดตันที่ทางเดินอาหาร
- แจ้งแพทย์หากมีอาการคลื่นไส้รุนแรงเมื่อใช้ยานี้

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีจุดตามผิวหนังหรือเลือดออกผิปกติ
- ท้องเสียรุนแรง
- วูบหรือความดันเลือดต่ำเมื่อกินยาครั้งแรกหรือหลังกินยาแล้วหลายครั้ง
- หายใจลำบากภายใน 1 ชั่วโมงที่กินยาครั้งแรก ซึ่งอาการจะดีขึ้นภายใน 3 ชั่วโมง และอาจเกิดซ้ำเมื่อกินยาครั้งต่อไป

“ให้หยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที”

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์ทันที

- ท้องอืด ท้องเฟ้อ ปวดท้อง ท้องเสีย
- คลื่นไส้ อาเจียน ปวดศีรษะ มึนงง

“ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรง ให้ไปพบแพทย์”

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บไว้ในภาชนะบรรจุเดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อย่านำให้โดนแสงโดยตรง โดยทั่วไปควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก
- เกะยาออกจากแผงเมื่อกินในแต่ละครั้งเท่านั้น

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

ยานี้เป็นยาแคปซูลนิมรูปร่างยาวรี ด้านหนึ่งมีตัวอักษร “SPI” พิมพ์ด้วยหมึกสีดำ อีกด้านหนึ่งเรียบ ยานี้มีสองขนาดความแรง ชนิดสี่ขมพูประกอบด้วยตัวยาลูบิพรอสโตน 8 ไมโครกรัม และชนิดสี่เหลี่ยมประกอบด้วยตัวยาลูบิพรอสโตน 24 ไมโครกรัม

ส่วนประกอบของยานี้

มีเตียมเซนไตรกลีเซอไรด์

ส่วนประกอบของเจลาตินแคปซูล

เจลาติน สารละลายซอร์บิทอลซอร์บิเทน ไทเทเนียมไดออกไซด์ (อี171) เฟอริคออกไซด์ (อี172) หมึกโอพาโค้ด ดับบีบี แบลค สำหรับยาแคปซูล 8 ไมโครกรัม

เอฟดี แอนด์ ซี เรด เบอร์ 40 (อี129) ดี แอนด์ ซี เบลโล่ เบอร์ 10 หมึกโอพาโค้ด ดับบีบี แบลค สำหรับยาแคปซูล 24 ไมโครกรัม

ผู้ผลิต/ผู้นำเข้า/ผู้แทนจำหน่าย

ผู้ผลิต: Catalent Pharma Solutions, LLC, USA

ผู้นำเข้า: บริษัท ทาเคดา(ประเทศไทย)จำกัด, กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

ผู้แทนจำหน่าย: บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด, กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ **21 กุมภาพันธ์ 2562**

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร