

คานากลิฟลอสิน
100 มิลลิกรัม
ชนิดเม็ดเคลือบฟิล์ม
ชื่อการค้า CANAGLU®
(คานากลู)

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้มีชื่อว่า คา-นา-กลี-ฟลอสิน (canagliflozin)

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ใช้ร่วมกับการควบคุมอาหารและการออกกำลังกายเพื่อควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานประเภทที่ 2
- ใช้ร่วมกับยาลดน้ำตาลชนิดอื่น เช่น ซัลโฟนิลยูเรีย, เมทฟอร์มิน

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้

2.2 เพื่อความปลอดภัย ให้ออกแพทย์หากท่านมีภาวะต่อไปนี้

- ใช้ยา สมุนไพร อาหารเสริมอื่นอยู่
- เป็นเบาหวานประเภทที่ 1
- โรคไตหรือมีปัญหาเกี่ยวกับไต หรือต้องฟอกไต

- ดื่บมีปัญหาหรือทำงานผิดปกติอย่างรุนแรง
- โรคหัวใจหรือโรคหลอดเลือดสมอง
- ตั้งครรภ์หรือกำลังให้นมทารก
- เคยได้รับการรักษาโดยการตัดเท้าหรือตัดนิ้วเท้า
- เคยเกิดภาวะ "เลือดเป็นกรดจากคีโตนจากโรคเบาหวาน" โดยมีอาการ กินและหิวบ่อย กระหายน้ำ น้ำหนักลดรวดเร็วไม่ทราบสาเหตุ หายใจหอบลึก ได้กลิ่นหวานผิดปกติเวลาหายใจ ปากและลิ้นได้รสโลหะหรือหวานผิดปกติ

"สอบถามแพทย์หรือเภสัชกร
ถ้าไม่แน่ใจว่ามีภาวะดังกล่าวหรือไม่"

3. วิธีใช้ยา

3.1 กินยานี้อย่างไร

- กินยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกร หรือตามฉลากยาที่ได้รับจากโรงพยาบาล

3.2 หากลืมกินยาควรทำอย่างไร

- กินยาที่ลืมทันทีที่นึกขึ้นได้ แต่หากใกล้เวลาที่ต้องกินอีกครั้งไม่ต้องกินยาที่ลืมแล้วกินต่อไปตามปกติ
- ห้ามกินยาเพิ่มเพื่อชดเชย เพราะยาอาจเกินขนาด

3.3 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด และรีบไปโรงพยาบาลพร้อมยานี้หรือภาชนะบรรจุทันทีหากมีอาการผิดปกติ

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- ห้ามนำยานี้ให้ผู้อื่นกิน ถึงแม้ว่าจะมีอาการหรือโรคเช่นเดียวกัน
- ห้ามหยุดยาหรือปรับขนาดยาเอง ควรกินยานี้อย่างต่อเนื่องตามคำแนะนำของแพทย์ หรือเภสัชกร เพื่อผลการรักษาที่ดีที่สุด
- กินยาทุกวันในเวลาเดิมหรือใกล้เคียง จะช่วยให้ไม่ลืมกินยาได้
- พบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตามผลการรักษาหรือผลจากการใช้ยา
- คุมกำเนิดหรือหลีกเลี่ยงการตั้งครรภ์ ระหว่างการใช้ยานี้ เพราะยาอาจส่งผลเสียต่อทารกหากตั้งครรภ์
- ควรติดตามเท้าอย่างสม่ำเสมอ เพราะมีรายงานการศึกษาว่าการใช้ยานี้อาจเพิ่มความเสี่ยงในการรักษาโดยการตัดเท้าหรือนิ้วเท้าได้
- คุมอาหารและออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ เพื่อผลการรักษาและสุขภาพของท่าน

(เยลโลว์เฟอริกออกไซด์), red ferric oxide (เรดเฟอริกออกไซด์)

ผู้ผลิต
บริษัท มิตรชุบิชิ ทานาเบะ ฟาร์มา แพลทอริ จำกัด ประเทศญี่ปุ่น

นำเข้าโดย/ผลิตภัณฑ์ของ
บริษัท มิตรชุบิชิ ทานาเบะ ฟาร์มา (ไทยแลนด์) จำกัด
กรุงเทพฯ ประเทศไทย

หากต้องการรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่สงสัยเกิดจากการใช้ยา กรุณาติดต่อบริษัทฯผ่านอีเมล drugsafety@ml.mt-pharma-th.com

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ 17 พฤศจิกายน 2566

“โปรดอ่านเอกสารกำกับยาสำหรับแพทย์ฉบับเต็มได้ทางเว็บไซต์ของ อย. <http://ndi.fda.moph.go.th/>”

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีไข้
- กินและหิวบ่อย กระหายน้ำ น้ำหนักลด รวดเร็วไม่ทราบสาเหตุ หายใจหอบลึก ได้กลิ่นหวานผิดปกติเวลาหายใจ ปากและลิ้นได้รสโลหะหรือหวานผิดปกติ ซึ่งเป็นอาการของภาวะ “เลือดเป็นกรดจากคีโตนจากโรคเบาหวาน”

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์ทันที

- คันที่ช่องคลอด ตกขาวมีกลิ่นหรือสีผิดปกติ หรือมีผื่นแดงที่อวัยวะเพศชาย
- บั๊สสาวะมากหรือบ่อยผิดปกติ บั๊สสาวะแสบขัด ปวดเวลาบั๊สสาวะ หรือบั๊สสาวะไม่สุด
- ท้องผูก คลื่นไส้

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บไว้ในภาชนะบรรจุเดิมตามที่ได้รับมา

- เก็บยาในที่แห้ง อย่าให้โดนแสงโดยตรง ควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส ไม่ควรเก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยา

- **ลักษณะยา**
เม็ดกลม นูนทั้งสองด้าน สีเหลือง
- **ตัวยาสำคัญ** คา-นา-กลี-ฟลอ-ซิน (canagliflozin)
- **สารประกอบที่ไม่มีฤทธิ์** : D-Mannitol (ดี - แมนนิทอล) , hydroxypropylcellulose (ไฮดรอกซีโพรพิลเซลลูโลส), croscarmellose sodium (ครอสคาร์เมลโลสโซเดียม), sodium stearyl fumarate (โซเดียมสเตียริลฟูมาเรต), talc (ทัลค))
- **นอกจากนี้ ส่วนเคลือบเม็ดยาประกอบด้วย** polyvinyl alcohol (partially hydrolyzed) (โพลีไวนิลแอลกอฮอล์ที่ผ่านการไฮโดรไลซ์บางส่วน), macrogol 4000 (แมโครกอล 4000), titanium oxide (ไทเทเนียมออกไซด์), talc (ทัลค), yellow ferric oxide

คำเตือนตามประกาศกระทรวง สาธารณสุข

1. ห้ามใช้ในผู้ที่เคยแพ้ยานี้
2. ห้ามใช้รักษาโรคเบาหวานชนิดที่ 1 ผู้ป่วยภาวะ ketoacidosis ผู้ป่วยภาวะติดเชื้อรุนแรง ผู้ป่วยได้รับอุบัติเหตุรุนแรง
3. สตรีมีครรภ์ควรหลีกเลี่ยงการใช้ยานี้ และสตรีให้นมบุตรระมัดระวังในการใช้ยานี้
4. ไม่ควรใช้ยานี้ร่วมกับเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
5. หากผู้ป่วยมีอาการ คลื่นไส้ อาเจียน เบื่ออาหาร ปวดท้อง หิว น้ำผิวดำมืด อ่อนเพลีย หายใจลำบาก สับสน แม้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงไม่มาก ให้รีบปรึกษาแพทย์ หรือเภสัชกรเนื่องจากอาจเกิดอาการ diabetic ketoacidosis
6. ควรระมัดระวังการติดเชื้อแบคทีเรีย และเชื้อราที่อวัยวะเพศ และระบบทางเดินปัสสาวะในผู้ป่วยที่ใช้ยานี้

**เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร**