

เอกสารกำกับยาสำหรับประชาชน

น้ำยาสกัดจากขนแมว
ความแรง 10,000 AU/ml
ชนิด ยาน้ำใส
AllerVACtest® CAT
(อัลเลอร์แว็กซ์เทสต์® แมว)

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้มีชื่อว่า Cat hair Allergen Extract มีตัวยา 10,000 AU/ml

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ยานี้ใช้เพื่อ ใช้ในการตรวจวินิจฉัยสำหรับผู้สงสัยว่าจะเป็นโรคภูมิแพ้ขนแมวด้วยวิธีสะกิด (skin prick test)

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ส่วนประกอบอื่นๆของยานี้ ที่ไม่ใช่ตัวยาสำคัญตามที่ระบุในหัวข้อที่ 7
- ผู้ป่วยที่จำเป็นต้องใช้ยาแก้แพ้เป็นประจำ
- ผู้ป่วยที่มีโรคทางผิวหนัง

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

- ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร ในกรณีต่อไปนี้
 - เมื่อดังครรภ์ หรือวางแผนจะตั้งครรภ์
 - ผู้ป่วยที่ได้รับยาในกลุ่มต่อไปนี้ Beta-blocker เช่น ยา Atenolol ที่ใช้สำหรับรักษาโรคความดันโลหิตสูง หรือโรคหัวใจ ACEI เช่น ยา enalapril ที่ใช้สำหรับรักษาโรคความดันโลหิตสูง

- ผู้ป่วยที่มีประวัติการเกิดอาการแพ้แบบเฉียบพลันรุนแรงจากการตรวจวินิจฉัยโรคภูมิแพ้ด้วยวิธีสะกิดมาก่อน
- ผู้ป่วยที่เกิดภาวะลมพิษหลังจากโดนขีดข่วนที่ผิวหนัง หรือที่เรียกว่า Dermatographis
- ผู้ป่วยที่มีภาวะเจ็บเค้นหน้าอก เนื่องจากหัวใจขาดเลือด
- ผู้ป่วยที่รับประทานยาต้านฮีสตามีน (Anti histamine) และยากลุ่มคอร์ติโคสเตียรอยด์ (Corticosteroids) ทั้งรูปแบบใช้ภายใน (ขนาดมากกว่า 20 มก./วัน) และรูปแบบใช้ภายนอก ต้องหยุดใช้ยาดังกล่าวเป็นเวลาอย่างน้อย 7 วันก่อนทำการทดสอบ เนื่องจากอาจทำให้ผลการทดสอบผิดพลาดได้

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- **ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือ เภสัชกรเท่านั้น** เนื่องจากขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค
- **การใช้ยาตรวจวินิจฉัยภูมิแพ้ด้วยวิธีสะกิด จะกระทำภายใต้การดูแลของแพทย์เท่านั้น** ซึ่งมีการเตรียมอุปกรณ์ช่วยชีวิต ในกรณีที่เกิดปฏิกิริยาภูมิแพ้ขึ้น
- การใช้ยานี้ แพทย์ผู้ทำการทดสอบ จะทำการหยดน้ำยา 1 หยดลงบนผิวหนังที่ทำความสะอาดแล้ว หลังจากนั้นใช้เข็มสะกิดเบาๆ ผ่านหยดสารและให้อยู่ในชั้นหนังกำพร้า หรือใช้อุปกรณ์เฉพาะโดยไม่ให้มีเลือดออก หลังจากนั้นจึงเช็ดน้ำยาออก จากนั้นรออ่านผลโดยที่น้ำยาควบคุมผลบวกอ่านผลหลังการทดสอบ 10-15 นาที น้ำยาสกัดจากสารก่อภูมิแพ้ (Allergen extract) อ่านผลหลังการทดสอบ 15-20 นาที

หากมีอาการแพ้ จะเกิดผื่นแดง และรอยนูนตรงตำแหน่งที่ทดสอบ

3.2 ถ้าใช้ยานี้เกินขนาดที่แนะนำควรทำอย่างไร

- เนื่องจากการทดสอบภูมิแพ้ทางผิวหนัง เป็นการให้ผู้ป่วยสัมผัสสารก่อภูมิแพ้ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นอาจทำให้เกิดอาการคัน ซึ่งจะลดลงหลังการทดสอบ แต่หากมีอาการคันมากสามารถใช้แอลกอฮอล์เช็ด ยกเว้นกรณีผิวหนังแห้งหรือมีสภาวะที่ไม่สามารถสัมผัสแอลกอฮอล์อาจทาครีมเพื่อลดอาการคันได้ เช่น ครีมที่มีส่วนผสมของยูเรีย หรือ unctioning หรือให้รับประทานยาแก้แพ้

แต่หากเกิดปฏิกิริยาแพ้ทั่วๆไป ควรอยู่ในความดูแลของแพทย์ในที่มีความพร้อมในการดูแล

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- หลังจากจากการเริ่มการทดสอบภูมิแพ้โดยวิธีสะกิด ผู้ป่วยควรอยู่ในความดูแลของแพทย์ในที่มีความพร้อมในการดูแลต่ออีกอย่างน้อย 20 นาทีหลังการทดสอบ

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วแจ้งแพทย์ทันที

- ลมพิษบวมที่ใบหน้าเปลือกตา ริมฝีปาก
- หน้ามืดเป็นลม แน่นหน้าอกหายใจลำบาก
- ผื่นแดงตุ่มพองผิวหนังหลุดลอก มีจ้ำตามผิวหนังหรือเลือดออกผิดปกติ
- หัวใจเต้นเร็วผิดปกติ

“ให้หยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที”

5. อาการที่อาจเกิดขึ้นได้ เช่น

- เกิดผื่นแดง และรอยนูน ตรงตำแหน่งที่ทดสอบซึ่งเป็นเรื่องปกติ หากเกิดผลบวกจากการทดสอบ
- อาการอื่นๆที่อาจเกิดขึ้นในผู้ทดสอบได้เช่น เป็นลม เวียนศีรษะ นอกจากนี้อาจเกิดการบวมบริเวณที่ทดสอบทำให้เกิดการปวดตามมาได้

“หากมีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์”

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อย่าให้โดนแสงโดยตรง โดยทั่วไป ควรเก็บที่อุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก
- เก็บยานี้ไว้ในตู้เย็น ห้ามแช่แข็ง
- ยานี้เก็บไว้ที่โรงพยาบาล ท่านจะไม่ได้รับกลับบ้าน

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

ยาน้ำใส ไม่มีสีจนถึงสีเหลืองอ่อนบรรจุโดยวิธีปราศจากเชื้อในขวดแก้วสีชา ขวดละ 2 มิลลิลิตร

ส่วนประกอบสำคัญ คือ

CAT hair Allergen Extract

10,000 AU/ml

ส่วนประกอบอื่นๆในตำรับ ได้แก่

Sodium chloride

Dibasic sodium phosphate

Monobasic potassium phosphate

Phenol

Glycerin

Water for injection

ผู้ผลิต : บริษัทโรงงานเภสัชกรรมเกร็ดเตอร์ฟาร์มา จำกัด
 เลขที่ 55/2,55/11 หมู่ที่ 1 ถนนบางเตย-วัดสุวรรณ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โทร. 0-28868190-9

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ 5 กุมภาพันธ์ 2562

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
 หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

เอกสารสำหรับตรวจติดตามข้อมูลในเอกสารกำกับยา *AllerVACtest® CAT*

ข้อมูลยืนยันตัวตนเอกสารกำกับยา

หัวข้อ	ข้อมูล
Trade Name	AllerVACtest® CAT
Generic name	CAT Hair Allergen Extract
Dosage form	Solution
Strength	10,000 AU/ml
TMT-TPU	-
WHO ATC	V01AA01
Update date	
PIL version	

ข้อมูลผู้จัดทำเอกสารกำกับยา

หัวข้อ	ข้อมูล
ผู้รับผิดชอบหลัก	Tharit Moohummad

เอกสารอ้างอิง

	ชื่อฐานข้อมูล	ชื่อผลิตภัณฑ์	Last update	Access date
1	eMC - SmPC	-		
2	eMC - PIL	Prick Test Solutions Allergen Extracts for Skin Prick Testing	01/2017	02/2019
3	IBM Micromedex	-		
4	Lexicomp	-		

Content tracking

ส่วนต้นของเอกสาร

ข้อมูลจากแหล่งอ้างอิง	ข้อมูลที่น่าไปใส่ใน PIL
SmPC . ชื่อผลิตภัณฑ์ อัลเลอร์แน็กเทสต์® แมว 2. ชื่อและความแรงของตัวยาสำคัญ น้ำยาสกัดจาก Cat hair 10,000 BAU/ml 3. ลักษณะของผลิตภัณฑ์ น้ำใส ไม่มีสีจนถึงสีเหลืองอ่อน	น้ำยาสกัดจากขนแมว ชนิดย่น้ำใส AllerVACtest® CAT (อัลเลอร์แน็กเทสต์® แมว)

1. ยานี้คืออะไร

ข้อมูลจากแหล่งอ้างอิง	ข้อมูลที่นำไปใส่ใน PIL
SmPC น้ำยาสกัดจาก Cat hair 10,000 BAU/ml	1.1 ยานี้มีชื่อว่า CAT Hair Allergen Extract มีตัวยา 10,000 AU/ml
SmPC 5. ข้อบ่งใช้ ใช้ในการตรวจวินิจฉัยสำหรับผู้สงสัยว่าจะเป็นโรคภูมิแพ้ขนแมวด้วยวิธีสะกิด (skin prick test)	1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร ยานี้ใช้เพื่อใช้ในการตรวจวินิจฉัยสำหรับผู้สงสัยว่าจะเป็นโรคภูมิแพ้ขนแมวด้วยวิธีสะกิด (skin prick test)

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

ข้อมูลจากแหล่งอ้างอิง	ข้อมูลที่นำไปใส่ใน PIL
SmPC ข้อห้ามใช้ห้ามทำการทดสอบปฏิกิริยาภูมิแพ้โดยการสะกิดกับผู้ป่วยที่ไม่สามารถหยุดยา antihistamine ได้ และผู้ป่วยที่มีภาวะ generalized skin disease หรือ dermatographism, สตรีมีครรภ์, ผู้ป่วย unstable angina หรือผู้ที่มีประวัติการเกิด anaphylaxis ในการทดสอบทางผิวหนังมาก่อน ห้ามทำการทดสอบปฏิกิริยาภูมิแพ้โดยการสะกิดใน ผู้ป่วยที่ได้รับยา beta- blockers และ angiotensin converting enzyme(ACE) inhibitor เนื่องจากอาจรบกวนการตอบสนองต่อการรักษาด้วย adrenaline(epinephrine) กรณีเกิดปฏิกิริยาภูมิแพ้ทั่วกาย(Systemic reaction) Pregnancy Category : C	2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร <ul style="list-style-type: none"> ● เคยแพ้ส่วนประกอบอื่นๆของยานี้ ที่ไม่ใช่ตัวยาสำคัญ ● ผู้ป่วยที่จำเป็นต้องใช้ยาแก้แพ้เป็นประจำ ● ผู้ป่วยที่มีโรคทางผิวหนัง 2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้ หากท่านมีภาวะต่อไปนี้ <ul style="list-style-type: none"> ● เมื่อตั้งครรภ์ หรือวางแผนจะตั้งครรภ์ ● ผู้ป่วยที่ได้รับยาในกลุ่มต่อไปนี้ Beta-blocker เช่น ยา Atenolol ที่ใช้สำหรับรักษาโรคความดันโลหิต

	<p>สูง หรือโรคหัวใจ</p> <p>ACEI เช่น ยา enalaprilที่ใช้สำหรับรักษาโรคความดันโลหิตสูง</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ผู้ป่วยที่มีประวัติการเกิดอาการแพ้แบบเฉียบพลันรุนแรงจากการตรวจวินิจฉัยโรคภูมิแพ้ด้วยวิธีสะกิดมาก่อน ● ผู้ป่วยที่เกิดภาวะลมพิษหลังจากโดนขีดข่วนที่ผิวหนัง หรือที่เรียกว่า Dermatographism ● ผู้ป่วยที่มีภาวะเจ็บคั่นหน้าอก เนื่องจากหัวใจขาดเลือด
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. วิธีใช้ยา

ข้อมูลจากแหล่งอ้างอิง	ข้อมูลที่นำไปใช้ใน PIL
<p>e-MC PIL</p> <p>The prick test will be performed under the supervision of a qualified doctor. They will be equipped with full facilities for cardiorespiratory resuscitation to deal with any severe reaction to the test.</p> <p>SmPC</p> <p>6.ขนาดยาที่แนะนำ และวิธีการใช้ยา</p> <p>หยดน้ำยา 1 หยดลงบนผิวหนังของผู้ป่วยที่ทำความสะอาดแล้ว ใช้เข็มสะกิดเบาๆ ผ่านหยดสารและให้อยู่ในชั้นหนังกำพร้า หรือใช้อุปกรณ์เฉพาะโดยไม่ให้มีเลือดออก หลังจากนั้นจึงเช็ดน้ำยาออก จากนั้นรออ่านผล</p> <p>- กรณีน้ำยาควบคุมผลบวก(Histamine) อ่านผลหลังการทดสอบ 10-15 นาที</p>	<p>3.1 ขนาดและวิธีใช้</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือ เกสัชกร เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค ● การใช้ยาตรวจวินิจฉัยภูมิแพ้ด้วยวิธีสะกิด จะกระทำภายใต้การดูแลของแพทย์เท่านั้น ซึ่งมีการเตรียมอุปกรณ์ช่วยชีวิต ในกรณีที่เกิดปฏิกิริยาภูมิแพ้ขึ้น ● การใช้ยานี้ แพทย์ผู้ทำการทดสอบ จะทำการหยดน้ำยา 1 หยดลงบนผิวหนังที่ทำความสะอาดแล้ว หลังจากนั้นใช้เข็มสะกิดเบาๆ ผ่านหยดสารและให้อยู่ในชั้นหนังกำพร้า หรือใช้อุปกรณ์เฉพาะโดยไม่ให้มีเลือดออก หลังจากนั้นจึงเช็ดน้ำยาออก จากนั้นรออ่านผลโดยที่

<p>- ฤทธิ์น้ำยาสกัดจากสารก่อภูมิแพ้ (Allergen extract) อ่านผลหลังการทดสอบ 15-20 นาที</p>	<p>- น้ำยาควบคุมผลบวกอ่านผลหลังการทดสอบ 10-15 นาที - น้ำยาสกัดจากสารก่อภูมิแพ้ (Allergen extract) อ่านผลหลังการทดสอบ 15-20 นาที หากมีอาการแพ้ จะเกิดผื่นแดง และรอยนูนตรงตำแหน่งที่ทดสอบ</p>
-	<p>3.2 หากลิ้มกินยาควรทำอย่างไร</p> <p>-</p>
<p>SmPC</p> <p>12. การได้รับยาเกินขนาด และวิธีการรักษา</p> <p>เนื่องจากการทดสอบภูมิแพ้ทางผิวหนัง เป็นการให้ผู้ป่วยสัมผัสสารก่อภูมิแพ้ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นอาจทำให้เกิดอาการคัน ซึ่งจะลดลงหลังการทดสอบ แต่หากมีอาการคันมากสามารถใช้ แอลกอฮอล์เช็ด ยกเว้นกรณีผิวหนังหรือมีสภาวะที่ไม่สามารถสัมผัสแอลกอฮอล์อาจทาครีมเพื่อลดอาการคันได้ เช่น ครีมที่มีส่วนผสมของยูเรีย หรือ ถูน้ำแข็ง(ice-pack) หรือให้รับประทานยา antihistamine</p> <p>แต่หากเกิดปฏิกิริยาแพ้ทั่วกาย ควรอยู่ในความดูแลของแพทย์ในที่มีความพร้อมในการดูแล</p>	<p>3.3 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร</p> <p>เนื่องจากการทดสอบภูมิแพ้ทางผิวหนัง เป็นการให้ผู้ป่วยสัมผัสสารก่อภูมิแพ้ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นอาจทำให้เกิดอาการคัน ซึ่งจะลดลงหลังการทดสอบ แต่หากมีอาการคันมากสามารถใช้แอลกอฮอล์เช็ด ยกเว้นกรณีผิวหนังหรือมีสภาวะที่ไม่สามารถสัมผัสแอลกอฮอล์อาจทาครีมเพื่อลดอาการคันได้ เช่น ครีมที่มีส่วนผสมของยูเรีย หรือ ถูน้ำแข็งหรือให้กินยาแก้แพ้</p> <p>แต่หากเกิดปฏิกิริยาแพ้ทั่วกาย ควรอยู่ในความดูแลของแพทย์ในที่มีความพร้อมในการดูแล</p>

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

ข้อมูลจากแหล่งอ้างอิง	ข้อมูลที่นำไปใช้ใน PIL
<p>SmPC</p> <p>8. คำเตือนและข้อควรระวัง</p> <p>ผู้ป่วยควรอยู่ในความดูแลของแพทย์ในที่มีความพร้อมในการดูแลต่ออีกอย่างน้อย 20 นาที หลังการทดสอบ</p>	<p>หลังจากจากการเริ่มการทดสอบภูมิแพ้โดยวิธีสะกิด ผู้ป่วยควรอยู่ในความดูแลของแพทย์ในที่มีความพร้อมในการดูแลต่ออีกอย่างน้อย 20 นาทีหลังการทดสอบ</p>

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

ข้อมูลจากแหล่งอ้างอิง	ข้อมูลที่น่าไปใส่ใน PIL
<p>e-MC PIL</p> <p>Get urgent medical treatment immediately if you notice a severe allergic reaction, known as anaphylactic shock, after having the prick test. Symptoms include:</p> <ul style="list-style-type: none"> • General itching and feeling of heat – especially affecting scalp, mouth, throat, palms or soles • Severe wheezing, or noisy or difficult breathing • Severe hives/nettle rash • Swelling of the lips or throat • Pale or greyish skin colour • A fast heart beat • Faintness or collapse 	<p>5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบแจ้งแพทย์ทันที</p> <ul style="list-style-type: none"> • บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ • หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก • ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีจ้ำตามผิวหนัง หรือเลือดออก ผิดปกติ • หัวใจเต้นเร็วผิดปกติ
<p>SmPC</p> <p>11. อาการไม่พึงประสงค์</p> <p>แม้การทดสอบภูมิแพ้แบบ skin prick test ถือว่ามีความปลอดภัย มีอัตราการเกิดอาการไม่พึงประสงค์แบบปฏิกิริยาแพ้ทั่วกาย (systemic reaction) 0.03 % อัตราการเกิดปฏิกิริยาแพ้รุนแรงน้อยกว่า 0.02% และยังไม่มียางานการเสียชีวิตอย่างไรก็ตามการทดสอบภูมิแพ้ทางผิวหนัง เป็นการให้ผู้ป่วยสัมผัสสารก่อภูมิแพ้โดยตรง ดังนั้นการเกิดผลบวกในรูปผื่นแดง (flare) และรอยบวม (wheal) ตรงตำแหน่งที่</p>	<p>5.2 อาการที่อาจเกิดขึ้นได้ เช่น ...</p> <p>เกิดผื่นแดง และรอยบวม ตรงตำแหน่งที่ทดสอบซึ่งเป็นเรื่องปกติ หากเกิดผลบวกจากการทดสอบ อาการอื่นๆที่อาจเกิดขึ้นในผู้ทดสอบได้เช่น เป็นลม เวียนศีรษะ นอกจากนี้ อาจเกิดการบวมบริเวณที่ทดสอบทำให้เกิดการปวดตามมาได้</p> <p>หากมีอาการรุนแรงหรือทนไม่ได้ ให้ไปพบแพทย์</p>

<p>ทดสอบจึงเป็นเรื่องปกติอาการไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นในผู้ทดสอบที่มีความกังวลอาจเกิดขึ้นได้เช่น เป็นลม เวียนศีรษะ ดังนั้นการทดสอบภูมิแพ้ควรทำในสถานที่ที่มีอุปกรณ์และยาที่จะใช้รักษาอยู่พร้อม นอกจากนี้ อาจเกิดการบวมบริเวณที่ทดสอบ(the late phase response) ทำให้เกิดการปวด ซึ่งมักเกิดจากการทดสอบภูมิแพ้ทางผิวหนังโดยวิธีฉีดเข้าผิวหนัง(Intradermal testing)มากกว่า</p>	
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

ข้อมูลจากแหล่งอ้างอิง	ข้อมูลที่น่าไปใส่ใน PIL
Special precautions for storage	<ul style="list-style-type: none"> เก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา เก็บยาในที่แห้ง อย่าให้โดนแสงโดยตรง โดยทั่วไปควรเก็บที่อุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว เก็บยาให้พ้นมือเด็ก เก็บยานี้ไว้ในตู้เย็น ห้ามแช่แข็ง ยานี้เก็บไว้ที่โรงพยาบาล ท่านจะไม่ได้รับกลับบ้าน
	<p>ผู้ผลิต: บริษัทโรงงานเภสัชกรรมเกร็ดเตอร์ฟาร์ม่า จำกัด เลขที่ 55/2,55/11 หมู่ที่ 1 ถนนบางเตย-วัดสุวรรณ ตำบลศาลายา อำเภอ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โทร. 0-28868190-9</p>
	เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ 5 กุมภาพันธ์ 2562

Active ingredient (AllerVACtest® CAT)

ข้อมูลจากแหล่งอ้างอิง	CAS no.	ข้อมูลที่น่าไปใส่ใน PIL
-	-	CAT Hair Allergen Extract

Inactive ingredient (AllerVACtest® CAT)

ข้อมูลจากแหล่งอ้างอิง	CAS no.	ข้อมูลที่นำไปใส่ใน PIL
-	7440-23-5	Sodium chloride
-	7558-79-4	Dibasic sodium phosphate
-	7778-77-0	Monobasic potassium phosphate
-	108-95-2	Phenol
-	56-81-5	Glycerin
-	7732-18-5	Water for injection