

บริษัท นิบ
ความแรง 30, 90, 180 มิลลิกรัม
ชนิดเม็ด
ชื่อการค้า Alunbrig (อลันบริก)

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้มีชื่อว่า บริษัท นิบ (Brigatinib) มีตัวยา 30, 90 และ 180 มิลลิกรัม

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

ยานี้ใช้เพื่อ รักษาโรคมะเร็งปอด ที่แพทย์ตรวจแล้วว่า จำเป็นต้องใช้ยานี้

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- ⊗ เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

- ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร ในกรณีต่อไปนี้
 - ปอดอักเสบ หายใจลำบาก ผู้ที่มีปัญหาที่ปอด ตับอ่อน ตับ เบาหวาน ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคไต
 - ผู้ที่อายุต่ำกว่า 18 ปี
- แจ้งแพทย์หากท่านกำลังตั้งครรภ์ วางแผนจะตั้งครรภ์ หรืออยู่ในระยะให้นมบุตร **เพราะ**อาจทำให้เกิดอันตรายต่อทารก
- ไม่ควรใช้ยานี้ร่วมกับยา อาหาร สมุนไพร หรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบางชนิด **เพราะ**อาจมีผลต่อการรักษาหรือเกิดอันตรายได้ เช่น
 - ยารักษาการติดเชื้อเอชไอวี เช่น อินดินาเวียร์ เนลฟินาเวียร์ ริโดนาเวียร์ ซาควินาเวียร์ อีฟาเวเรนซ์
 - ยาปฏิชีวนะ เช่น คลาโรทริมัยซิน
 - ยารักษาเชื้อรา เช่น คีโตโคนาโซล ไอทราโคนาโซล วอริโคนาโซล
 - ยาลดไขมัน เช่น พรอวาสตาติน โรซิวาสตาติน
 - ยาแก้ปวด เช่น คาร์บามาซีปีน ฟิโนบาร์บิทอล เฟนิโทอิน
 - ยารักษาโรคหัวใจ เช่น ไโดจอกซิน
 - อื่นๆ เช่น ไรแฟมพิซิน ดาไมกาทราน โคลชิซิล เมโทเทรเซท ซัลฟาซาลาซีน โบเซนทาน เซนต์จอห์นเวิร์ต

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือ เภสัชกร เท่านั้น เนื่องจากขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค
- สามารถกินพร้อมอาหารหรือขณะท้องว่าง
- ห้ามหัก บด เคี้ยว หรือละลายยา

3.2 หากลืมกินยาควรทำอย่างไร

- ให้กินยาทันทีที่นึกได้ แต่ถ้าใกล้เวลาของมื้อต่อไป ให้รอกินยาของมื้อต่อไป และห้ามกินยาเพิ่มเป็น 2 เท่า

3.3 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรง ให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- พบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตามผลการรักษาหรืออันตรายจากยา
- ห้ามปรับขนาดยาหรือหยุดยาเอง และให้กินยาอย่างต่อเนื่องตามคำแนะนำของแพทย์ หรือเภสัชกร
- ระมัดระวังการขับขี้นานยนต์ หรือทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกล หรือทำงานที่เสี่ยงต่อการพลัดตกจากที่สูง **เพราะ**ยานี้ อาจทำให้การมองเห็นผิดปกติ เวียนหัวหรืออ่อนล้าได้

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

- ลมพิษ บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีจุดตามผิวหนัง
- การมองเห็นผิดปกติ ปวดหัวรุนแรง
- มีน้ำตาลในเลือดสูงกว่าปกติ

“ให้หยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที”

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์

- คลื่นไส้ อาเจียน อ่อนล้า ท้องเสีย ไอ ปวดศีรษะ ท้องผูก ปวดท้อง ปากแห้ง และอาหารไม่ย่อย

“ไม่จำเป็นต้องหยุดยา

“แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์”

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บยาไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง ปล่อยให้โดนแสงโดยตรง โดยทั่วไป ควรเก็บที่อุณหภูมิต่ำกว่า 30 องศาเซลเซียส ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- ห้ามใช้ยาหลังวันหมดอายุที่ระบุบนกล่อง
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

- **ลักษณะยา** ยานี้มี 3 ความแรง ดังนี้
 - ขนาด 30 มิลลิกรัม เป็นเม็ดกลมสีขาวถึงสีขาวนวล ด้านหนึ่งมีอักษร “U3” อีกด้านหนึ่งเรียบ
 - ขนาด 90 มิลลิกรัม เป็นเม็ดยาวรีสีขาวถึงสีขาวนวล ด้านหนึ่งมีอักษร “U7” อีกด้านหนึ่งเรียบ
 - ขนาด 180 มิลลิกรัม เป็นเม็ดยาวรีสีขาวถึงสีขาวนวล ด้านหนึ่งมีอักษร “U13” อีกด้านหนึ่งเรียบ
- **ตัวยาสำคัญ** บริษัท นิบ
- **ส่วนประกอบอื่น ๆ** ได้แก่ Lactose Monohydrate (แล็กโทส โมโนไฮเดรต), Microcrystalline cellulose (ไมโครคริสทัลไลน์ เซลลูโลส), Sodium starch glycolate type A (โซเดียมสตาร์ชไกลโคเลต ชนิด เอ), Silica Colloidal Hydrophobic (ซิลิกาคอลลอยด์ไฮโดรโฟบิก), Magnesium stearate (แมกนีเซียมสเตียเรต) และสารเคลือบเม็ดยา

ผู้ผลิต Penn Pharmaceutical Services Limited, Gwent, สหราชอาณาจักร

ผู้นำเข้า บริษัท ทาเคดา (ประเทศไทย) จำกัด กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

ผู้แทนจำหน่าย บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ สิงหาคม 2564

ศึกษาข้อมูลยาเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.

▪ <http://www.fda.moph.go.th/sites/oss/Pages/Main.aspx>

▪ <http://ndi.fda.moph.go.th/>

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร