

อิมาทินิบ

**ความแรง 100, 400 มิลลิกรัม
ชนิดแคปซูล
ชื่อการค้า IMAVITAE (อิมาวิต)**

1. ยานี้คืออะไร**1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร**

- ยานี้มีชื่อว่า อิมาทินิบ (Imatinib) มีตัวยา 100 หรือ 400 มิลลิกรัม

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ยานี้ใช้เพื่อรักษามะเร็งเม็ดเลือดขาวบางชนิด มะเร็งของกระเพาะอาหารและลำไส้ และมะเร็งผิวหนัง ซึ่งแพทย์ตรวจแล้วว่าเหมาะสมที่จะใช้ยานี้

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา**2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร**

- ⊗ เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

- ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร ในกรณีต่อไปนี้
 - ผู้มีหรือเคยมีปัญหาที่ ตับ ไต หรือหัวใจ
 - ได้รับการผ่าตัดต่อมไทรอยด์ออกและกำลังรับยา ลิวไทรอกซิน (Levothyroxine)
 - มีหรือเคยมีการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี เพราะอาจทำให้โรคตับอักเสบบีกำเริบ ซึ่งอาจทำให้เสียชีวิตได้
- แจ้งแพทย์หากท่านกำลังตั้งครรภ์ วางแผนจะตั้งครรภ์ หรืออยู่ในระยะให้นมบุตร เพราะอาจทำให้เกิดอันตรายต่อทารก
- แจ้งแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยา หากท่านใช้ยาอื่นๆ อาหารเสริม หรือสมุนไพร เพราะอาจส่งผลกระทบต่อการรักษาของยานี้

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ

หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

3. วิธีใช้ยา**3.1 ขนาดและวิธีใช้**

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค ควรกินยาตามแพทย์สั่ง
- กินยาทั้งแคปซูลพร้อมอาหาร หรือหลังอาหารทันที แล้วดื่มน้ำตามมากๆ เพื่อลดการระคายเคืองกระเพาะและลำไส้
- ห้ามเปิด แปะ หรือบดแคปซูลยา
- หากกลืนยาไม่ได้ ให้ละลายแคปซูลยาในน้ำเปล่าหรือน้ำแอปเปิ้ล และดื่มให้หมดทันที ยาขนาด 100 มิลลิกรัม ละลายในน้ำ 50 มิลลิลิตร และขนาด 400 มิลลิกรัม ละลายในน้ำ 200 มิลลิลิตร

3.2 หากลืมกินยาควรทำอย่างไร

- หากลืมกินยาแล้วนึกออกภายใน 6 ชั่วโมง ให้กินยาทันทีที่นึกได้
- ถ้าลืมกินเกิน 6 ชั่วโมง ไม่ต้องกินยามื้อนั้น ให้รอกินยาของมื้อต่อไป ห้ามกินยาเพิ่มเป็น 2 เท่า

3.3 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรง เช่น มีไข้ ปวดหัว คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย ผื่นคัน ผื่นแดง บวมหน้า บวม เหนื่อยล้า กล้ามเนื้อเกร็ง ปวดท้อง ปวดศีรษะ ความอยากอาหารลดลง ให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที และนำยาไปด้วย

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- ห้ามปรับขนาดยาหรือหยุดยาเอง และให้กินยานี้อย่างต่อเนื่องตามคำแนะนำของแพทย์ หรือเภสัชกร
- พบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตามผลการรักษาและอันตรายที่อาจเกิดจากยา
- ระวังการขับชี่ยานยนต์ การทำงานกับเครื่องจักรกลหรืองานที่เสี่ยงต่อการผลัดตกจากที่สูง เพราะยานี้อาจทำให้วังงเวียน ตาพร่ามัว
- ยานี้อาจทำให้เกิดอันตรายร้ายแรงได้ ต้องใช้ภายใต้การควบคุมของแพทย์เท่านั้น
- ให้สวมเสื้อผ้าและทาสารกันแดดที่มีสาร SPF เพราะยานี้อาจทำให้ผิวหนังไวต่อแสงแดดทั้งในเด็กและผู้ใหญ่

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา**5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที**

- ลมพิษ บวมที่ใบหน้า เปลือกตาริมฝีปาก
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีฝ้าตามผิวหนังหรือเลือดออกผิดปกติ
- ไอ เจ็บหน้าอก หายใจลำบาก หรือรู้สึกเจ็บขณะหายใจ
- อาการภาวะหัวใจล้มเหลว เช่น เหนื่อยขณะออกกำลังกายหรือขณะนอนราบ หัวใจเต้นเร็ว ตัวบวม
- เลือดออกในทางเดินอาหาร ดูได้จากอาเจียนเป็นเลือด อุจจาระเป็นสีดำ

“ให้หยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที”

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์

- คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย ปวดท้อง
- ปวดกล้ามเนื้อ ตะคริว เป็นผื่นแดง
- บวมหน้า น้่าน้ำหนักขึ้น

“ให้รอดูอาการ แต่ถ้ามีอาการรุนแรงควรไปพบแพทย์”

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อย่าให้โดนแสงโดยตรง โดยทั่วไปควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- ควรแกะยาเมื่อกินในแต่ละครั้งเท่านั้น ห้ามแกะยาออกจากแผงก่อน เพราะยาอาจเสียได้
- ห้ามใช้ยาหลังวันหมดอายุที่ระบุบนกล่อง
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

- **ลักษณะยา**
 - ความแรง 100 มิลลิกรัม แคปซูลสีส้ม
 - ความแรง 400 มิลลิกรัม แคปซูลสีน้ำตาลคาราเมล
- **ตัวยาสำคัญ**
 - อิมาทินิบ 100 หรือ 400 มิลลิกรัม

- **ส่วนประกอบอื่นๆ** ได้แก่ crospovidone (ครอสโพลิวิตอน), lactose monohydrate (แล็คโตสโมโนไฮเดรต), magnesium stearate (แม็กนีเซียม สเตียเรต), แคปซูลทำจากเจลลาติน

ผู้ผลิต Adamed Pharma S.A., Poland

ผู้นำเข้า บริษัท แมซิฟิค เฮลท์แคร์ (ไทยแลนด์) จำกัด

กรุงเทพฯ โทร. 02-881-2488

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ กรกฎาคม 2564

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.

- <http://www.fda.moph.go.th/sites/oss/Pages/Main.aspx>
- <http://ndi.fda.moph.go.th/>

**เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร**