

อะแนสโตรโซล
ความแรง 1 มิลลิกรัม
ชนิดเม็ดเคลือบฟิล์ม
ชื่อการค้า ANASVITAE
(เอนาสวีเต้)

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้มีชื่อว่าอะแนสโตรโซล (anastrozole) เป็นยาในกลุ่มฮอร์โมนในโรคมะเร็ง

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ยานี้ใช้รักษาโรคมะเร็งเต้านมระยะลุกลามในผู้หญิงวัยหมดประจำเดือน

2. ข้อควรระวังใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- X เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบอื่นในยานี้
- X เมื่อตั้งท้อง หรือวางแผนจะตั้งท้อง
- X เมื่ออยู่ในระยะให้นมลูก **เพราะ**ทำให้เกิดอันตรายร้ายแรงต่อลูก

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

- **ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร ในกรณีต่อไปนี้**
 - ยังไม่เข้าสู่วัยหมดประจำเดือน
 - เคยมีประวัติเกี่ยวกับโรคหัวใจ ตับ ไต กระดูก
 - มีไขมันในเลือดสูง
 - ไม่ควรใช้ยานี้ร่วมกับยา อาหาร สมุนไพร หรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบางชนิด **เพราะ**อาจมีผลต่อการรักษาหรือเกิดอันตรายได้ เช่น ยารักษา มะเร็งเต้านมบางชนิด ยาที่มีส่วนประกอบของฮอร์โมนเอสโตรเจน

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค
- ควรกินยาให้ตรงเวลาทุกวัน
- ยานี้กินวันละครั้ง ก่อนหรือหลังอาหารก็ได้
- กลืนยาทั้งเม็ดพร้อมน้ำเปล่า ห้ามหัก เคี้ยว หรือบดเม็ดยา

3.2 หากลืมกินยาควรทำอย่างไร

- ให้รอกินยามื้อถัดไป ห้ามกินยาเพิ่มเป็น 2 เท่า

3.3 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรง เช่น ท้องเสีย อ่อนเพลีย ปวดข้อ ให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- พบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอ
 - เพื่อติดตามผลการรักษา หรืออันตรายจากยา
 - เพื่อตรวจติดตามระดับฮอร์โมนเอสโตรเจนและมวลกระดูก
- ห้ามหยุดยาเอง และให้กินยานี้อย่างต่อเนื่องตามคำแนะนำของแพทย์ หรือเภสัชกร
- หลีกเลี่ยงการขับขี่ยานยนต์ งานที่เกี่ยวข้องกับเครื่องจักรกล หรืองานที่เสี่ยงต่อการพลัดตกจากที่สูง

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

- ลมพิษ บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีจุดตามผิวหนัง หรือเลือดออกผิดปกติ
- มีเลือดออกทางช่องคลอดติดต่อกันหลายวัน
- ปวดหน้าอก หายใจถี่ **เพราะ**อาจเป็นอาการของโรคหัวใจ
- ตัวเหลือง ตาเหลือง รู้สึกไม่สบายตัว ปวดท้องด้านขวา **เพราะ**อาจเป็นอาการของโรคตับ
“ให้หยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที”

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์

- ปวดข้อ ข้อติด ปวดกระดูก
- ท้องเสีย คลื่นไส้ อาเจียน
- ปวดหัว อ่อนเพลีย ผม่วง
- ช่องคลอดแห้ง
- ร้อนวูบวาบ อารมณ์แปรปรวน
- นอนไม่หลับ
- ความดันโลหิตสูง

“ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์”

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อบอุ่น โดยตรง โดยทั่วไปควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถห้องน้ำ ห้องครัว
- ควรแกะยาเมื่อกินในแต่ละครั้งเท่านั้น ห้ามแกะยาออกจากแผงก่อนเพราะยาอาจเสียได้
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

- **ลักษณะยา** ยาเม็ดกลม เคลือบฟิล์ม สีขาว นูน เรียบทั้งสองด้าน
- **ตัวยาสําคัญ** อะแนสโตรโซล 1 มิลลิกรัม
- **ส่วนประกอบอื่นๆ** ได้แก่ แลคโทสโมโนไฮเดรต, แลคโทส, โซเดียมสเตียเรต, โกลโคเลต, ไมโครคริสตัลไลน์เซลลูโลส, คอลลอยดอลแอนไฮดรัสซิลิกา, แมกนีเซียมสเตียเรต, ไฮดรอกซีโพรพิลเมทิลเซลลูโลส, ไททานเนียมไดออกไซด์, มาโครกอล

ผู้ผลิต : SAG Manufacturing ประเทศสเปน

ผู้รับอนุญาต : บริษัท แปซิฟิค เฮลท์แคร์ (ไทยแลนด์) จำกัด 1011 อาคารศุภาสัย แกรนด์ทาวเวอร์ ห้อง 01 ชั้น 29 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุด สิงหาคม 2565

ศึกษาข้อมูลยาเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.

- <http://www.fda.moph.go.th/sites/oss/Pages/Main.aspx>
- <http://ndi.fda.moph.go.th/>

**เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์ หรือเภสัชกร**

**คำเตือน ยานี้อาจทำให้เกิดอันตรายร้ายแรงได้
ต้องใช้ภายใต้การควบคุมของแพทย์เท่านั้น**