

ไอซาวูโคนาโซล ความแรง 100 มิลลิกรัม ชนิดแคปซูล ชื่อการค้า CRESEMBA™(เครสเซมบา™)

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

ยานี้มีชื่อว่า เครสเซมบา (CRESEMBA) มีตัวยา ไอซาวูโคนาโซล เป็นยาในกลุ่มยาต้านเชื้อรา

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

ยานี้ใช้รักษาโรคติดเชื้อราบางชนิดในผู้ใหญ่ที่แพทย์พิจารณาแล้วว่าเหมาะสมที่จะใช้ยานี้ ได้แก่

- โรคแอสเพอร์จิลโลซิส
- โรคมีวคอร์โมโคซิส

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- ⊗ เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้
- ⊗ มีประวัติคลื่นไฟฟ้าหัวใจ QT ผิดปกติ
- ⊗ กำลังใช้ยาต่อไปนี้

- คีโตโคนาโซล
- ริโดนาเวียร์
- ไรแฟมพิซิน ไรฟามูติน
- คาร์บามาเซพีน
- ยาในกลุ่มบาร์บิทูเรต เช่น ฟีนobarบิทาล
- เฟนิโทอิน
- ยาสมุนไพรเช่นจอร์จอนเวิร์ท
- เอฟฟาไวเรนซ์ อีทราไวริน
- นาฟซิลลิน

“หากไม่แน่ใจว่ากำลังใช้ยาดังกล่าวหรือไม่ ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร”

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

ให้ปรึกษาแพทย์ในกรณีต่อไปนี้

- เคยแพ้ยาต้านเชื้อราอื่น
- ถ้าเป็นโรคตับรุนแรง
- ถ้ากำลังใช้ยาอื่น อาหารเสริม หรือสมุนไพรอยู่

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค
- กินยานี้ก่อนหรือหลังอาหารก็ได้
- กลืนยาทั้งแคปซูล **อย่า** แกะ บด หรือเคี้ยว

3.2 หากลืมกินยาควรทำอย่างไร

- กินยาทันทีที่นึกได้ แต่ถ้าใกล้เวลาที่จะกินยาครั้งถัดไป ให้รอกินยาครั้งถัดไปตามขนาดปกติ
- **อย่า** กินยาเพิ่มเป็นสองเท่าเพื่อทดแทนครั้งที่ลืม

3.3 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ถ้าสงสัยว่าได้รับยาเกินขนาด ให้แจ้งแพทย์พยาบาลหรือเภสัชกรทันทีและไปโรงพยาบาลในทันที โปรดนำกล่องยาไปด้วย

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- “หลีกเลี่ยงการขับรถ การทำงานกับเครื่องจักรกลหรืองานที่เสี่ยงต่อการพลัดตกจากที่สูง เพราะยานี้ อาจทำให้มีแรง อ่อนเพลีย ง่วงซึม หรือหมดสติ”
- กินยาต่อเนื่องทุกวันจนครบตามแพทย์สั่ง
- ห้ามกินยานี้ถ้ากำลังตั้งครรภ์ นอกจากแพทย์สั่ง
- ห้ามให้นมบุตรหากคุณกำลังใช้ยานี้

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

- หายใจมีเสียงหวีดจับพลัน หายใจลำบาก บวมที่ใบหน้าริมฝีปาก ปาก หรือลิ้น มีอาการคันอย่างรุนแรง เหงื่อออก เวียนศีรษะหรือเป็นลม หัวใจเต้นเร็ว
- มีตุ่มพองรุนแรงที่ผิวหนัง ปาก ตา หรืออวัยวะเพศ
- หายใจไม่ออกหรือหายใจลำบาก
- ตัวเหลืองตาเหลือง เบื่ออาหาร บัสสาวะสีเข้ม
- บัสสาวะไม่ออกหรือปวดขัด แขนขาบวม
- อาการชัก
- ภาวะแพ้ มีอาการสับสน
- รู้สึกซึมเศร้า

“ให้หยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที”

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์

- ปวดหัว มึนงง กระสับกระส่าย ง่วงนอน
- คลื่นไส้ อาเจียน ท้องร่วง ปวดท้อง ปวดหลัง
- มีอาการชา รู้สึกซ่า สัมผัสผิดปกติ
- มีผื่น มีอาการคัน
- เจ็บหน้าอก หัวใจเต้นผิดปกติ รู้สึกหกล้มยาก

“ไม่จำเป็นต้องหยุดยา

แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์”

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง ปล่อยให้โดนแสงโดยตรง โดยทั่วไป ควรเก็บที่อุณหภูมิ ไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

“แกะยาเมื่อจะกินเท่านั้น เพราะยาขึ้นง่าย”

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

- **ลักษณะยา** แคปซูลแข็ง ตัวแคปซูลสีน้ำตาลอมแดง ซึ่งพิมพ์ตัวเลข “100” ด้วยหมึกสีดำและปลอกแคปซูลสีขาวที่พิมพ์ตัวอักษร “C” ด้วยหมึกสีดำ
- **ตัวยาสำคัญ** ไอซาวูโคนาโซล 100 มิลลิกรัม
- **ส่วนประกอบอื่น ๆ** ได้แก่ แมกนีเซียมซิติเรต ไมโครคริสตัลลีนเซลลูโลส ทัลก์ คอลลอยด์ดอลซิลิกา และกรดสเตียริก เป็นส่วนประกอบ
- ยาบรรจุในแผงบลิสเตอร์อลูมิเนียม แต่ละแผงมียา 7 แคปซูล ช่องแคปซูลแต่ละช่องจะเชื่อมต่อกับช่องซึ่งมี ‘สารดูดความชื้น’ เพื่อป้องกันแคปซูลจากความชื้น ห้ามกินสารดูดความชื้น

ผู้ผลิต Swiss Co Services AG, Switzerland

ผู้นำเข้า Pfizer (Thailand) Limited

ผู้แทนจำหน่าย Zuellig Pharma LTD.

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ 7 กรกฎาคม 2565

ศึกษาข้อมูลยาเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ **อย.**

▪ <http://www.fda.moph.go.th/sites/oss/Pages/Main.aspx>

▪ <http://ndi.fda.moph.go.th/>

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร