

คาร์เมลโลสโซเดียม น้ำยาหยอดตาชนิดไม่มีสารกันเสีย ชื่อการค้า Tear mac SD (เทียร์ แมค เอสดี)

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้มีชื่อว่าคาร์เมลโลสโซเดียม (carmellose sodium) เป็นยาในกลุ่มน้ำตาเทียมที่ไม่มีสารกันเสีย

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ใช้ทดแทนน้ำตาเพื่อรักษาอาการตาแห้ง

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ล้างมือให้สะอาดก่อนใช้ยาหยอดตา
- ตรวจสอบสภาพของยาก่อนใช้
 - อย่าใช้ยานี้ถ้าภาชนะบรรจุอยู่ในสภาพไม่สมบูรณ์
 - อย่าใช้ยานี้ถ้ามีน้ำยาขุ่น หรือขุ่น
- หักปลายหลอดเพื่อเปิดใช้
- เมื่อเปิดแล้วให้หยอดยาทันทีเพื่อป้องกันการปนเปื้อน
- ระวังไม่ให้ปลายหลอดสัมผัสกับดวงตาหรือสิ่งอื่น
- หยอดตาข้างที่เป็นครั้งละ 1-2 หยด วันละ 4 ครั้งหรือตามที่ต้องการ
- เมื่อหยอดยาเสร็จแล้วให้ทิ้งทันที ห้ามนำกลับมาใช้ซ้ำ
- ไม่จำเป็นต้องถอดคอนแทคเลนส์ก่อนใช้ยานี้

3.2 หากลืมหยอดยาควรทำอย่างไร

- หากยังมีอาการ ให้หยอดยาทันทีที่นึกขึ้นได้หรือตามต้องการ โดยไม่จำเป็นต้องเพิ่มยาเป็น 2 เท่า

3.3 ถ้าหยอดยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- โดยปกติการได้รับยานี้เกินขนาดไม่ก่อให้เกิดอันตราย

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- งดการขับขี่ยานพาหนะหรือทำกิจกรรมที่ต้องใช้สายตา จนกว่าสายตาจะกลับมามองเห็นได้ปกติ **เพราะ**ยานี้ อาจทำให้ตาพร่ามัวชั่วคราว
- ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรหากใช้ยาแล้วอาการตาแห้งไม่ดีขึ้นหรืออาการแย่ลง

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

- ลมพิษ บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก
 - หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
 - ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีจุดตามผิวหนัง หรือเลือดออกผิวดปกติ
 - ปวดตา ตาแดง ตาแฉะ น้ำตาไหลผิดปกติ
- "ให้หยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที"**

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์

- ระคายเคืองตา แสบร้อนในตา ไม่สบายตา คันตา
- ตาพร่ามัวชั่วคราว การมองเห็นเปลี่ยนไป
- ตาบวมเจ็บจากการสัมผัสกับปลายหลอด

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อย่าให้โดนแสงโดยตรง โดยทั่วไปควรเก็บที่อุณหภูมิห้องไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- ห้ามแช่แข็ง
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

- **ลักษณะยา** หลอดพลาสติกบรรจุสารละลายใสไม่มีสี
- **ตัวยาสําคัญ** คาร์เมลโลสโซเดียม 5 มิลลิกรัมต่อ 1 มิลลิลิตร
- **ส่วนประกอบอื่นๆ** ได้แก่ กรดบอริก, โปแทสเซียมคลอไรด์, โซเดียมคลอไรด์, แคลเซียมคลอไรด์ไดไฮเดรต, แมกนีเซียมคลอไรด์เฮกซะไฮเดรต, โซเดียมไฮดรอกไซด์ และน้ำ

ผู้ผลิต Micro labs limited, India.

ผู้นำเข้า/ผู้แทนจำหน่าย

บริษัท แม็กซิม อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น จำกัด

640/53-54 ซอยเพชรบุรี 22 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ Tel. 02-656-6670-4

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ 24 มิถุนายน 2563

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.



หรือ



- <http://www.fda.moph.go.th/sites/oss/Pages/Main.aspx>

- <http://ndi.fda.moph.go.th/>