

เพมีเทรกเซด**ความแรง 100 มิลลิกรัม****ชนิดยาฉีด****EMETEX (เอมีเท็กซ์)****1. ยานี้คือยาอะไร****1.1 ยานี้มีชื่อสามัญอะไร**

- ยานี้มีชื่อว่าเพมีเทรกเซด (Pemetrexed) มีตัวยา 100 มิลลิกรัม เป็นยากลุ่มกรดโฟลิก (Folic acid analogues) กลุ่มยารักษา มะเร็ง

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

ยานี้ใช้เพื่อ

- 1. ยานี้ใช้รักษาโรคมะเร็งเยื่อหุ้มปอด หลังแพทย์ตรวจรักษาแล้วเห็นว่าควรใช้ยานี้รักษาโรค
- 2. ยานี้ใช้รักษาโรคมะเร็งปอดชนิดเซลล์ตัวโต หรือ มะเร็งปอดชนิดไม่ใช้เซลล์เล็ก หลังแพทย์ตรวจรักษาแล้วเห็นว่าควรใช้ยานี้รักษาโรค

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา**2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร**

- เมื่อได้รับหรือกำลังจะได้รับวัคซีนป้องกันโรคไขเหลือง
- เคยแพ้ยานี้หรือส่วนประกอบของยานี้ หรือยาในกลุ่มกรดโฟลิก
- เมื่ออยู่ในระยะให้นมลูก เพราะทำให้เกิดอันตรายร้ายแรงต่อเด็ก

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร หากท่านมีภาวะดังต่อไปนี้

- มีภาวะโรคตับ ไต หัวใจ หรือน้ำท่วมปอด
- กำลังหรืออยู่ระหว่างการฉายรังสี
- กำลังกินหรือฉีดยาแก้ปวด อักเสบ หรือฉีดวัคซีน

- ผู้หญิงที่วางแผนมีลูก กำลังท้อง หรืออยู่ในระยะให้นมลูก เพราะยาทำให้เกิดอันตรายต่อเด็ก
- ผู้ชายที่ต้องการมีบุตร เพราะยาอาจทำให้มีลูกยาก
- หากคุณต้องขับรถหรือทำงานกับเครื่องจักร

3. วิธีใช้ยา**3.1 ขนาดและวิธีใช้**

ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือ เภสัชกร เท่านั้น เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค

- ยานี้ต้องละลายด้วยโซเดียมคลอไรด์ 9 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร ก่อนฉีดยาทางหลอดเลือดดำ นาน 10 นาทีขึ้นไป

3.2 หากลืมมาฉีดยา ควรทำอย่างไร

- ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

3.3 ถ้าฉีดยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรง เช่น มีไข้ท้องเสีย แผลในปาก เลือดออกและหยุดยาก อาการคันหรือตุ่มพุพอง หายใจลำบาก เจ็บหน้าอก ให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- พบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตามผลการรักษาหรืออันตรายจากยา ห้ามหยุดการรักษาเอง
- ระมัดระวังการขับชียานยนต์ หรือทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกล หรือทำงานที่เสี่ยงต่อการพลัด ตกจากที่สูง
- แจ้งแพทย์ เภสัชกร หรือพยาบาลว่ากำลังใช้ยานี้
- ห้ามฉีดวัคซีนป้องกันไขเหลือง กรณีจำเป็นต้องฉีดวัคซีน ให้ใช้วัคซีนชนิดเชื้อตาย
- ระหว่างใช้ยานี้ผู้หญิงต้องคุมกำเนิดและหยุดให้นมลูก

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา**5.1 อาการที่ต้องแจ้งแพทย์ พยาบาล หรือเภสัชกรทันที**

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตาริมฝีปาก ลมพิษ
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก ไอแบบมีเสมหะเป็นเลือด
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีฝ้าตามผิวหนังหรือเลือดออกผิดปกติ
- มีไข้สูงกว่า 38 องศาเซลเซียส เหงื่อออก นานวสัน อ่อนเพลีย ปวดศีรษะ
- มีเลือดออกจากเหงือก ปาก จมูก จ้ำเลือดที่ผิวหนัง ปัสสาวะสีแดงหรือชมพู
- หยุดหายใจชั่วคราว เจ็บหน้าอก ไอมีเสมหะปนเลือด
- รู้สึกอ่อนล้า รู้สึกหิวๆ เหมือนใจจะขาด หน้าซีด

“หากมีอาการเหล่านี้ ให้แจ้งแพทย์ พยาบาล หรือเภสัชกรทันที”

5.2 อาการที่อาจเกิดได้และให้รอดอาการ แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้แจ้งแพทย์หรือพยาบาล

- คลื่นไส้ อาเจียน คออักเสบ ท้องร่วง ท้องผูก ปวดท้อง เพลีย เบื่ออาหาร
 - ผมร่วง การรับรสเปลี่ยนไป
 - บวม น้ำ ปวดกล้ามเนื้อบริเวณขา ชาบวมและแดง
- “หากมีอาการรุนแรงหรือทนไม่ได้ ให้ไปพบแพทย์”**

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- ยานี้เก็บไว้ที่โรงพยาบาล ท่านจะไม่ได้รับกลับบ้าน
- เก็บยาไว้ใน บรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาไว้ในที่แห้ง อบอุ่นโดยแสงโดยตรง โดยทั่วไปควรเก็บที่อุณหภูมิต่ำกว่า 30 องศาเซลเซียส
- กรณีผสมยาแล้ว ใช้ยาหลังผสมทันที หากไม่ใช้ทันที ให้เก็บในตู้เย็น ไม่เกิน 24 ชั่วโมง

5. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

- ภาวแ้วใใไม่มีสี บรรจจผงยาสีขาวหรือสีเหลืองอ่อน
ตั้งสีเหลืองออกเขียว
- ด้วยยาสำคัญ คือ เพมีเทรกเซต 100 มิลลิกรัม
- ส่วนประกอบ ใต้แเก่ แมนนิทอล 100 มิลลิกรัม

ผู้ผลิต Shanghai Chemo Wanbang Biopharma
Co., Ltd., Shanghai, China

ผู้นำเข้า: บริษัท เอ็กเซลทิส (ประเทศไทย) จำกัด
กรุงเทพฯ ประเทศไทย

ผู้แทนจำหน่าย บริษัท อเมริกัน ใต้หวัน ไบโอฟาร์ม
จำกัด กรุงเทพฯ ประเทศไทย

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ 26 กุมภาพันธ์
2562

**เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร**