

วาลเบนนาซีน  
ความแรง 40 มิลลิกรัม  
ชนิดแคปซูล  
ชื่อการค้า REMLEAS™ (เรมลีแอส)

## 1. ยานี้คืออะไร

### 1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

ยานี้มีชื่อว่า วาลเบนนาซีน (valbenazine)

### 1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

ยานี้ใช้ในผู้ใหญ่เพื่อรักษาอาการเคลื่อนไหวผิดปกติของร่างกายบางส่วน เช่น ใบหน้า ลิ้น ริมฝีปาก ขากรรไกร ที่ไม่สามารถควบคุมได้ (Tardive dyskinesia)

## 2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

### 2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

⊗ ห้ามใช้ในผู้ที่แพ้ยานี้หรือส่วนประกอบของยานี้

### 2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

• ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร ในกรณีต่อไปนี้

- เป็นผู้ป่วยโรคตับ
- เป็นผู้ป่วยโรคหัวใจที่ยังคุมอาการไม่ได้
- มีภาวะหัวใจล้มเหลว หรือเพิ่งมีภาวะหัวใจวาย
- เป็นผู้ป่วยโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ
- กำลังตั้งท้อง หรือวางแผนที่จะมีลูก
- กำลังให้นมลูก
- ใช้ยา สมุนไพร หรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอื่นอยู่

สอบถามแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยานี้  
หากไม่แน่ใจว่ามีอาการดังกล่าวหรือไม่

## 3. วิธีใช้ยา

### 3.1 ขนาดและวิธีใช้

• ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค

• กินยานี้พร้อมอาหารหรือไม่ก็ได้

### 3.2 หากลืมกินยาควรทำอย่างไร

• ให้กินยาทันทีที่นึกได้ แต่ถ้าใกล้เวลาของมื้อถัดไปให้รอกินยาของมื้อต่อไป ห้ามกินยาเพิ่มเป็น 2 เท่า

### 3.3 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

• ให้รีบไปพบแพทย์ทันที

## 4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- ห้ามหยุดยาเอง และให้กินยาน้อยอย่างต่อเนื่องตามคำแนะนำของแพทย์ หรือเภสัชกร
- ผู้หญิงที่กำลังให้นมลูก ต้องงดให้นมลูกในขณะที่ใช้ยานี้ และต่อเนื่องอีก 5 วันหลังหยุดยา
- ระมัดระวังการขับชียานยนต์ การทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร หรือการทำงานที่เสี่ยงต่อการพลัดตกจากที่สูง เพราะยานี้อาจทำให้ง่วงซึมได้

## 5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

### 5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

- ลมพิษ บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผื่นหนังหลุดลอก มีจุดตามผื่นหรือเลือกออกผิดปกติ
- หัวใจเต้นเร็วหรือเต้นช้าหรือเต้นผิดปกติ ร่วมกับหายใจสั้น มึนงงหรือเป็นลม
- ตัวสั่น แข็งเกร็ง เคลื่อนไหวหรือเดินหรือทรงตัวลำบาก

“ให้หยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที”

### 5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์

- ง่วงนอน เหนื่อยล้า
- ปวดหัว ตาพร่า
- ท้องผูก ปากแห้ง คลื่นไส้ อาเจียน

“ไม่จำเป็นต้องหยุดยา  
แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์”

## 6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บยาไว้ในภาชนะบรรจุเดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง ปล่อยให้โดนแสงโดยตรง โดยทั่วไปควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ หรือ ห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

## 7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

- **ลักษณะยา** เป็นแคปซูลสีขาว-ม่วง มีคำว่า VBZ เหนือตัวเลข 40
- **ตัวยาสำคัญ** วาลเบนนาซีน 40 มิลลิกรัม
- **ส่วนประกอบอื่นๆ** คอลลอยด์ซิลิโคนไดออกไซด์, แมกนีเซียมสเตียเรต, แมนนิทอล, ปริเจลาติโนซีสตาร์ช

ผู้ผลิต บริษัท แพทีออน ฟรานซ์ เอสเอเอส ประเทศฝรั่งเศส  
ผู้นำเข้า บริษัท มิตรูมิชิ ทานาเบะ ฟาร์มา (ไทยแลนด์) จำกัด ประเทศไทย

ผู้แทนจำหน่าย บริษัท มิตรูมิชิ ทานาเบะ ฟาร์มา (ไทยแลนด์) จำกัด ประเทศไทย

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ 7 กรกฎาคม 2564

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ [อย.](http://www.fda.moph.go.th)

- <http://www.fda.moph.go.th/sites/oss/Pages/Main.aspx>
- <http://ndi.fda.moph.go.th/>

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ  
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

