

โพลาทูซูแมบ วิโดทิน
ความแรง 30 หรือ 140 มิลลิกรัม
ยาผงสำหรับฉีด
ชื่อการค้า POLIVY (โพลีวี)

1. ยานี้คือยาอะไร

1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้มีชื่อว่า โพลาทูซูแมบ วิโดทิน (polatuzumab vedotin) เป็นยาในกลุ่มโมโนโคลนอลแอนติบอดี

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ใช้เพื่อรักษาโรคมะเร็งต่อม้าน้ำเหลืองชนิดบีเซลล์ ในผู้ป่วยที่กลับเป็นซ้ำหรือดื้อยาและไม่สามารถเข้ารับการรักษาด้วยการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือด โดยใช้ร่วมกับยาเบนดามัสทีนและริทูซิแมบ

2. ข้อควรรู้ก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้
- ให้นมลูก

2.2 ข้อควรระวังเมื่อฉีดยานี้

- ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรในกรณีต่อไปนี้
 - เคยมีปัญหาด้านความจำ เคลื่อนไหวลำบาก รู้สึก

เหมือนเข็มตำ เจ็บ แสบร้อนเมื่อสัมผัส

- เคยมีปัญหาด้านสายตา
- โรคตับ

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือ เภสัชกร เท่านั้น **เพราะ**ขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค
- แพทย์หรือพยาบาลจะเป็นผู้ฉีดยาให้กับท่าน โดยวิธีหยดเข้าหลอดเลือดดำ

3.2 หากลืมไปฉีดยาควรทำอย่างไร

- หากนึกขึ้นได้ให้รีบไปฉีดยาทันที
- แพทย์จะแจ้งนัดการฉีดยาครั้งต่อไปให้กับท่าน

3.3 ถ้าฉีดยาเกินขนาด ควรทำอย่างไร

- ถ้าสงสัยว่าได้รับยาเกินขนาด ให้แจ้งแพทย์ พยาบาล หรือเภสัชกรทันที

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- ผู้หญิงคุมกำเนิดระหว่างที่ใช้ยานี้ และคุมกำเนิดต่อไปอีกหลังหยุดใช้ยาไปแล้วอย่างน้อย 9 เดือน
- ผู้ชายต้องใส่ถุงยางอนามัยทุกครั้งเมื่อมีเพศสัมพันธ์ระหว่างที่ใช้ยานี้ และต่อเนื่องไปอีกหลังหยุดใช้ยาไปแล้วอย่างน้อย 6 เดือน
- ระมัดระวังในการขับขี่ การทำงานกับเครื่องจักรหรือทำงานบนที่สูง **เพราะ**ยานี้อาจ

ทำให้ท่านรู้สึกเหนื่อย อ่อนเพลีย หรือเวียนหัว

- ห้ามรับวัคซีนระหว่างใช้ยานี้

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องรีบไปพบแพทย์ทันที

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีจ้ำตาม ผิวหนังหรือเลือดออกผิดปกติ
- ตัวเหลือง ตาเหลือง ปัสสาวะสีเข้ม ค้นที่ ผิวหนัง
- ติดเชื้อมีไข้ เป็นริ้ว งูสวัด
- เดินเซ ตาพร่า หลงลืม พูดลำบาก
- เม็ดเลือดขาวต่ำ หรืออ่อนเพลียมาก

“หากมีอาการเหล่านี้ให้รีบไปพบแพทย์ทันที”

5.2 หากฉีดยาแล้วเกิดอาการ เช่น

- มีอาการปวด คัน แดง บริเวณที่ฉีดยา
- คลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง ท้องผูก ท้องร่วง
- เบื่ออาหาร น้ำหนักลด
- ปวดข้อ ชาปลายมือ ปลายเท้า

“ให้รอดูอาการ แต่ถ้านรุนแรงให้ไปพบแพทย์”

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- ยานี้เก็บไว้ที่โรงพยาบาล ท่านจะไม่ได้รับยากลับบ้าน
- เก็บยาในตู้เย็นที่อุณหภูมิ 2 ถึง 8 องศาเซลเซียส
- ห้ามแช่แข็ง ห้ามเขย่า

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

- **ลักษณะยา** ขวดแก้วบรรจุผงสีขาวถึงสีขาวอมเทา
- **ตัวยาสําคัญ** โพลีลาทูซุแมบ รีโดทิน 30 มิลลิกรัม หรือ 140 มิลลิกรัม
- **ส่วนประกอบอื่นๆ** ได้แก๊ กรดซัคซินิก โขเดียมไฮดรอกไซด์ ซูโครส โพลีซอร์เบท 20

**เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร**

คำเตือน: ยานี้อาจทำให้เกิดอันตรายร้ายแรงได้
ต้องใช้ภายใต้การควบคุมของแพทย์เท่านั้น

ผู้ผลิตโพลีวี 30 มิลลิกรัม: บริษัท เอฟ ฮอฟมันน์ –
ลา โรช จำกัด สวิสเซอร์แลนด์
ผู้ผลิตโพลีวี 140 มิลลิกรัม: บริษัท บีเอสพี ฟาร์
มาซูติคอลล เอส.พี.เอ อิตาลี
ผู้นำเข้า: บริษัท โรช ไทยแลนด์ จำกัด
กรุงเทพฯ

ผู้แทนจำหน่าย: บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จำกัด

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเดือน 24 มิถุนายน
2563

ศึกษาข้อมูลยาเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.

- <http://www.fda.moph.go.th/sites/oss/Pages/Main.aspx>
- <http://ndi.fda.moph.go.th/>

Polivy_TH-PIL v.2.0

