

**ลิโวฟล็อกซาซิน**  
**ความแรง 5 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร**  
**ชนิดหยอดตา**  
**ชื่อการค้า NIKP - Levofloxacin**  
**Ophthalmic Solution 0.5%**  
**(นิคพี ลิโวฟล็อกซาซิน ชนิดหยอดตา 0.5%)**

**1. ยานี้คืออะไร**

- 1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร**
- ยานี้มีชื่อว่า ลิโวฟล็อกซาซิน (levofloxacin) เป็นยาในกลุ่มควิโนโลน
- 1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร**
- ยานี้ใช้เพื่อรักษาโรคติดเชื้อทางตาที่แพทย์ตรวจแล้วว่าต้องใช้นานี้

**2. ข้อควรระวังก่อนใช้นานี้**

- 2.1 ห้ามใช้นานี้เมื่อไร**
- ⊗ เคยแพ้ยานี้หรือส่วนประกอบอื่นของยานี้ หรือยาอื่นในกลุ่มควิโนโลน
- 2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้นานี้**
- ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร ในกรณีต่อไปนี้
    - เด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี
    - กำลังท้อง วางแผนที่จะท้อง หรืออยู่ในระยะให้นมลูก
    - กำลังใช้นานี้ สมุนไพร หรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอื่น ๆ

**3. วิธีใช้นานี้**

- 3.1 ขนาดและวิธีใช้**
- ควรใช้นานี้ตามคำแนะนำของแพทย์หรือ เภสัชกร เท่านั้น เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้นานี้ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค
  - ล้างมือให้สะอาดก่อนหยอดตา
  - ถอดคอนแทคเลนส์ก่อนหยอดตา
  - ใช้หยอดตาข้างที่เป็นครั้งละ 1-2 หยด ระวังไม่ให้ปากขูดยาสัมผัสกับตา
  - ในสองวันแรกหยอดตาได้ไม่เกิน 8 ครั้งต่อวัน หลังจากนั้นไม่เกิน 4 ครั้งต่อวัน
- 3.2 หากลืมหยอดตาควรทำอย่างไร**
- หากลืมหยอดตา ให้รอหยอดตาของรอบถัดไป และห้ามหยอดตาเพิ่มเป็นสองเท่า

- 3.3 ถ้าหยอดยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร**
- ให้ล้างตาด้วยน้ำสะอาด และสังเกตอาการ หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรง ให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที

**4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้นานี้**

- ให้หยอดยานี้ติดต่อกันทุกวันจนครบตามคำแนะนำของแพทย์ หรือเภสัชกร แม้อาการจะดีขึ้นแล้วก็ตามมีจะนั้นเชื้อจะดีดยา
- ไม่ควรใส่คอนแทคเลนส์ขณะมีการติดเชื้อทางตา
- ห้ามใช้นานี้หยอดตาพร้อมกับผู้อื่น
- ถ้ามียาหยอดตา หรือยาป้ายตาชนิดอื่นที่ใช้ร่วมกัน ให้เว้นระยะห่างในการหยอดตาแต่ละชนิดอย่างน้อย 15 นาที
- ถ้าใช้นานี้จนครบระยะเวลาที่แพทย์สั่งแล้วอาการไม่ดีขึ้น ให้ปรึกษาแพทย์ทันที
- ระมัดระวังการขับขี้นานี้ หรือทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกล หรือทำงานที่เสี่ยงต่อการพลัดตกจากที่สูง

**5. อันตรายที่อาจเกิดจากยานี้**

- 5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที**
- ลมพิษ บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก
  - หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
  - ผื่นแดง ตุ่มพอง ผื่นหนังหลุดลอก มีจ้ำตามผิวหนัง หรือเลือดออกผิดปกติ
  - คอววม หายใจไม่ออก
  - ตาแดงมากขึ้น คันตามากขึ้น เปลือกตามวม
  - ปวดเอ็นข้อมือหรือข้อเท้า

**“ให้หยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที”**

- 5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์**
- แสบตา ตาแฉะหรือมีเมือกในลูกตา
  - ระคายเคืองตา ปวดตา ตาแห้ง เยื่อตาบวมแดง ตาไม่ทนแสง ตาแฉะ มีฝื่นรอบตา
  - ปวดหัว นานี้มูกไหล

**“ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์”**

**6. ควรเก็บยานี้อย่างไร**

- เก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อบอุ่นโดยตรง โดยทั่วไป ควรเก็บที่อุณหภูมิ ไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก
- ไม่ควรใช้นานี้หลังจากเปิดใช้แล้วหนึ่งเดือน

**7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้**

- ลักษณะยา:** นานี้ใส สีเหลืองอ่อนถึงสีเหลือง
- ตัวยาสสำคัญ:** ลิโวฟล็อกซาซิน ความแรง 5 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร
- ส่วนประกอบอื่น ๆ ได้แก่** โซเดียมคลอไรด์ กรดไฮโดรคลอริก โซเดียมไฮดรอกไซด์ และ น้ำ
- ผู้ผลิต:** บริษัท โอซาวาโนะ แพคทอรี ฟาร์มาแพ็ค จำกัด ประเทศญี่ปุ่น
- ผู้นำเข้า:** บริษัท นิชิโอโคะ (ประเทศไทย) จำกัด กรุงเทพฯ
- ผู้แทนจำหน่าย:** บริษัท ดีเคเอสเอช ประเทศไทย จำกัด กรุงเทพฯ
- เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ:** พฤศจิกายน 2563
- ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.**
- <http://www.fda.moph.go.th/sites/oss/Pages/Main.aspx>
- <http://ndi.fda.moph.go.th/>

**คำเตือนตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข:**

- ห้ามใช้ในผู้ที่แพ้ยานี้ หรือยาในกลุ่มควิโนโลนตัวอื่น ๆ
- หากใช้นานี้แล้วมีอาการตาแดง บวมมากขึ้น หรือมีผื่นขึ้น ปวดเมื่อยปวดกล้ามเนื้อ ปวดเอ็นข้อมือหรือข้อเท้า ให้รีบหยุดยาและปรึกษาแพทย์ทันที
- ยานี้ อาจทำให้เกิดอันตรายต่อดับ ไตได้

**เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร**

