

ไตรฟลูริดีน และ ไทพิราซิล
15 มิลลิกรัม และ 6.14 มิลลิกรัม
20 มิลลิกรัม และ 8.19 มิลลิกรัม
ชนิดเม็ดเคลือบฟิล์ม
LONSURF (ลอนเซอร์ฟ)

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อสามัญว่าอะไร

- ยานี้มีชื่อสามัญว่า ไตรฟลูริดีน (trifluridine) และ ไทพิราซิล (tipiracil)

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ยานี้ใช้รักษามะเร็งลำไส้ใหญ่ระยะแพร่กระจาย หรือ มะเร็งกระเพาะอาหารระยะแพร่กระจาย หรือมะเร็งส่วนต่อของหลอดอาหารและกระเพาะอาหาร ในผู้ใหญ่ที่แพทย์ตรวจแล้วว่าเหมาะสมที่จะใช้ยานี้

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- ⊗ ห้ามใช้ยานี้เมื่อแพ้ตัวยาไตรฟลูริดีน หรือ ไทพิราซิล หรือส่วนประกอบของยานี้

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

- ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร ในกรณีต่อไปนี้
 - เป็นโรคตับ
 - เป็นโรคไต
 - ตั้งครรภ์ หรือวางแผนตั้งครรภ์
 - ให้นมบุตร หรือวางแผนให้นมบุตร
 - อยู่ระหว่างการรักษาเอชไอวี โดยแพทย์ของท่าน อาจเปลี่ยนไปใช้ยารักษาเอชไอวีตัวอื่น

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกร เท่านั้นเพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นกับ ชนิดและความรุนแรงของโรค
- กินยานี้ภายใน 1 ชั่วโมงหลังอาหารเช้า และเย็น
- ให้กลืนยาทั้งเม็ด
- ล้างมือให้สะอาดหลังสัมผัสยาทุกครั้ง

3.2 หากลืมกินยาควรทำอย่างไร

- ไม่ควรกินยาเพิ่มเป็น 2 เท่าเพื่อชดเชยยาที่ลืมกิน
- ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรเมื่อลืมกินยานี้

3.3 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรง ให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างการใช้อย่างไร

- ให้ท่านและคู่ของท่านคุมกำเนิดในระหว่างใช้ยานี้ และ คุมกำเนิดต่อไปอีก 6 เดือน หลังจากหยุดใช้ยาแล้ว
- ไม่ควรตั้งครรภ์ระหว่างใช้ยานี้ เพราะอาจเป็นอันตรายต่อทารกในครรภ์
- หากท่านหรือคู่ของท่านตั้งครรภ์ระหว่างใช้ยานี้ ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรทันที

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

- ลมพิษ บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีจุดตามผิวหนังหรือ เลือดออกผิดปกติ
- มีอาการติดเชื้อ เช่น มีไข้ หนาวสั่น ปวดตามตัว
- หายใจสั้นถี่ รู้สึกเหนื่อย หรือซีด
- การเกิดจ้ำเลือดหรือจุดเลือดเล็ก ๆ บริเวณผิวหนัง หรือมีเลือดออกผิดปกติ

“ให้หยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที”

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์

- เบื่ออาหาร
- คลื่นไส้
- ท้องเสีย
- อ่อนเพลีย
- อาเจียน

“ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์”

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง ปล่อยให้โดนแสงโดยตรง โดยทั่วไป ควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- ไม่ใช้ยาหลังวันหมดอายุที่ระบุไว้บนฉลากยา
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

• ลักษณะยา

ลอนเซอร์ฟ ชนิดเม็ดเคลือบฟิล์ม 15 มก. และ 6.14 มก.: ยาเม็ดเคลือบฟิล์ม สีขาว กลม นูนทั้งสองด้าน ด้านหนึ่งมีตัวเลข “15” อีกด้านหนึ่งมีตัวเลขและตัวอักษร “102” และ “15 mg” พิมพ์ด้วยหมึกสีเทา

ลอนเซอร์ฟ ชนิดเม็ดเคลือบฟิล์ม 20 มก. และ 8.19 มก.: ยาเม็ดเคลือบฟิล์ม สีแดงอ่อน กลม นูนทั้งสองด้าน ด้านหนึ่งมีตัวเลข “20” อีกด้านหนึ่งมีตัวเลขและตัวอักษร “102” และ “20 mg” พิมพ์ด้วยหมึกสีเทา

• ตัวยาสำคัญ

ลอนเซอร์ฟ ชนิดเม็ดเคลือบฟิล์ม 15 มก. และ 6.14 มก. มี ไตรฟลูริดีน 15 มิลลิกรัมและไทพิราซิล 6.14 มิลลิกรัม

ลอนเซอร์ฟ ชนิดเม็ดเคลือบฟิล์ม 20 มก. และ 8.19 มก. มี ไตรฟลูริดีน 20 มิลลิกรัม และไทพิราซิล 8.19 มิลลิกรัม

- ส่วนประกอบอื่น ๆ ได้แก่ lactose monohydrate (แลคโตส โมโนไฮเดรท), pregelatinized starch

(แป้งพรีเจลาตินไนซ์), stearic acid (กรดสเตียริก), hypromellose (ไฮโปรมेलโลส), polyethylene glycol (โพลีเอทรีลีน ไกลคอล), titanium dioxide (ไททาเนียม ไดออกไซด์), magnesium stearate (แมกนีเซียม สเตียเรท), grey ink (หมึกพิมพ์สีเทา) เจพายาเม็ดสีแดงอ่อนแต่งสีด้วย ferric oxide (เฟอร์ริก ออกไซด์) (สีแดง)

ผู้ผลิต: Taiho Pharmaceutical Co., Ltd.

ประเทศญี่ปุ่น

ผู้นำเข้า: บริษัท ดิทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จำกัด

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ 30 กรกฎาคม 2563

คำเตือน

ยานี้อาจทำให้เกิดอันตรายร้ายแรงและควรใช้ภายใต้การดูแลของแพทย์

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.

- <http://www.fda.moph.go.th/sites/oss/Pages/Main.aspx>
- <http://ndi.fda.moph.go.th/>

**เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร**