

เอกสารกำกับยาภาษาไทยสำหรับผู้ป่วย

คำแนะนำการใช้ยาสำหรับผู้ป่วย

โวกานาเมท®

(คานากลิฟลอสิน และ เม็ทฟอร์มินไฮโดรคลอไรด์)

รูปแบบเม็ด

ข้อมูลที่สำคัญที่สุดที่ฉันทควรทราบเกี่ยวกับโวกานาเมทคืออะไร?

โวกานาเมทสามารถทำให้เกิดอาการข้างเคียงที่รุนแรง ประกอบด้วย:

- **ภาวะแล็กติกแอซิดอซิซ (lactic acidosis)** เม็ทฟอร์มินซึ่งเป็นยาตัวหนึ่งในโวกานาเมทสามารถทำให้เกิดภาวะร้ายแรงแต่พบน้อยที่เรียกว่า แล็กติกแอซิดอซิซ (lactic acidosis) (มีการสะสมของกรดแล็กติกในเลือด) ที่สามารถทำให้เสียชีวิตได้ ภาวะแล็กติกแอซิดอซิซ (lactic acidosis) เป็นกรณีฉุกเฉินทางการแพทย์และต้องได้รับการรักษาในโรงพยาบาล

แจ้งแพทย์ทันทีถ้าคุณมีอาการดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจจะเป็นอาการแสดงของภาวะแล็กติกแอซิดอซิซ (lactic acidosis):

- | | |
|---|---|
| ○ คุณรู้สึกเย็นที่มือหรือเท้า | ○ คุณมีอาการหัวใจเต้นช้าหรือไม่สม่ำเสมอ |
| ○ คุณรู้สึกอ่อนแรงมากหรือเหนื่อย | ○ คุณมีอาการปวดกล้ามเนื้อผิดปกติ (ไม่ปกติ) |
| ○ คุณมีอาการหายใจลำบาก | ○ คุณมีอาการร่วงนอนผิดปกติหรือนอนหลับยาวนานกว่าปกติ |
| ○ คุณมีอาการปวดท้อง คลื่นไส้ หรือ อาเจียน | ○ คุณรู้สึกเวียนศีรษะหรือหน้ามืดเป็นลม |

ส่วนใหญ่ผู้ที่เคยมีภาวะแล็กติกแอซิดอซิซ (lactic acidosis) จะมีภาวะอื่นที่เมื่อร่วมกับการใช้เม็ทฟอร์มินแล้วจะนำไปสู่ภาวะแล็กติกแอซิดอซิซ (lactic acidosis) แจ้งแพทย์ถ้าคุณมีอาการดังต่อไปนี้ เพราะว่าคุณมีโอกาสสูงที่จะเกิดภาวะแล็กติกแอซิดอซิซ (lactic acidosis) เมื่อใช้ยาโวกานาเมท ถ้าคุณ:

- มีปัญหาทางไตขั้นรุนแรง หรือไตของคุณได้รับผลกระทบจากการทดสอบเอ็กซเรย์บางชนิดที่ใช้สารฉีดสี
- มีปัญหาทางตับ

- ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บ่อยมาก หรือดื่มแอลกอฮอล์ปริมาณมากในช่วงเวลาสั้น ๆ (การดื่มแบบยกหมดแก้ว (“binge” drinking))
- มีภาวะขาดน้ำ (สูญเสียของเหลวในร่างกายปริมาณมาก) สิ่งนี้สามารถเกิดขึ้นได้ถ้าคุณป่วย มีไข้ อาเจียน หรือท้องเสีย ภาวะขาดน้ำยังสามารถเกิดขึ้นได้เมื่อคุณเหงื่อออกมากจากกิจกรรมหรือการออกกำลังกายและไม่ได้ดื่มน้ำอย่างเพียงพอ
- มีการผ่าตัด
- มีภาวะหัวใจล้มเหลว ติดเชื้อชนิดรุนแรง หรือโรคหลอดเลือดสมอง

แนวทางที่ดีที่สุดในการหลีกเลี่ยงปัญหาเกี่ยวกับภาวะแล็กติกแอซิดอซิซิส (lactic acidosis) จากเม็ทฟอร์มิน คือ แจ้งแพทย์ถ้าคุณมีปัญหาในรายการด้านบน แพทย์จะตัดสินใจหยุดโวกานาเมทเป็นเวลาหนึ่งถ้าคุณมีอาการเหล่านั้น

- การตัดขา โวกานาเมทอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการตัดขาได้ การตัดขาส่วนใหญ่รวมถึงการตัดนิ้วเท้าหรือส่วนของเท้า อย่างไรก็ตาม ยังเคยเกิดการตัดขาซึ่งรวมถึงขา ช่วงล่างและช่วงบนของหัวเข่า บางคนมีการตัดขามากกว่า 1 ครั้ง บางคนเป็นทั้งสองด้านของร่างกาย

คุณอาจมีความเสี่ยงต่อการตัดขาที่สูงขึ้น ถ้าคุณ:

- มีประวัติเคยถูกตัดขา
- เป็นโรคหัวใจ หรือมีความเสี่ยงต่อโรคหัวใจ
- เคยมีการอุดตันของหลอดเลือด หรือหลอดเลือดตีบ ส่วนใหญ่ที่ขา
- มีการทำลายของเส้นประสาทที่ขา (โรคเส้นประสาท)
- เคยมีแผลที่เท้าหรือมีอาการเจ็บที่เท้าซึ่งเกิดจากโรคเบาหวาน

รีบแจ้งแพทย์โดยทันทีถ้าคุณเริ่มมีอาการปวดหรือมีอาการกดเจ็บ อาการเจ็บ แผล หรือติดเชื้อที่ขา และเท้า แพทย์อาจตัดสินใจหยุดโวกานาเมทเป็นเวลาสักระยะถ้าคุณมีอาการหรืออาการแสดงเหล่านี้

ปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับการดูแลเท้าที่เหมาะสม

โวกานาเมทสามารถทำให้เกิดอาการข้างเคียงที่รุนแรงอื่น ๆ ได้ ดูหัวข้อ “อาการข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นได้จากโวกานาเมทมีอะไรบ้าง?”

โวกานาเมทคืออะไร?

- โวกานาเมทประกอบด้วยยา 2 ชนิด คือ คานากลิฟลอสซิน (อินโวกานา) และเม็ทฟอร์มินไฮโดรคลอไรด์ (กลูโคฟาจ) โวกานาเมทสามารถใช้ร่วมกับการควบคุมอาหารและการออกกำลังกายเพื่อให้การควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด (กลูโคส) ดีขึ้นในผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 เมื่อมีความเหมาะสมที่จะรักษาด้วย คานากลิฟลอสซิน และเม็ทฟอร์มิน
- โวกานาเมท ไม่ใช้ในผู้ที่มีภาวะไตแอบิติกคิโทแอซิดอซิซิส (diabetic ketoacidosis) (ระดับของคีโตนในเลือดหรือปัสสาวะเพิ่มขึ้น)
- ยังไม่ทราบถึงความปลอดภัย และประสิทธิผลของโวกานาเมทในเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี

ใครไม่ควรใช้โวกานาเมท?

ห้ามใช้โวกานาเมท ถ้าคุณ:

- มีปัญหาทางไตขั้นปานกลางถึงรุนแรง หรือกำลังได้รับการล้างไต
- มีภาวะเมแทบอลิกแอซิดอซิซิส (metabolic acidosis) หรือไตแอบิติกคิโทแอซิดอซิซิส (diabetic ketoacidosis) (ระดับของคีโตนในเลือดหรือปัสสาวะเพิ่มขึ้น)
- แพ้ต่อคานากลิฟลอสซิน เม็ทฟอร์มิน หรือส่วนประกอบอื่น ๆ ในโวกานาเมท ดูที่ส่วนท้ายของเอกสารกำกับยาฉบับนี้สำหรับรายการส่วนประกอบในโวกานาเมท อาการของปฏิกิริยาแพ้ต่อโวกานาเมทอาจประกอบด้วย:
 - ผื่นผิวหนัง
 - เกิดรอยบวมแดงบนผิวหนัง (ลมพิษ)
 - มีอาการบวมบริเวณใบหน้า ริมฝีปาก ปาก ลิ้น และลำคอ ซึ่งส่งผลทำให้หายใจหรือกลืนลำบาก

ฉันควรแจ้งอะไรกับแพทย์ก่อนใช้โวกานาเมท?

ก่อนคุณใช้โวกานาเมท แจ้งแพทย์ถ้าคุณ:

- มีประวัติเคยถูกตัดขา
- เป็นโรคหัวใจหรือมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจ

- เคยมีการอุดตันหรือตีบของหลอดเลือด โดยเฉพาะที่ขา
- มีการทำลายเส้นประสาท (โรคเส้นประสาท) ที่ขา
- เคยมีแผลที่เท้าหรือมีอาการเจ็บที่เท้าซึ่งเกิดจากโรคเบาหวาน
- มีปัญหาทางไตขั้นปานกลางถึงรุนแรง
- มีปัญหาทางตับ
- มีประวัติการติดเชื้อบริเวณทางเดินปัสสาวะ หรือปัญหาเกี่ยวกับการปัสสาวะ
- กำลังอยู่ในระหว่างควบคุมอาหารให้มีโซเดียม (เกลือ) ต่ำ แพทย์อาจเปลี่ยนการควบคุมอาหาร หรือขนาดยาโวนานาเมท
- เคยเกิดปฏิกิริยาแพ้ต่อโวนานาเมท
- กำลังจะได้รับการฉีดสี หรือสารทึบรังสี (contrast agents) สำหรับกระบวนการเอ็กซเรย์ อาจจำเป็นต้องหยุดโวนานาเมทเป็นเวลาสั้น ๆ สอบถามแพทย์ว่าคุณควรหยุดโวนานาเมทเมื่อไรและเมื่อไรที่คุณควรเริ่มใช้โวนานาเมทอีกครั้ง ดูหัวข้อ “ข้อมูลที่สำคัญที่สุดที่ฉันควรทราบเกี่ยวกับโวนานาเมทคืออะไร?”
- มีปัญหาด้านหัวใจ รวมถึงภาวะหัวใจวาย (congestive heart failure)
- กำลังจะได้รับการผ่าตัด
- เริ่มมีการรับประทานน้อยลง เนื่องจากเจ็บป่วย ผ่าตัด หรือเปลี่ยนแปลงการควบคุมอาหาร
- มีหรือเคยมีปัญหาด้านตับอ่อน ประกอบด้วย ตับอ่อนอักเสบ หรือตับอ่อนได้รับการผ่าตัด
- ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บ่อยมาก หรือดื่มแอลกอฮอล์ปริมาณมากในช่วงเวลาสั้น ๆ (การดื่มแบบยกหมดแก้ว (“binge” drinking))
- มีภาวะทางการแพทย์อื่น ๆ
- กำลังตั้งครรภ์ หรือวางแผนตั้งครรภ์ โวนานาเมทอาจเป็นอันตรายต่อทารกในครรภ์ หากคุณมีการตั้งครรภ์ในระหว่างที่กำลังใช้โวนานาเมท ให้รีบแจ้งแพทย์โดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ ปรึกษาแพทย์ถึงแนวทางที่ดีที่สุดในการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของคุณในระหว่างที่คุณกำลังตั้งครรภ์
- สตรีวัยก่อนหมดประจำเดือน (ก่อน “การเปลี่ยนแปลงของชีวิต”) ผู้ที่มีประจำเดือนไม่สม่ำเสมอ หรือไม่มีประจำเดือนเลย โวนานาเมทสามารถเพิ่มโอกาสในการตั้งครรภ์ได้ ปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับ

การคุมกำเนิดในระหว่างที่มีการใช้โวกานาเมทถ้าคุณไม่ได้วางแผนที่จะมีการตั้งครรภ์ รีบแจ้งแพทย์ โดยทันทีถ้าคุณตั้งครรภ์ระหว่างที่กำลังใช้โวกานาเมท

- กำลังให้นมบุตรหรือวางแผนจะให้ให้นมบุตร โวกานาเมทอาจผ่านสู่น้ำนมได้และอาจเป็นอันตรายต่อทารกของคุณ ปรีกษาแพทย์ถึงแนวทางที่ดีที่สุดที่จะให้อาหารทารกของคุณถ้าคุณกำลังใช้โวกานาเมท ห้ามให้นมบุตรในระหว่างที่ใช้โวกานาเมท

แจ้งแพทย์เกี่ยวกับยาทุกตัวที่คุณกำลังใช้อยู่ รวมถึงยาที่แพทย์สั่ง และยาที่ซื้อใช้เอง วิตามิน และยาสมุนไพร

โวกานาเมทอาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของยาตัวอื่น และยาตัวอื่นอาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของโวกานาเมท แจ้งแพทย์โดยเฉพาะถ้าคุณกำลังใช้:

- ยาขับปัสสาวะ (ยาขับน้ำ)
- ไรแฟมพิน (ใช้ในการรักษาหรือป้องกันวัณโรค)
- ฟินิโตอิน หรือฟีโนบาร์บิทัล (ใช้ในการควบคุมอาการชัก)
- ไรโทนาเวียร์ (ใช้ในการรักษาการติดเชื้อเอชไอวี)
- ดิจ็อกซิน (ใช้ในการรักษาโรคหัวใจ)

สอบถามแพทย์หรือเภสัชกรสำหรับรายการยาเหล่านี้ถ้าคุณไม่แน่ใจว่ายยาของคุณอยู่ในรายการดังกล่าวหรือไม่

คุณควรทราบว่าคุณกำลังใช้ยาตัวใดอยู่ให้เก็บรายการยาไว้และแสดงให้แพทย์หรือเภสัชกรดูเมื่อคุณได้รับยาตัวใหม่

ฉันควรใช้โวกานาเมทอย่างไร?

- ใช้โวกานาเมทโดยการรับประทาน วันละ 2 ครั้ง พร้อมอาหาร ตามที่แพทย์สั่ง รับประทานโวกานาเมทพร้อมอาหารอาจลดโอกาสในการเกิดการระคายเคืองกระเพาะอาหาร
- แพทย์จะเป็นคนแจ้งคุณว่าคุณต้องรับประทานยาปริมาณเท่าไรและเวลาใด แพทย์อาจปรับเปลี่ยนขนาดยาของคุณถ้ามีความจำเป็น
- แพทย์อาจแจ้งคุณให้รับประทานโวกานาเมทร่วมกับยารักษาโรคเบาหวานตัวอื่น ภาวะระดับน้ำตาลในเลือดต่ำสามารถเกิดขึ้นได้บ่อยขึ้นเมื่อใช้โวกานาเมทร่วมกับยารักษาโรคเบาหวานบางชนิด ดูหัวข้อ “อาการข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นได้จากโวกานาเมทมีอะไรบ้าง?”

- ถ้าคุณลืมรับประทานยาให้รับประทานยาทันทีที่นึกได้ ถ้าเป็นเวลาใกล้ถึงมือยาถัดไปให้ข้ามมื้อที่ลืมและรับประทานยามื้อถัดไปตามเวลาปกติ ห้ามเพิ่มขนาดไวคานาเมทเป็น 2 เท่าในเวลาเดียวกันปรึกษาแพทย์ถ้าคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการลืมรับประทานยา
- ถ้าคุณรับประทานไวคานาเมทมากเกินไป รีบแจ้งแพทย์หรือไปห้องฉุกเฉินที่โรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดโดยทันที
- เมื่อร่างกายของคุณอยู่ในภาวะเครียดบางชนิด เช่น มีไข้ ได้รับความเจ็บ (เช่น อุบัติเหตุทางรถยนต์) ติดเชื้อ หรือผ่าตัด อาจจำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนปริมาณยารักษาโรคเบาหวาน ปรึกษาแพทย์โดยทันทีถ้าคุณมีภาวะเหล่านี้ และปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์
- ให้ปฏิบัติตามการควบคุมอาหาร และตารางการออกกำลังกายของคุณที่แพทย์สั่งในระหว่างที่กำลังใช้ไวคานาเมท
- ตรวจสอบระดับน้ำตาลในเลือดตามที่แพทย์สั่ง
- ไวคานาเมทจะส่งผลให้การตรวจปัสสาวะของคุณมีค่าบวกต่อกลูโคส
- แพทย์อาจทำการตรวจเลือดบางชนิดก่อนที่คุณจะเริ่มไวคานาเมทและระหว่างทำการรักษา ถ้ามีความจำเป็นแพทย์อาจปรับเปลี่ยนขนาดยาไวคานาเมทโดยขึ้นกับผลจากการตรวจเลือดของคุณ
- แพทย์จะตรวจเบาหวานโดยการตรวจเลือดด้วยวิธีปกติ ประกอบด้วยระดับน้ำตาลในเลือด และค่าฮีโมโกลบินเอวันซี (A_{1c})

ฉันทควรหลีกเลี่ยงอะไรในระหว่างที่กำลังใช้ไวคานาเมท?

- ให้หลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บ่อยมาก หรือดื่มแอลกอฮอล์ปริมาณมากในช่วงเวลาสั้น ๆ (การดื่มแบบยกหมดแก้ว ("binge" drinking)) สิ่งนี้สามารถเพิ่มโอกาสของคุณในการเกิดอาการข้างเคียงที่รุนแรงได้

อาการข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นได้จากไวคานาเมทมีอะไรบ้าง?

ไวคานาเมทอาจส่งผลให้เกิดอาการข้างเคียงที่รุนแรง ประกอบด้วย:

- ดูหัวข้อ “ข้อมูลที่สำคัญที่สุดที่ฉันทควรทราบเกี่ยวกับไวคานาเมทคืออะไร?”

- **ภาวะขาดน้ำ** ไวคานาเมทสามารถส่งผลให้บางคนมีภาวะขาดน้ำ (สูญเสียน้ำในร่างกายปริมาณมากเกินไป) ภาวะขาดน้ำอาจส่งผลให้คุณรู้สึกเวียนศีรษะ หงุดหงิด หน้ามืดเป็นลม หรืออ่อนแรง โดยเฉพาะเมื่อคุณลุกขึ้นยืน (ความดันโลหิตต่ำขณะเปลี่ยนท่า)

คุณอาจมีความเสี่ยงสูงขึ้นที่จะมีภาวะขาดน้ำถ้าคุณ:

- มีความดันโลหิตต่ำ
- ใช้ยาที่ทำให้ความดันโลหิตต่ำลง ประกอบด้วยยาขับปัสสาวะ (ยาขับน้ำ)
- กำลังอยู่ในระหว่างควบคุมอาหารให้มีโซเดียม (เกลือ) ต่ำ
- มีปัญหาทางไต
- อายุตั้งแต่ 65 ปีเป็นต้นไป

ปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับสิ่งที่คุณสามารถทำได้ในการป้องกันภาวะขาดน้ำ รวมถึงปริมาณน้ำที่คุณควรดื่มในชีวิตประจำวัน

- **ภาวะคีโตนแอซิดอซิซ (ketoacidosis) (ระดับของคีโตนในเลือดหรือปัสสาวะเพิ่มสูงขึ้น)** ในระหว่างการรักษาด้วยคานากลิฟลอสซินซึ่งเป็นยาตัวหนึ่งในไวคานาเมท เคยเกิดภาวะคีโตนแอซิดอซิซ (ketoacidosis) ในผู้ที่เป็โรคเบาหวานชนิดที่ 1 หรือ ชนิดที่ 2 ภาวะคีโตนแอซิดอซิซ (ketoacidosis) เป็นภาวะที่รุนแรงซึ่งอาจจำเป็นต้องได้รับการรักษาในโรงพยาบาล ภาวะคีโตนแอซิดอซิซ (ketoacidosis) อาจทำให้เสียชีวิตได้ ภาวะคีโตนแอซิดอซิซ (ketoacidosis) สามารถเกิดขึ้นจากไวคานาเมท แม้วาระดับน้ำตาลในเลือดของคุณต่ำกว่า 250 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร ให้หยุดใช้ไวคานาเมทและรีบแจ้งแพทย์โดยทันทีถ้าคุณมีอาการดังต่อไปนี้:

- คลื่นไส้
- อาเจียน
- ปวดบริเวณท้อง (เกี่ยวกับท้อง)
- เหนื่อย
- หายใจลำบาก

ถ้าคุณมีอาการเหล่านี้ระหว่างที่กำลังรักษาด้วยไวคานาเมท ถ้าเป็นไปได้ให้ตรวจสอบคีโตนในปัสสาวะของคุณ แม้วาระดับน้ำตาลในเลือดของคุณจะต่ำกว่า 250 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร

- **ปัญหาทางไต** การบาดเจ็บที่ไตโดยเฉียบพลันเคยเกิดขึ้นในผู้ที่ใช้ไวคานาเมท รีบแจ้งแพทย์โดยทันทีถ้าคุณ:

- รับประทานอาหารปริมาณลดลง หรือดื่มเครื่องดื่มลดลง ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณป่วย หรือไม่สามารถรับประทานอาหารได้ หรือ
- คุณเริ่มมีอาการสูญเสียของเหลวจากร่างกายของคุณ ตัวอย่างเช่น จากการศึกษาเหนื่อย ท้องเสีย หรืออยู่กลางแดดนานเกินไป

- ปริมาณโพแทสเซียมในเลือดสูง
- การติดเชื้อบริเวณทางเดินปัสสาวะขั้นรุนแรง การติดเชื้อบริเวณทางเดินปัสสาวะขั้นรุนแรงที่สามารถนำไปสู่การรักษาตัวในโรงพยาบาล เคยมีการเกิดขึ้นในผู้ที่ได้รับคานากลิฟลอสซินซึ่งเป็นยาตัวหนึ่งในโรคความเมท แจ็งแพทย์ถ้าคุณมีอาการหรืออาการแสดงของการติดเชื้อบริเวณทางเดินปัสสาวะ เช่น ความรู้สึกแสบร้อนในขณะที่กำลังปัสสาวะ มีความต้องการปัสสาวะบ่อย มีความต้องการปัสสาวะทันทีทันใด ปวดบริเวณช่วงล่างของท้อง (เชิงกราน) หรือปัสสาวะมีเลือดปน บางครั้งอาจมีไข้ ปวดหลัง คลื่นไส้ หรืออาเจียน
- ระดับน้ำตาลในเลือดต่ำ (ภาวะระดับน้ำตาลในเลือดต่ำ) ถ้าคุณใช้โรคความเมทร่วมกับยาตัวอื่นที่สามารถส่งผลให้ระดับน้ำตาลในเลือดลดลงได้ เช่น ยากลุ่มซัลโฟนิลยูเรีย หรืออินซูลิน คุณมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นที่จะเกิดภาวะระดับน้ำตาลในเลือดต่ำ อาจจำเป็นที่จะต้องลดขนาดของยากลุ่มซัลโฟนิลยูเรีย หรืออินซูลิน ในระหว่างที่คุณใช้โรคความเมท อาการและอาการแสดงของภาวะระดับน้ำตาลในเลือดต่ำ อาจประกอบด้วย:

○ ปวด	○ ง่วงซึม	○ อ่อนแรง	○ สับสน	○ เวียนศีรษะ
○ หงุดหงิด	○ รู้สึกหิว	○ หัวใจเต้นเร็ว	○ เหงื่อออก	○ สั่น หรือ รู้สึกกระวนกระวายใจ
- ติดเชื้อราในช่องคลอด สตรีที่ใช้โรคความเมทอาจเกิดการติดเชื้อราในช่องคลอดได้ อาการของการติดเชื้อราในช่องคลอดประกอบด้วย:
 - ช่องคลอดมีกลิ่น
 - ตกขาวสีขาวหรือสีเหลือง (ตกขาวอาจมีลักษณะเป็นก้อน หรือคล้ายคอทเทจชีส (Cottage cheese))
 - คันบริเวณช่องคลอด

- **ติดเชื้อราบริเวณองคชาต (ส่วนหัวองคชาตอักเสบ (balanitis) หรือส่วนหัวองคชาตและหนังหุ้มปลายองคชาตอักเสบ (balanoposthitis))** ผู้ชายที่ใช้ไวคานาเมทอาจเกิดการติดเชื้อราที่ผิวหนังบริเวณองคชาตได้ ผู้ชายบางคนผู้ที่ไม่ได้ทำการขลิบอาจเกิดการบวมขององคชาตได้ที่ทำให้ยากในการดึงกลับของ ผิวนั้นรอบบริเวณส่วนปลายองคชาต อาการอื่นของการติดเชื้อบริเวณองคชาต ประกอบด้วย:

- แดง คัน หรือบวมบริเวณองคชาต
- มีผื่นผิวหนังบริเวณองคชาต
- หลั่งสารคัดหลั่งที่มีกลิ่นเหม็นจากองคชาต
- เจ็บปวดที่ผิวหนังรอบ ๆ องคชาต

ปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับสิ่งที่ควรปฏิบัติถ้าคุณมีอาการของการติดเชื้อราในช่องคลอดหรือบริเวณองคชาต แพทย์อาจแนะนำให้คุณให้ใช้ยาด้านเชื้อราที่สามารถซื้อเองได้ รับประทานโดยทันทีถ้าคุณใช้ยาด้านเชื้อราที่ซื้อเองแล้ว และอาการเหล่านี้ไม่หายไป

- **ปฏิกิริยาการแพ้ขั้นรุนแรง** ถ้าคุณมีอาการของปฏิกิริยาการแพ้ขั้นรุนแรง ให้หยุดใช้ไวคานาเมท และรีบแจ้งแพทย์โดยทันทีหรือไปห้องฉุกเฉินที่โรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดโดยทันที ดูหัวข้อ **“ใครไม่ควรใช้ไวคานาเมท?”** แพทย์อาจให้ยาคุณสำหรับปฏิกิริยาการแพ้และส่งจ่ายยาสำหรับรักษาโรคเบาหวานตัวอื่น
- **กระดูกหัก (แตก)** การกระดูกหักเคยพบในผู้ป่วยที่ใช้คานากลิฟลอสซิน ปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับปัจจัยที่อาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดการกระดูกหัก
- **วิตามินบี 12 ต่ำ (ภาวะขาดวิตามินบี 12)** การใช้เม็ทฟอร์มินเป็นระยะเวลานานอาจส่งผลให้ปริมาณวิตามินบี 12 ในเลือดของคุณลดลง โดยเฉพาะถ้าคุณเคยมีระดับวิตามินบี 12 ในเลือดต่ำมาก่อน แพทย์อาจทำการตรวจเลือดเพื่อตรวจสอบระดับวิตามินบี 12 ของคุณ

อาการข้างเคียงทั่วไปอื่น ๆ ของไวคานาเมท ประกอบด้วย:

- คลื่นไส้ และ อาเจียน
- ท้องเสีย
- อ่อนแรง
- มีแก๊ส
- ไม่สบายท้อง
- อาหารไม่ย่อย
- ปวดศีรษะ
- การปัสสาวะมีการเปลี่ยนแปลง ประกอบด้วย มีความต้องการปัสสาวะอย่างเร่งด่วนบ่อยมากกว่าปกติ ในปริมาณมาก หรือในเวลากลางคืน

แจ้งแพทย์ถ้าคุณมีอาการข้างเคียงที่รบกวนคุณ หรือไม่หายไป อาการเหล่านี้ไม่ได้เป็นอาการข้างเคียงทั้งหมดที่อาจเกิดขึ้นได้จากโวกานาเมท สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดสอบถามแพทย์หรือเภสัชกร

ให้สอบถามแพทย์เพื่อขอคำแนะนำทางการแพทย์เกี่ยวกับอาการข้างเคียง คุณอาจรายงานอาการข้างเคียงต่อสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาของประเทศไทยได้

คุณอาจรายงานอาการข้างเคียงไปยังบริษัท แจนเซน-ซีแลก จำกัดได้

ฉันจะเก็บรักษาโวกานาเมทอย่างไร?

- ห้ามเก็บโวกานาเมทที่อุณหภูมิสูงกว่า 30 องศาเซลเซียส
- ให้เก็บยาในภาชนะบรรจุเดิมเพื่อป้องกันจากความชื้น ส่วนการเก็บยาในกล่องยา (pill box) หรือ ตลับยาตามวัน (pill organizer) อนุญาตให้เป็นเวลา 30 วัน
- ดูวันหมดอายุบนกล่องยา

เก็บโวกานาเมทและยาทุกตัวให้พ้นจากมือเด็ก

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการใช้โวกานาเมทอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ

ยาในบางครั้งอาจถูกส่งจ่ายด้วยวัตถุประสงค์นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในเอกสารกำกับยา ห้ามใช้โวกานาเมทสำหรับภาวะที่ไม่ได้แพทย์ไม่ได้ระบุ ห้ามให้โวกานาเมทแก่ผู้อื่นแม้ว่าพวกเขาจะมีอาการเดียวกับคุณ เนื่องจากอาจเป็นอันตรายต่อพวกเขาได้

เอกสารกำกับยานี้ได้รวบรวมข้อมูลที่สำคัญที่สุดเกี่ยวกับโวกานาเมท ถ้าคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ให้ปรึกษาแพทย์ คุณสามารถสอบถามเภสัชกรหรือแพทย์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโวกานาเมทที่มีการระบุสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ได้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโวกานาเมท โปรดอ่านเอกสารกำกับยานี้ได้ที่เว็บไซต์

<http://ndi.fda.moph.go.th/>

ส่วนประกอบของโวกานาเมทมีอะไรบ้าง?

ตัวยาสำคัญ: คานากลิฟลอสซิน และเม็ทฟอร์มินไฮโดรคลอไรด์

สารประกอบที่ไม่มีฤทธิ์: ส่วนเม็ดแกน ประกอบด้วย คออสคาร์เมลโลสโซเดียม ไฮโปรเมลโลส แมกนีเซียมสเตียเรต และไมโครคริสตัลลินเซลลูโลส ส่วนแมกนีเซียมสเตียเรตมีที่มาจากผัก นอกจากนี้ ส่วนเคลือบเม็ดยา ประกอบด้วย แมโครกอล 3350 โพลีไวนิลแอลกอฮอล์ (ที่ผ่านการไฮโดรไลซ์บางส่วน) ทาลค์ ไทเทเนียมไดออกไซด์ ไอรอนออกไซด์เยลโลว์ (สำหรับยาเม็ดขนาด 150 มิลลิกรัม/500 มิลลิกรัม เท่านั้น) และไอรอนออกไซด์เรด (สำหรับยาเม็ดขนาด 150 มิลลิกรัม/500 มิลลิกรัม เท่านั้น)

ลักษณะและส่วนประกอบของภาชนะบรรจุ: บรรจุในขวดพลาสติกชนิดเอชดีพีอี (HDPE) ชนิดป้องกันเด็กเปิด พร้อมซองสารกันชื้น บรรจุยาเม็ดเคลือบฟิล์มขนาด 20, 60 และ 180 เม็ด

คำเตือนตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข

1. ห้ามใช้ในผู้ที่เคยแพ้ยานี้
2. ห้ามใช้รักษาโรคเบาหวานชนิดที่ 1 ผู้ป่วยภาวะ ketoacidosis ผู้ป่วยภาวะติดเชื้อรุนแรง ผู้ป่วยได้รับอุบัติเหตุรุนแรง
3. สตรีมีครรภ์ควรหลีกเลี่ยงการใช้ยานี้ และสตรีให้นมบุตรระมัดระวังในการใช้ยานี้
4. ไม่ควรใช้ยานี้ร่วมกับเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
5. หากผู้ป่วยมีอาการ คลื่นไส้ อาเจียน เบื่ออาหาร ปวดท้อง หิวน้ำผิดปกติ อ่อนเพลีย หายใจลำบาก สับสน แม้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงไม่มาก ให้รีบปรึกษาแพทย์ หรือเภสัชกรเนื่องจากอาจเกิดอาการ diabetic ketoacidosis
6. ควรระมัดระวังการติดเชื้อแบคทีเรีย และเชื้อราที่อวัยวะเพศ และระบบทางเดินปัสสาวะในผู้ป่วยที่ใช้ยานี้
7. ต้องใช้ยานี้ตามแพทย์สั่งเท่านั้น หากมีอาการวิงเวียนจะเป็นลมให้รีบปรึกษาแพทย์

ผลิตโดย

Janssen Ortho, LLC

Gurabo ประเทศเปอร์โตริโก

เลขทะเบียนตำรับยา

ไวคานาเมท ขนาด 50/500 มิลลิกรัม: 2C XX/XX (NC)

ไวคานาเมท ขนาด 150/500 มิลลิกรัม: 2C XX/XX (NC)

วันที่ได้รับอนุมัติทะเบียนตำรับยา

DD MMM YYYY

วันที่แก้ไขเอกสารกำกับยาล่าสุด พฤศจิกายน 2560

ได้รับลิขสิทธิ์จาก **Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation**

นำเข้าโดย

บริษัท แจนเซ่น-ซีแลก จำกัด

106 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง

กรุงเทพฯ 10520

โทรศัพท์: 02-792-7200

โทรสาร: 02-792-7222