

**เอทอริคอกสิบ อัลโวเจน**  
**30, 60, 90, 120 มิลลิกรัม**  
**ชนิดเม็ดเคลือบฟิล์ม**

**1. ยานี้คืออะไร**

**1.1 ยานี้มีชื่อสามัญว่าอะไร**

ยานี้มีชื่อสามัญว่า เอทอริคอกสิบ (etoricoxib) อยู่ใน ยากลุ่มต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตอรอยด์ (NSAIDs) ประเภทออกฤทธิ์ยับยั้งเฉพาะเอนไซม์ที่ชื่อว่า COX-2

**1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร**

- ยานี้ใช้เพื่อลดอาการอักเสบ (ปวดและบวม) ในผู้ป่วย โรคข้อเข่าเสื่อม โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ โรคกระดูกสันหลังอักเสบยึดติด และโรคเกาต์
- ยานี้ใช้เพื่อลดอาการปวดแบบปวดปานกลางจาก การผ่าตัดช่องปากหรือการทำฟัน

**2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา**

**2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร**

- ห้ามใช้เมื่อเคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้
- ห้ามใช้ถ้ามีแผลหรือมีเลือดออกที่ทางเดินอาหาร กระเพาะอาหารหรือลำไส้
- ห้ามใช้ถ้าเป็นโรคตับหรือโรคไตอย่างรุนแรง และเป็น โรคหัวใจหรือความดันเลือดสูง
- ห้ามใช้ถ้าท้องหรือให้นมลูกอยู่
- ห้ามใช้ถ้าอายุต่ำกว่า 16 ปี

**2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้ หากท่านมีภาวะต่อไปนี้**

- ควรระวังถ้าเคยมีเลือดออกหรือมีแผลในกระเพาะอาหาร ถ้าเคยเป็นโรคหัวใจหรือความดันเลือดสูง ถ้าเคยเป็นโรคตับหรือโรคไต
- ควรระวังถ้ากำลังวางแผนมีลูก และระวังในคนสูงอายุ
- ถ้าไม่แน่ใจให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยา

**3. วิธีใช้ยา**

**3.1 ขนาดและวิธีใช้ ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกร** เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นกับความรุนแรงของโรค

- ขนาดยาทั่วไป คือ กินวันละ 30 – 120 มิลลิกรัม และไม่ควรงินยานี้ต่อเนื่องกันนาน
- กินยานี้พร้อมอาหารหรือตอนท้องว่างก็ได้ แต่จะออกฤทธิ์ได้เร็วกว่า ถ้ากินตอนท้องว่าง

**3.2 หากลืมกินยาควรทำอย่างไร**

- หากลืมกินยาให้กินทันทีที่นึกได้ แต่ถ้าใกล้ถึงเวลา กินยาของมื้อถัดไป ให้รอไปกินมื้อถัดไปเลย และห้ามเพิ่มยาเป็น 2 เท่า

**3.3 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร**

- ไม่ควรงินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ
- แต่ถ้ากินยานี้เกินขนาด ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด ถ้ามีอาการผิดปกติที่รุนแรง เช่น ง่วง ซึม คลื่นไส้ อาเจียน แสบท้อง แสบยอดอก เป็นต้น ให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที

**4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา**

- ถ้าเป็นโรคตับที่ไม่รุนแรง กินยานี้ได้ไม่เกินวันละ 60 มิลลิกรัม แต่ถ้าเป็นโรคตับระดับปานกลาง ไม่ควรงินยาเกินวันละ 30 มิลลิกรัม
- ควรกินยานี้ตามคำแนะนำของแพทย์ กินยาขนาดต่ำที่สุดที่ลดอาการปวดได้
- ไม่กินยานี้เป็นเวลานานและขนาดยาที่สูงเกินไป เพราะอาจทำให้เกิดโรคหัวใจได้ง่าย
- ยานี้อาจทำให้ง่วงนอน วิงเวียน ดังนั้นควรหลีกเลี่ยง การขับรถหรือใช้เครื่องจักรกลระหว่างใช้ยา

**5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา**

**5.1 อาการที่ต้องรีบไปพบแพทย์ทันทีได้แก่**

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตาริมฝีปาก ลมพิษ
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีจ้ำตามผิวหนังหรือเลือดออกผิดปกติ
- ปวดท้องรุนแรงหรือปวดต่อเนื่อง อุจจาระมีสีดำ
- เจ็บหรือปวดคันท่อนอก
- ตัวเหลืองหรือตาเหลืองผิดปกติ

**5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องไปพบแพทย์ แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์ทันทีได้แก่**

- ปวดท้อง ปวดหัว คลื่นไส้ อาเจียน อ่อนเพลีย
- ตาฟล้ามัว ความดันเลือดสูง นอนไม่หลับ
- เบื่ออาหารหรืออาจอ้วนขึ้น บวมหน้า

**6. ควรเก็บยานี้อย่างไร**

- เก็บไว้ในภาชนะบรรจุเดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง ปล่อยให้โดนแสงโดยตรง โดยทั่วไป ควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

ผู้ผลิต : Cadila Pharmaceuticals Limited, Gujarat – 382 225, India

ผู้นำเข้า/ผู้แทนจำหน่าย : บริษัท อัลโวเจน (ประเทศไทย) จำกัด กรุงเทพฯ

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ 1 มิถุนายน 2561

**เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร**

Reference: Originator Patient Information Leaflet