

อะบิราเทอโรน
ความแรง 250 มิลลิกรัม
ชนิดเม็ด
ชื่อการค้า Birato 250
(บิราโต 250)

1. ยานี้คือยาอะไร

1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้มีชื่อว่าอะบิราเทอโรน เป็นยาในกลุ่มยาต้านมะเร็ง

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

ยานี้ใช้รักษาโรคมะเร็งต่อมลูกหมากระยะลุกลามในผู้ชาย โดยกินพร้อมกับยาเพรดนิโซโลน

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- ⊗ เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้
- ⊗ เป็นผู้หญิง โดยเฉพาะหญิงตั้งครรภ์
- ⊗ ดับมีปัญหาหรือทำงานผิดปกติอย่างรุนแรง

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

- ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร ในกรณีต่อไปนี้
 - ใช้ยา สมุนไพร หรืออาหารเสริมอื่นอยู่
 - ดับมีปัญหาหรือทำงานผิดปกติ
 - ความดันเลือดสูง เป็นโรคหัวใจ โภชนาเสื่อม ในเลือดต่ำ มีปัญหาเกี่ยวกับหัวใจ หรือ หลอดเลือด
 - หัวใจเต้นผิดปกติ หรือหัวใจเต้นเร็ว หายใจลำบาก
 - น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วผิดปกติ
 - เหนื่อย ซ้ำๆ หรือขา บวมผิดปกติ หรือมีปัญหาเกี่ยวกับกระดูก
 - เคยใช้ยาชื่อ "คีโดโคนาโซล"
 - น้ำตาลในเลือดสูง

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค
- ยานี้กินครั้งละ 4 เม็ด วันละหนึ่งครั้ง ตอนท้องว่าง ห้ามกินยาพร้อมอาหาร โดยกินพร้อมกับยาเพรดนิโซโลนตามที่แพทย์สั่ง
- กินยาก่อนอาหารอย่างน้อย 1 ชั่วโมง หรือหลังอาหารอย่างน้อย 2 ชั่วโมง
- ให้กินยาทั้งเม็ดพร้อมน้ำเปล่า ห้ามแบ่ง เคี้ยวหรือบดเม็ดยา

3.2 หากลืมหากินยาควรทำอย่างไร

- หากลืมหากินยา ให้รอกินยาของมื้อต่อไป และห้ามกินยาเพิ่มเป็นสองเท่า
- หากลืมหากินยานี้ หรือลืมหากินยาเพรดนิโซโลนเกินกว่า 1 วัน ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรโดยทันที

3.3 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรง เช่น หัวใจเต้นผิดปกติจุกหวน กล้ามเนื้ออ่อนแรง ให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- ให้ใส่ถุงยางอนามัยทุกครั้ง หรือใช้วิธีการคุมกำเนิดอื่นๆ ร่วมด้วย ในกรณีมีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงที่ตั้งครรภ์หรือหญิงที่มีโอกาสจะตั้งครรภ์
- ไม่นำยานี้ให้ผู้อื่นกิน ถึงแม้ว่าจะมีอาการหรือโรคเช่นเดียวกัน
- พบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตามผลการรักษาและอันตรายที่อาจเกิดจากยา
- ห้ามหยุดยาหรือปรับขนาดยาเอง และให้กินยานี้อย่างต่อเนื่องตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกร
- สังเกตอาการผิดปกติที่เกิด หากมีอาการผิดปกติให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร เนื่องจากบางอาการอาจไม่ถูกระบุหรือรายงานมาก่อน

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

- ลมพิษ บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก

- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผื่นหนังหลุดลอก มีจ้ำตามผิวหนังหรือเลือดออกผื่นปกติ
- กล้ามเนื้ออ่อนแรง กล้ามเนื้อกระตุก หัวใจเต้นผิดปกติ

"ให้หยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที"

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่มีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์

- ขาบวม เท้าบวม ท้องเสีย ความดันโลหิตสูง
- ปัสสาวะแสบขัด ปัสสาวะบ่อยแต่น้อย ปัสสาวะไม่สุดปวดท้องน้อยขณะปัสสาวะ

"ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่มีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์"

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อย่าวางให้โดนแสงโดยตรง โดยทั่วไปควรเก็บที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

- **ลักษณะยา** ยาเม็ดรูปรี สีขาว มีรอยพิมพ์ ABR ด้านหนึ่งและรอยพิมพ์ 250 ด้านหนึ่ง
- **ตัวยาสําคัญ** อะบิราเทอโรน อะซีเดท 250 มิลลิกรัม
- **ส่วนประกอบอื่น ๆ** แล็กโทส โนโนไฮเดรต, ครอสคาเมลโลสโซเดียม, ไมโครคริสตอลลิน เซลลูโลส, โพรโตน เค 30, โซเดียม ลอริล ซัลเฟต, น้ำบริสุทธิ์, ซิลิกา, ไดออกไซด์, แมกนีเซียม สเตียเรต

ผู้ผลิต บริษัท เอ็มเอสเอ็น แลบบอราทอรีส์ ไพรวेट จำกัด ประเทศอินเดีย

ผู้นำเข้า บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอนซ์ จำกัด (มหาชน) สมุทรปราการ ประเทศไทย

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ กรกฎาคม 2565

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.

- <http://www.fda.moph.go.th/sites/oss/Pages/Main.aspx>
- <http://ndi.fda.moph.go.th/>

**เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร**