

ลืออกโซโพรเฟน
ความแรง 100 มิลลิกรัมต่อแผ่น
ชนิดแผ่นแปะผิวหนัง
ชื่อการค้า Japrox Patch
(จาโปรลอก แพทช์)

1. ยานี้คือยาอะไร

1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้มีชื่อว่า ลืออกโซโพรเฟนโซเดียมไฮเดรต (loxoprofen sodium hydrate) เป็นยากลุ่มต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ยานี้ใช้เพื่อบรรเทาอาการปวดและอาการอักเสบในโรคข้ออักเสบ ปวดกล้ามเนื้อ อาการปวดและบวมภายหลังการบาดเจ็บ

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้
- ห้ามใช้ในผู้ที่มีอาการหอบหืด ลมพิษ หรือโพรงจมูกอักเสบแบบเฉียบพลันจากการแพ้ยาแอสไพริน หรือยากลุ่มต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

แจ้งแพทย์หรือเภสัชกร ถ้ามีภาวะดังต่อไปนี้

- ถ้ามีประวัติเป็นแผลหรือเลือดออกในกระเพาะอาหารและลำไส้
- ถ้าเป็นโรคตับ โรคไต โรคหัวใจ
- ถ้าเป็นโรคผิวหนังอักเสบติดเชื้อ หรือมีผื่น

- หากเป็นผู้ป่วยอายุเกิน 60 ปี
- ถ้ากำลังตั้งท้องหรือให้นมลูก เพราะไม่มีข้อมูลยืนยันความปลอดภัย
- ถ้าใช้ยาอื่นนอกเหนือจากยานี้ เช่น ยารักษาโรคข้ออักเสบ

**“ แจ้งแพทย์หรือเภสัชกร
 ถ้าไม่แน่ใจว่ามีภาวะดังกล่าวหรือไม่ ”**

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกร** เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค
- แปะยา 1 แผ่น วันละ 1 ครั้ง ตรงบริเวณที่อักเสบหรือปวด
- อย่าแปะยานี้** บนผิวหนังที่ผิดปกติ เป็นแผล ulyaแปะยาบนเนื้อเยื่ออ่อน
- วิธีแปะยา** ให้นำแผ่นยาออกจากซอง ดึงเอาแผ่นพลาสติกที่ปิดบนแผ่นแปะออก แล้วปิดบนผิวหนังทันทีโดยใช้ฝ่ามือกดทับแผ่นยาให้ติดแน่นกับผิวหนังประมาณ 30 วินาที เพื่อให้แน่ใจว่าแปะได้แน่นสนิทแล้ว
- หากในช่องยังมีแผ่นยาเหลืออยู่ ให้ปิดซองโดยกดที่ซิปล็อกทั้งสองฝั่งให้แน่น

3.2 ถ้าใช้ยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด เพราะอาจเกิดอาการผิดปกติที่รุนแรงเช่น คลื่นไส้ อาเจียน ปวดไต ลึ้นปี เลือดออกในทางเดินอาหาร ท้องเสีย มึนงง ง่วงนอน มีเสียงอื้อในหู ชัก หมดสติ ให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- อย่าแปะยา แต่ละแผ่นนานเกิน 24 ชั่วโมง
- แผ่นยาที่จะทิ้ง ให้ประกบครึ่งโดยให้ด้านที่มีกาวติดกัน ก่อนนำไปทิ้งในถังขยะที่มีฝาปิด
- หลีกเลี่ยง** การใช้ยานี้ติดต่อกันเป็นเวลานาน เพราะอาจทำให้เลือดออกง่าย หรือเสี่ยงต่อความผิดปกติของหัวใจและหลอดเลือด

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ
 - หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
 - ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีฝ้าตามผิวหนังหรือเลือดออกผิดปกติ
 - ปวดท้องมาก ชัก
 - อ่อนแรงหรือเหนียวผิดปกติ
 - บวมที่แขน ขา มือ ข้อเท้า เท้า
 - ตัวเหลือง ตาเหลือง คลื่นไส้ อาเจียน
 - เจ็บหน้าอกเฉียบพลัน
 - ถ่ายเป็นเลือด ถ่ายดำ อาเจียนเป็นเลือด
- “ ให้หยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที ”**

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์

- ไม่สบายท้อง ปวดท้อง ท้องร่วง
- ปวดหัว ท้องผูก ง่วงซึม

6. ควรเก็บยาได้อย่างไร

- เก็บยาไว้ในภาชนะบรรจุเดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อย่าให้โดนแสงโดยตรง โดยทั่วไปควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

- **ลักษณะยา** แผ่นแปะ ประกอบด้วยส่วนของซีฟิ่ง ซึ่งกระจายตัวอย่างสม่ำเสมอบนพื้นผิวของซีฟิ่งที่ปกคลุมด้วยแผ่นซับใน พื้นผิวของซีฟิ่งมีสีขาวถึงสีเหลืองอ่อน และมีกลิ่นน้ำมันหอมระเหยของมินท์
- **ตัวยาสำคัญ** ลีอกโซโพรเฟน 100 มิลลิกรัม
- **ส่วนประกอบอื่นๆ** ได้แก่ น้ำมันเมนทา, โพลีซอร์เบต 80, ไททาเนียมออกไซด์, กรดทาร์ทาริก, ไดโซเดียม อีดีเตด ไฮเดรต, กลีเซอรินเข้มข้น, คาร์เมโลส โซเดียม, ทัลก์, ทรายดี อะลูมินัม ไฮดรอกไซด์ เจล, โครทามิทัน, พาร์เซ็ลลีส นิวทราไลซ์ โพลีแอสคริเลต, สดาร์ช กราฟเต็ด แอคริเลต 300, อิมัลชันของเมทิล แอคริเลต, 2-เอทิล เฮกซิล แอคริเลต โคโพลิเมอร์

ผู้ผลิต: Lead Chemical Co., Ltd., JAPAN

ผู้นำเข้า/ผู้แทนจำหน่าย: บริษัท ซิลลิด ฟาร์มา จำกัด

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ 22 พฤษภาคม 2563

**เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร**