

อิเซคิซุมแมบ (อิ-เซ-คิ-ด-ซู-แมบ)

80 มิลลิกรัม ต่อ 1 มิลลิลิตร

ชนิดสารละลายสำหรับฉีด
ชื่อทางการค้า คือ ทอลซ์

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อสามัญอะไร

- ยานี้มีชื่อสามัญว่า **อิเซคิซุมแมบ (ixekizumab)**

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

ยานี้ใช้เพื่อรักษาโรคสะเก็ดเงินชนิดผื่นหนาในผู้ใหญ่ที่มีความรุนแรงปานกลางถึงรุนแรงมาก

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- ห้ามใช้** เมื่อเคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้ ได้แก่ โซเดียม ซิเตรท, ซิตริก แอซิด แอนไฮไดรส์, กลีเซอ, โพลีซอร์เบท 80
- ห้ามใช้** เมื่อกำลังมีการติดเชื้อที่สำคัญทางคลินิก เช่น วัณโรคระยะติดต่อ

2.2 โรคหรือสภาวะที่ต้องระมัดระวังและสังเกตอาการในระหว่างการใช้ยา รวมถึงค่าเดือนพิเศษและข้อควรระวังในการใช้ยา


- ไม่ควร** ใช้ยานี้ร่วมกับวัคซีนชนิดเชื้อเป็น
- ไม่ควร** ใช้ยานี้ในหญิงตั้งครรภ์ เพื่อเป็นการป้องกันอันตราย เนื่องจากมีข้อมูลการใช้ยานี้ในหญิงตั้งครรภ์อยู่อย่างจำกัด
- ระมัดระวังการใช้ยานี้** ในคนที่ เป็นโรคติดเชื้อเรื้อรัง
- ระมัดระวังการใช้ยานี้** ในคนที่ เป็นโรคลำไส้อักเสบเรื้อรัง ซึ่งรวมถึง โรคโครห์นและโรคลำไส้ใหญ่อักเสบเป็นแผลเรื้อรัง
- ระมัดระวังการใช้ยานี้** ในคนที่ ได้รับยากดภูมิคุ้มกันอื่นหรือใช้แสงอัลตราไวโอเล็ตเพื่อรักษาโรคสะเก็ดเงิน

- ระมัดระวังการใช้ยานี้** ในคนที่ มีอายุต่ำกว่า 18 ปี เนื่องจากยังไม่มียข้อมูล
- ระมัดระวังการใช้ยานี้** ในหญิงที่ให้นมบุตร เนื่องจากไม่มีข้อมูลยืนยันความปลอดภัย
- หญิงที่สามารถมีบุตรได้ควรใช้วิธีคุมกำเนิดที่มีประสิทธิภาพในระหว่างการรักษาและคุมกำเนิดต่อไปอีกอย่างน้อย 10 สัปดาห์หลังการรักษา

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

ตำแหน่งฉีดยา



- สัปดาห์แรก** ฉีดยา ขนาด 160 มิลลิกรัม (โดยฉีดยาขนาด 80 มิลลิกรัม จำนวนสองเข็ม)
- สัปดาห์ที่ 2, 4, 6, 8, 10 และ 12** ให้ฉีดยาขนาด 80 มิลลิกรัม (หนึ่งเข็ม)

- หลังจากสัปดาห์ที่ 12** ให้ฉีดยาทุก 4 สัปดาห์ ในขนาด 80 มิลลิกรัม (หนึ่งเข็ม) เพื่อควบคุมอาการ
- แพทย์ผู้มีประสบการณ์ในการวินิจฉัยและรักษาโรคสะเก็ดเงินจะเป็นผู้แนะนำระยะเวลาในการใช้ยาและแนะนำเกี่ยวกับการรักษาในระยะยาว
- ควร** ใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือ เภสัชกร เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค

3.2 หากลืมฉีดยาควรทำอย่างไร

- ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร** เมื่อลืมใช้ยานี้

3.3 ถ้าฉีดยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรงให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- ควร** หลีกเลี่ยงการฉีดยาบริเวณผิวหนังที่แสดงอาการของโรคสะเก็ดเงิน

- ควร** เปลี่ยนตำแหน่งที่ฉีดยาไปเรื่อย ๆ
- ห้าม** หยอดยาเอง และให้ใช้ยานี้อย่างต่อเนื่องตามคำแนะนำของแพทย์ หรือเภสัชกร
- พบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตามอาการหรืออันตรายจากยา

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

- การติดเชื้อที่รุนแรง** เช่น มีไข้ เหงื่อออกตอนกลางคืน รู้สึกเหนื่อย หายใจสั้น ไอเรื้อรัง ผื่นแดง ร้อน มีผื่นปวดแสบและพุพอง
- ปฏิกิริยาการแพ้ที่รุนแรง** ได้แก่ หายใจลำบาก กลืนลำบาก หน้าบวม ปากบวม ลิ้นบวม บวมในลำคอ ลมพิษ คันรุนแรง ผื่นแดง เป็นจ้ำ
- บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผื่นหนังหลุดลอก มีจ้ำตามผิวหนัง หรือ เลือดออกผิดปกติ

5.2 อาการที่สามารถใช้ยาต่อได้ แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์

- การติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบน** เช่น มีอาการเจ็บคอ คัดจมูก
- ปฏิกิริยาบริเวณตำแหน่งที่ฉีดยา** เช่น ผื่นแดง และปวด

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บไว้ในภาชนะบรรจุเดิมตามที่ได้รับมา
 - เก็บยานี้ไว้ในตู้เย็น ห้ามเก็บยาในช่องแช่แข็ง
 - เก็บยาในที่แห้ง อย่าให้โดนแสงโดยตรง โดยทั่วไปควรเก็บที่อุณหภูมิ 2 - 8 องศาเซลเซียส ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
 - เก็บยาให้พ้นมือเด็ก
- ผู้นำเข้า
บริษัท อีไล ลิลลี่ เอเชีย อิงค์ (สาขาประเทศไทย)
เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ 22 มกราคม 2561

**เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร**

