

อีโพอีทิน เซต้า

4000 ไออยู , 5000 ไออยู , 6000 ไออยู,
8000 ไออยู, 10 000 ไออยู

ชนิดสารละลายน้ำจุลลดยาพร้อมฉีด
ชื่อการค้า EPO STADA (อีโพ สตาดา)

1. ยานี้คือยาอะไร

1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้มีชื่อว่าอีโพอีทิน เซต้า (epoetin zeta) เป็นยา กลุ่มกระตุนการสร้างเม็ดเลือดแดง

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- รักษาภาวะเลือดจางจากโรคไตเรื้อรัง
- รักษาภาวะเลือดจางในผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับเคมีบำบัด
- เพื่อเตรียมเลือดตัวเองไว้สำหรับการผ่าตัดใหญ่
- รักษาภาวะเลือดจางในผู้ป่วยมีภาวะขาดธาตุเหล็ก ก่อนผ่าตัดกระดูก
- รักษาภาวะเลือดจางในผู้ป่วยภาวะไขกระดูกทำงาน ผิดปกติ

2. ข้อควรรู้ก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เดยแพ้ยาที่นี้ หรือส่วนประกอบของยาที่นี้
- ห้ามใช้ยานี้กับผู้ป่วยที่มีภาวะไขกระดูกไม่สร้างเม็ดเลือดแดง
- ห้ามใช้ยานี้กับผู้ป่วย **ความดันเลือดสูง** ที่ไม่สามารถควบคุมได้
- ห้ามใช้ในผู้ป่วยที่จะผ่าตัดข้อเข่าที่เป็นโรคหัวใจ หรือ โรคหลอดเลือด หรือไม่สามารถใช้ยาต้านการแข็งตัวของเลือดได้
- ห้ามใช้ยานี้กับผู้ป่วยที่มี**โรคเกี่ยวกับหลอดเลือด** ที่ไปเลี้ยงสมอง

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยา

- แจ้งแพทย์ ถ้ากำลัง **ตั้งครรภ์** หรือให้นมบุตร
- แจ้งแพทย์ ถ้าเป็น **โรคความดันเลือดสูง**
- แจ้งแพทย์ ถ้ามีประวัติ **โรคลมชัก**
- แจ้งแพทย์ ถ้ามี **ภาวะตับวายเรื้อรัง**
- แจ้งแพทย์ ถ้ามีการทำงานของ **ไต** บกพร่อง
- แจ้งแพทย์ ถ้ามี **ภาวะหลอดเลือดดีบตัน**
- แจ้งแพทย์ ถ้าเคยใช้ยากระตุนการสร้างเม็ดเลือดมา ก่อน

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือ เกสัชกร เพาะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยาที่เข้มข้นกับชนิด และความรุนแรงของโรค
- แพทย์หรือพยาบาลจะเป็นผู้ฉีดยาให้ท่าน โดยฉีดเข้า ใต้หนัง

3.2 หากลืมฉีดยาควรทำอย่างไร

- รีบไปฉีดยาทันทีที่นึกได้
- ถ้านึกขึ้นได้วันที่จะฉีดยาครั้งถัดไป ให้ข้ามครั้งที่ ลืม และไม่ต้องฉีดยาเพิ่มเป็น 2 เท่า

3.3 ถ้าลืมยาที่เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ถ้าท่านสังสัยว่าฉีดยาเกินขนาด ให้แจ้งแพทย์หรือ พยาบาล

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- ระหว่างการใช้ยาที่ต้องตรวจวัด **ความดันเลือดอย่างสม่ำเสมอ**
- ต้องแจ้งแพทย์ทราบก่อนผ่าตัด ว่าใช้ยาที่อยู่

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้อง **หยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที**

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวนองหลุดลอก มีจ้ำตามผิวนัง หรือเลือดออกผิดปกติ
- มีอาการของลิ่มเลือดอุดตัน เช่น หายใจลำบาก ปวด แน่นหน้าอก ปวดขา แขนขาชาดีเย็น มีนองง พูดลำบาก พูดไม่ชัด

หากเกิดอาการดังกล่าวให้หยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา

- ห้องเสีย คลื่นไส้ อาเจียน
- ความดันโลหิตเพิ่มขึ้นสูง ปวดหัวปวดกระดูกและ กล้ามเนื้อ มีอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่
- ปวด บวม บริเวณที่ฉีดยา

ไม่จำเป็นต้องหยุดยา

แต่ถ้ามีอาการรุนแรง ให้ไปพบแพทย์

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บไว้ในภาชนะบรรจุเดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อย่าให้โดนแสงโดยตรง โดยทั่วไป ควรเก็บในตู้เย็น ที่อุณหภูมิ 2 ถึง 8 องศาเซลเซียส ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว

- ห้ามแช่แข็ง
- เก็บยาให้พันมือเด็ก

ผู้ผลิต: Rovi Contract Manufacturing, Spain
ผู้นำเข้า/ผู้แทนจำหน่าย:

บริษัท สตาดา(ประเทศไทย) จำกัด, กรุงเทพฯ
เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ 10 สิงหาคม 2561

**เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร**

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยา

- ยาเจิดชนิดน้ำใส ไม่มีสี บรรจุในหลอดยาพร้อมเจิด
- ความแรงของยา **EPO STADA 10000 IU/ml**

- ประกอบด้วย

อีโพอีทิน เช็ต้า 4000 ไออยู /0.4 มิลลิลิตร และ
สารประกอบอื่น เฟนิลอลานีน 0.20 มิลลิกรัม
อีโพอีทิน เช็ต้า 5000 ไออยู /0.5 มิลลิลิตร และ
สารประกอบอื่น เฟนิลอลานีน 0.25 มิลลิกรัม
อีโพอีทิน เช็ต้า 6000 ไออยู /0.6 มิลลิลิตร และ
สารประกอบอื่น เฟนิลอลานีน 0.30 มิลลิกรัม
อีโพอีทิน เช็ต้า 8000 ไออยู /0.8 มิลลิลิตร และ
สารประกอบอื่น เฟนิลอลานีน 0.40 มิลลิกรัม
อีโพอีทิน เช็ต้า 10000 ไออยู /1 มิลลิลิตร และ
สารประกอบอื่น เฟนิลอลานีน 0.50 มิลลิกรัม

- ส่วนประกอบอื่นๆ

ไดโซเดียมฟอสเฟตดีไฮเดรต, โซเดียมไฮโดรเจนฟอสเฟตดีไฮเดรต, เกลือแแกง, แคลเซียมคลอไรด์, ดีไฮเดรต, โพลีขอเบท 20, ไกลซีน, ลิวชีน, ไอโซลิวชีน, ทรีโอนชีน, กรดกลูตามิค, เฟนิลอลานีน, น้ำกลั่น สำหรับเจิด และ สารปรับความเป็นกรดด่าง คือ โซเดียมไฮดรอกไซด์ และ กรดเกลือ

ผู้ผลิต: Rovi Contract Manufacturing, Spain

ผู้นำเข้า/ผู้แทนจำหน่าย:

บริษัท สตาดา(ประเทศไทย) จำกัด, กรุงเทพฯ
เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ 16 ตุลาคม 2562

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้นักเรียนแพทย์หรือเภสัชกร