

สารสกัดจากไรฝุ่นบ้าน
ความแรง 12 SQ-HDM
ชนิดเม็ดอมใต้ลิ้น
ชื่อการค้า ACARIZAX® (อะคาริแซกซ์)

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยาคืออะไร

- ยานี้คือ สารสกัดจากไรฝุ่นบ้าน 2 ชนิดรวมกัน

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- รักษาโรคหอบหืด และ โรคเยื่อโพรงจมูกอักเสบ ที่มีสาเหตุจากการแพ้ไรฝุ่นบ้าน

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้
- หอบหืดกำเริบรุนแรงในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา
- มีโรคเกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกันผิดปกติ หรือ โรคเมะเร็ง
- กำลังใช้ยาที่ส่งผลกระทบต่อภูมิคุ้มกัน
- เพิ่งถอนฟัน ผ่าตัดในช่องปาก มีแผลหรือติดเชื้อในช่องปาก

2.2 เพื่อความปลอดภัย ให้บอกแพทย์หากท่านมีภาวะต่อไปนี้

- ใช้ยา สมุนไพร อาหารเสริมอื่นอยู่
- กำลังใช้ยาในการรักษาโรคซึมเศร้า หรือ โรคเส้นพาร์กินสัน
- แพ้เนื้อปลา หรืออาหารที่มีเนื้อปลาเป็นส่วนประกอบ
- ตั้งครรภ์หรือกำลังให้นมทารก
- เคยมีอาการแพ้รุนแรงหลังได้รับการฉีดสารก่อภูมิแพ้ของไรฝุ่นบ้าน

“สอบถามแพทย์หรือเภสัชกร

ถ้าไม่แน่ใจว่ามีภาวะดังกล่าวหรือไม่”

3. วิธีใช้ยา

3.1 ใช้ยานี้อย่างไร

- ใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกร หรือตามฉลากยาที่ได้รับจากโรงพยาบาล
- อมยาใต้ลิ้น ห้ามกลืนอย่างน้อย 1 นาที
- ห้ามกินหรือดื่มอะไร 5 นาทีหลังใช้ยา

ดูภาพประกอบการใช้ยาใต้ลิ้นด้านหลังเอกสาร

3.2 หากลืมใช้ยาควรทำอย่างไร

- ใช้ยาที่ลืมทันทีที่นึกขึ้นได้ แต่หากใกล้เวลาที่ต้องกินอีกครั้งไม่ต้องใช้ยาที่ลืม แล้วใช้ต่อไปตามปกติ
- ห้ามใช้ยาเพิ่มเพื่อชดเชย เพราะยาอาจเกินขนาด
- ลืมใช้ยาเกิน 7 วัน ให้ติดต่อแพทย์ก่อนกลับมาใช้ยา

3.3 ถ้าใช้ยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด และรีบไปโรงพยาบาลพร้อมยานี้หรือบรรจุภัณฑ์ทันทีหากมีอาการผิดปกติที่ช่องปากหรือลำคอ

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยานี้

- ไม่นำยานี้ให้ผู้อื่นใช้ แม้ว่าจะมีโรคหรืออาการเดียวกัน
- ไม่หยุดยาหรือปรับขนาดยาเอง ใช้ยานี้อย่างต่อเนื่องตามคำแนะนำของแพทย์
- พบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตามผลการรักษาและผลจากการใช้ยา
- แจ้งแพทย์หรือทันตแพทย์ว่ากำลังใช้ยานี้ หากต้องเข้ารับการถอนฟัน หรือผ่าตัดในช่องปาก
- สังเกตอาการผิดปกติที่เกิด หากมีอาการผิดปกติให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร เนื่องจากบางอาการอาจไม่ถูกระบุหรือรายงานมาก่อน

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วไปพบแพทย์ทันที

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีไข้
- อาการหอบหืดกำเริบรุนแรง หรือ แยกฝังผิดปกติ

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์ทันที

- คันในช่องคอ ปาก ลิ้น หรือ หู
- แสบร้อน บวมแดง รู้สึกชาหรือเหมือนมีเข็มทิ่ม ที่ ริมฝีปาก หรือ ในปากและคอ
- เสียงแหบ ปากแห้ง กลืนลำบาก การรับรส เปลี่ยนไป น้ำลายหลังเยาะผิดปกติ
- ต่อมทอลซิล ต่อม้ำลาย บวมโต
- ตาอักเสบ คันตา
- คัดจมูก น้ำมูกไหล จาม หอบหืด
- ปวดท้อง ไม่สบายท้อง อาหารไม่ย่อย แสบร้อนกลางอก ท้องเสีย
- ไม่สบายตัว เวียนหัว คลื่นไส้ อาเจียน
- เหนื่อยง่าย แน่นหน้าอก ใจเต้นผิดปกติ
- ผิวหนังแดง รู้สึกเหมือนมีอะไรทิ่มที่ผิวหนัง

“ไม่ต้องหยุดยา


แต่ถ้าอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์”

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร


- เก็บไว้ในภาชนะบรรจุเดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง ปล่อยให้โดนแสงโดยตรง ควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส ไม่ควรเก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

ภาพประกอบการแกะเม็ดยาจากแผง และการใช้ยา


เช็ดมือให้แห้งก่อนหยิบยา และแกะเม็ดยาตามรูป




1. ฉีกแผงยาตามลูกศรสามเหลี่ยมด้านบนสุด




2. ฉีกแผงยาตามรอยประ



3. ดึงฟอยล์ยาออกตามลูกศร



4. นำเม็ดยาออกมาจากแผงยาอย่างระมัดระวังและ
ใช้ยาในทันที



5. วางเม็ดยาที่ใต้ลิ้น ปล่อยให้เม็ดยาอยู่ใต้ลิ้น
จนกว่าจะละลายหายไป ห้ามกลืนน้ำลายอย่าง
น้อย 1 นาทีหลังยาละลาย ห้ามกินหรือดื่ม
อะไร 5 นาทีหลังใช้ยา

นำเข้าโดยบริษัท แอ็บบอด ลาบอแรตอริส จำกัด
เลขที่ 1 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ชั้น 30 และ ชั้น 33
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร

ห้ามออกแรงดันให้ยาทะลุออกมาจะทำให้ยาแตก
เสียรูป

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ 13 มีนาคม 2562