

## โรสุวาสแททิน

10 และ 20 มิลลิกรัม

ชนิดเม็ด

ชื่อการค้า Alvostat (อัลโวสแตท)

### 1. ยานี้คืออะไร

#### 1.1 ยานี้มีชื่อสามัญว่าอะไร

ยานี้มีชื่อสามัญว่า โรสุวาสแททิน (rosuvastatin)

#### 1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

ยานี้ใช้ร่วมกับการควบคุมอาหารและออกกำลังกายเพื่อ

- ไขมันในเลือด
- ใช้ป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ

### 2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

#### 2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- ห้ามใช้เมื่อเคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบอื่นในยานี้
- ห้ามใช้ถ้ากำลังตั้งท้องหรือให้นมลูกอยู่
- ห้ามใช้ในผู้ป่วยโรคตับ โรคไต หรือผู้ที่มีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อรุนแรง

#### 2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้ หากท่านมีภาวะต่อไปนี้

- ควรระวังในผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจล้มเหลว
- ควรระวังในผู้สูงอายุตั้งแต่ 65 ปี หรือมากกว่า
- ควรระวังในผู้ที่กำลังใช้ยาดังต่อไปนี้อยู่ เพราะอาจเสี่ยงเกิดพิษต่อกล้ามเนื้อ ได้แก่ ยาลดไขมันกลุ่มไฟเบรต ยาต้านเชื้อไวรัสเอดส์ หรือยาด้านแบคทีเรียฟูซิดิก เอซิด

### 3. วิธีใช้ยา

**3.1 ขนาดและวิธีใช้ ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกร** เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นกับความรุนแรงของโรค

- ขนาดยาทั่วไป คือ เริ่มกินวันละ 5 – 10 มิลลิกรัม และขนาดยาสูงสุดไม่ควรเกินวันละ 40 มิลลิกรัม

- กินยานี้วันละครั้ง ก่อนหรือหลังอาหารก็ได้ โดยควรกินให้เป็นเวลาเดียวกันจะได้ไม่ลืมกินยา

#### 3.2 หากลืมกินยาควรทำอย่างไร

- หากลืมกินยาให้กินทันทีที่นึกได้ แต่ถ้าใกล้ถึงเวลากินยาของมื้อถัดไป ให้ออกไปกินมื้อถัดไปเลย และห้ามเพิ่มยาเป็น 2 เท่า

#### 3.3 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรง ให้นำส่งโรงพยาบาลทันที

### 4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- หากตั้งท้องระหว่างใช้ยานี้ ให้หยุดยาทันทีแล้วรีบแจ้งแพทย์
- หากมีปัญหาเกี่ยวกับตับหรือไต ต้มเหล้าหรือเบียร์เป็นประจำ ไม่ควรกินยานี้เกินวันละ 40 มิลลิกรัม
- ควรแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทุกครั้งหากกินยาตัวอื่น อาหารเสริม หรือสมุนไพรร่วมด้วย
- ควรกินยาอย่างสม่ำเสมอตามขนาดยาที่แพทย์หรือเภสัชกรแนะนำ ไม่ควรเพิ่มหรือลดขนาดยาเอง
- ควรไปพบแพทย์ตามนัดทุกครั้ง เพื่อติดตามผลการรักษา ติดตามการเกิดพิษของยาและตรวจวัดระดับไขมันหรือน้ำตาลในเลือด
- หากกินยานี้แล้ววงงนอน วิงเวียน ควรหลีกเลี่ยงการขับรถหรือใช้เครื่องจักรกล

### 5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

#### 5.1 อาการที่ต้องรีบไปพบแพทย์ทันที ได้แก่

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีจุดตามผิวหนังหรือเลือดออกผิดปกติ
- เกิดอาการพิษต่อกล้ามเนื้อ ได้แก่ ปวดเมื่อยตามตัวหรือกล้ามเนื้อ ปวดตามข้อต่างๆ ปวดแขนหรือขาและอ่อนแรง
- ปวดท้องอย่างรุนแรง ท้องเสีย มีมีเลือดปน
- ตัวเหลืองหรือตาเหลือง

#### 5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องไปพบแพทย์ แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์ทันที ได้แก่

- ปวดหัว ท้องผูก นอนไม่หลับ ผื่นร้าย

### 6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บไว้ในภาชนะบรรจุเดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อบอุ่นโดยตรง โดยทั่วไปควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

### 7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

- อัลโวสแตท 10 มิลลิกรัม เป็นเม็ดกลม นูน ทั้งสองด้าน เคลือบฟิล์ม สีเหลืองอ่อน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 7.0 มิลลิเมตร ด้านหนึ่งมีตัวเลข "10" และอีกด้านหนึ่งมีตัวเลข "15"
- อัลโวสแตท 20 มิลลิกรัม เป็นเม็ดกลม นูน ทั้งสองด้าน เคลือบฟิล์ม สีเหลืองอ่อน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 9.0 มิลลิเมตร ด้านหนึ่งมีตัวเลข "20" และอีกด้านหนึ่งมีตัวเลข "15"

ผลิตโดย : Zaklad Farmaceutyczny Adamed Pharma, Poland.

แบ่งบรรจุโดย : Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A., Poland.

ผู้นำเข้า/ผู้แทนจำหน่าย :

บริษัท อัลโวเจน (ประเทศไทย) จำกัด กรุงเทพฯ เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ 6 กุมภาพันธ์ 2563

**เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ  
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร**