

เมตริกซ์โพเรสเทอโรน

- **ความแรง 150 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร**
หลอดฉีดสำเร็จบรรจุยาแขวนตะกอน
ปราศจากเชื้อสำหรับฉีดเข้ากล้ามเนื้อ
ชื่อการค้า Medwin (เมดวิน)

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อสามัญว่าอะไร

ยานี้มีชื่อสามัญว่า เมตริกซ์โพเรสเทอโรน เป็นยาในกลุ่มฮอร์โมนโปรเจสทิน

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ใช้สำหรับการคุมกำเนิดในระยะสั้น และระยะยาว สำหรับผู้หญิงในวัยผู้ใหญ่ที่ต้องการคุมกำเนิด โดยมีรายละเอียดการใช้ดังนี้
- **ในระยะสั้น**
 - ในผู้หญิงที่มีคู่เป็นชาย ซึ่งอยู่ในระหว่างการผ่าตัด ทำหมันด้วยการผูกท่ออสุจิ
 - ในผู้หญิงที่อยู่ในระหว่างการได้รับวัคซีนป้องกันโรคหัดเยอรมัน
 - ในผู้หญิงที่รอการทำหมัน
- **ในระยะยาว**
ใช้สำหรับฉีดเข้ากล้ามเนื้อเพื่อคุมกำเนิดระยะยาว โดยฉีดในช่วง 5 วันแรกของการมีประจำเดือน และฉีดครั้งต่อไปทุก ๆ 12 สัปดาห์

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไหร่

- เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้
- ระหว่างตั้งครรภ์
- มีก้อนเนื้อร้ายที่ทรวงอกและอวัยวะเพศที่เกิดเนื่องมาจากฮอร์โมน
- มีโรคตับอย่างรุนแรง
- มีเลือดออกในมดลูกอย่างผิดปกติ
- ระหว่างให้นมบุตรหลังคลอด 6 สัปดาห์

ยานี้อาจทำให้เกิดอันตรายร้ายแรงได้
ต้องใช้ภายใต้การควบคุมของแพทย์เท่านั้น

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

- แจ้งแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยานี้ หากท่านอยู่ในกลุ่มต่อไปนี้
- ไม่เกรน โรคตับ เบาหวาน ครรภ์ไข่ปลาอุก
- ภาวะหลอดเลือดดำอุดตัน โรคหัวใจและหลอดเลือด
- ภาวะซึมเศร้า เบื่ออาหาร โรคบุลิเมีย
- ผู้หญิงที่วางแผนตั้งครรภ์ กำลังตั้งครรภ์ ให้นมบุตร
- ใช้ยาต้านการแข็งตัวของเลือด ยาแก้อักเสบ ยาคอร์ติโคสเตียรอยด์
- ประวัติครอบครัวของภาวะกระดูกพรุน
- เคยมีภาวะกระดูกเปราะบางมาก่อน
- ดื่มแอลกอฮอล์ สุกนุหรี่

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์ เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยาเหล่านี้จะมีผลต่อประสิทธิภาพของการคุมกำเนิด
- บุคลากรทางการแพทย์จะเป็นผู้เตรียมยาและให้ยากับท่านโดยการฉีดเข้าทางกล้ามเนื้อ

3.2 หากว่าลืมฉีดยา ยาควรทำอย่างไร

- แจ้งแพทย์ พยาบาล หรือเภสัชกร หากท่านลืมรับยา หรือไม่ได้ไปพบแพทย์ตามนัดหมาย

3.3 หากฉีดยาเกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิดหากมีอาการผิดปกติ ให้แจ้งแพทย์ หรือพยาบาลทันที

4. ข้อควรปฏิบัติหลังจากฉีดยา

- พบแพทย์ตามนัดทุกครั้งอย่างสม่ำเสมอเพื่อติดตามผลการรักษาหรืออันตรายจากยา
- ระมัดระวังการขับชีเยนยนต์หรือทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกล

ข้อมูลยานี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

5. อันตรายจากยา

5.1 อาการที่ต้องแจ้งแพทย์ พยาบาล หรือเภสัชกรทันที

- ลมพิษ บวมที่ใบหน้า เปลือกตาริมฝีปาก
 - หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
 - ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีจุดตามผิวหนังหรือเลือดออกผิดปกติ
 - เมื่อพบว่าตั้งครรภ์ ขณะใช้ยา
- “หากมีอาการเหล่านี้ ให้แจ้งแพทย์ พยาบาล หรือเภสัชกรทันที”**

5.2 อาการที่อาจเกิดขึ้นได้และให้รอดูอาการ แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้แจ้งแพทย์ เภสัชกร หรือพยาบาล

- ผม่วรง ลิว มีผื่น เบื่ออาหาร คลื่นไส้ น้ำหนักเพิ่มน้ำหนักลด ประจำเดือนไม่ปกติ มีระดูมาก หรือ กะปริบกะปรอยปวดท้อง ปวดหลัง มีผื่นบริเวณที่ฉีด

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บไว้ในภาชนะบรรจุเดิมตามที่ได้รับมา
- ควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส
- ห้ามแช่แข็ง

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

- หลอดฉีดสำเร็จบรรจุยาแขวนตะกอน
- ตัวยาสำคัญ เมตริกซ์โพเรสเทอโรน อะซีเตต
- ส่วนประกอบอื่น ๆ ได้แก่ แมคโครกอล โพลีซอร์เบต โซเดียมคลอไรด์ เมทิลพาราไฮดรอกซีเบนโซเอท โพรพิลพาราไฮดรอกซีเบนโซเอท โซเดียมไฮดรอกไซด์ ไฮโดรคลอริกแอซิด และ น้ำสำหรับฉีด

ผู้ผลิต: Eugia Pharma Specialities Limited, Survey No. 550, 551 & 552, Kolthur Village, Shameerpet Mandal, Medchal-Malkajgiri District, Telangana, India.

ผู้นำเข้า/ผู้แทนจำหน่าย: บริษัท เอพีแอล ฟาร์มา ไทย เลขที่ 438 ซอยพัฒนาการ 30 ถ. พัฒนาการ สวนหลวง กรุงเทพฯ

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ 12 ธันวาคม 2565
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.

- <http://www.fda.moph.go.th/sites/oss/Pages/Main.aspx>
- <http://ndi.fda.moph.go.th/>