

เซลเพอร์คาทีนิบ
ความแรง 40 และ 80 มิลลิกรัม
ชนิดแคปซูล
ชื่อการค้า
Tanstrive 40 mg (แทนสไตรฟี่ 40 มก.)
Tanstrive 80 mg (แทนสไตรฟี่ 80 มก.)

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้มีชื่อว่า เซล-เพอ-คา-ที-นิบ (selpercatinib) เป็นยาในกลุ่มรักษามะเร็ง

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ยานี้ใช้รักษาโรคมะเร็งปอดบางชนิดในผู้ป่วยผู้ใหญ่
- ยานี้ใช้รักษาโรคมะเร็งต่อมไทรอยด์บางชนิดในผู้ป่วยผู้ใหญ่และเด็กอายุมากกว่า 12 ปี

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

- ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร ในกรณีต่อไปนี้
 - ปอดอักเสบ พังผืดที่ปอด
 - ตับทำงานผิดปกติ
 - ความดันเลือดสูง
 - มีภาวะเลือดออก
 - คลื่นไฟฟ้าหัวใจผิดปกติ
 - มีประวัติเลือดออกผิดปกติ
 - วางแผนจะมีลูก กำลังตั้งครรภ์หรือให้นมลูก
 - กำลังใช้ยา สมุนไพร หรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอื่นร่วมด้วย

หากท่านไม่แน่ใจว่ามีภาวะหรือกินยาโดยอยู่โปรดแจ้งแพทย์หรือเภสัชกร”

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือ เภสัชกร เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค
- กินยาทั้งแคปซูล** ห้ามเคี้ยว บด หัก หรือแกะแคปซูล
- กินยานี้ก่อนหรือหลังอาหารก็ได้
- กรณีที่กินยายับยั้งการหลั่งกรดด้วย ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรเพื่อปรับเปลี่ยนวิธีใช้ยานี้
- ถ้ากินยาแล้วอาเจียน ไม่ต้องตกใจ ให้รอกินยาเมื่อต่อไปตามปกติ

3.2 หากลืมกินยาควรทำอย่างไร

- ให้ข้ามมื้อที่ลืม แล้วรอกินยาของมื้อต่อไป ห้ามกินยาเพิ่มเป็นสองเท่า

3.3 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรงให้นำส่งโรงพยาบาลทันที

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- พบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตามผลการรักษาหรืออันตรายจากยา
- ห้ามหยุดยาเอง และให้กินยาน้อยอย่างต่อเนื่องตามคำแนะนำของแพทย์ หรือเภสัชกร
- ผู้หญิง** จะต้องคุมกำเนิดด้วยวิธีที่แพทย์แนะนำ ตลอดช่วงที่ใช้ยานี้ จนกว่าจะหยุดใช้ยานี้ไปแล้วอย่างน้อย 1 สัปดาห์
- หากพบว่าตั้งท้องต้องแจ้งแพทย์ทันที
- ผู้ชาย** จะต้องคุมกำเนิดด้วยการสวมถุงยางอนามัย ทุกครั้งเมื่อมีเพศสัมพันธ์ตลอดช่วงที่ใช้ยานี้จนกว่าจะหยุดใช้ยานี้ไปแล้วอย่างน้อย 1 สัปดาห์
- ไม่ควรให้นมลูก** ระหว่างใช้ยานี้ ต้องหยุดกินยานี้อย่างน้อย 1 สัปดาห์ จึงจะให้นมได้อีกครั้ง

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยา แล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

- ลมพิษ บวมที่ใบหน้า เปลือกตาริมฝีปาก
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก ใจสั่น
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดออก
- มีจ้ำตามผิวหนัง เลือดออกผิดปกติ ไอเป็นเลือด
- ตัวเหลือง ตาเหลือง เบื่ออาหาร ปัสสาวะสีเข้ม
- น้ำหนักตัวเพิ่มร่วมกับแขนขาบวม ปัสสาวะไม่ออก
- มีไข้ ร่วมกับปวดข้อปวดกล้ามเนื้อ

“ให้หยุดยา แล้วรีบไปพบแพทย์ทันที”

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่มีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์

- ท้องผูก ปวดท้อง ท้องเสีย คลื่นไส้ อาเจียน
- ปากแห้ง เหนื่อยเพลีย
- ปวดหัว เวียนหัว

“ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่มีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์”

6. ควรเก็บยาน้อย่างไร

- เก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อบอุ่นโดยแสงโดยตรง โดยทั่วไป ควรเก็บที่อุณหภูมิห้องไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส
- ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบยาเม็ด

- **ลักษณะยา**

แท็บเล็ต 40 มก.: ใน 1 กล่อง ประกอบด้วยแผง
ยาบรรจุแคปซูลทึบแสง สีเทา พิมพ์ข้อความ
"Lilly", "3977" และ "40 mg" ด้วยหมึกสีดำ
แท็บเล็ต 80 มก.: ใน 1 กล่อง ประกอบด้วยแผง
ยาบรรจุแคปซูลทึบแสง สีฟ้า พิมพ์ข้อความ "Lilly",
"2980" และ "80 mg" ด้วยหมึกสีดำ

- **ตัวยาสำคัญ** เซลเพอร์คาทีนีน

- **ส่วนประกอบอื่นๆ** ได้แก่ ไมโครคริสตัลไลน์
เซลลูโลส, คอลลอยด์ดอลซิลิคอนแอนไฮดรัส,
เจลาติน, ไทเทเนียมไดออกไซด์, สีผสมอาหาร
ผู้ผลิต Lilly del caribe, Inc., ประเทศสหรัฐอเมริกา
ผู้นำเข้าและผู้แทนจำหน่าย บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา
จำกัด ประเทศไทย

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุด **14 พฤษภาคม 2567**

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย

- https://ndi.fda.moph.go.th/drug_info

**เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร**

**ยานี้อาจทำให้เกิดอันตรายร้ายแรงได้
ต้องใช้ภายใต้การควบคุมของแพทย์เท่านั้น**