

มีเจสทรอล

ความแรง 40 มิลลิกรัม ต่อ มิลลิลิตร
ยาน้ำแขวนตะกอนชนิดกิน
ชื่อการค้า GIGA (ไจก้า)

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้มีชื่อว่า มี-เจส-ทรอล-อะ-ซี-เทต (megestrol acetate) มีตัวยา 40 มิลลิกรัม ต่อ มิลลิลิตร เป็นยาในกลุ่มฮอร์โมนโปรเจสเทอโรน

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ยานี้ใช้เพื่อรักษาอาการเบื่ออาหาร น้ำหนักลดผิดปกติ ผอมหนังหุ้มกระดูกในผู้ป่วยโรคเอดส์หรือโรคมะเร็ง

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้
- ห้ามใช้ในสตรีมีครรภ์** หรือวางแผนจะตั้งครรภ์ เพราะอาจทำให้เกิดอันตรายร้ายแรงต่อทารก
- ห้ามใช้ในผู้ป่วยที่มีภาวะลิ้มเลือดอุดตันหลอดเลือด

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร ในกรณีต่อไปนี้

- มีประวัติภาวะลิ้มเลือดอุดตันหลอดเลือด
- การทำงานของตับหรือไตมีปัญหาและในผู้สูงอายุ
- หญิงให้นมบุตร **เพราะ**อาจเกิดอันตรายต่อทารก
- ไม่ควรใช้ยานี้ร่วมกับยา สมุนไพร ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบางชนิด **เพราะ**อาจมีผลต่อการรักษา หรือเกิดอันตรายได้

**เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อแพทย์หรือเภสัชกร**

3. วิธีการใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกร เท่านั้น เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค
- ควรเขย่าขวดก่อนกิน

3.2 หากลืมกินยาควรทำอย่างไร

ถ้านึกขึ้นได้ภายใน 2-3 ชั่วโมง ให้กินยาทันที แต่ถ้าใกล้เวลาของยามื้อต่อไป ให้รอกินยาของมื้อต่อไป ห้ามกินยาเพิ่มเป็น 2 เท่า

3.3 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรง (เช่น การทรงตัวผิดปกติ กระสับกระส่าย) **ให้รีบ** นำส่งโรงพยาบาลทันที

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- พบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอ **เพื่อติดตาม** ผลการรักษาหรืออันตรายจากยา
- ผู้หญิงควรคุมกำเนิดระหว่างใช้ยานี้
- หากระหว่างใช้ยาแล้วสงสัยว่าตั้งครรภ์ ควรรีบปรึกษาแพทย์ เพราะอาจทำให้เกิดอันตรายร้ายแรงต่อทารก
- หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ และเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

- ลมพิษ บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผื่นหนังหลุดลอก มีจุดตามผิวหนังหรือเลือดออกผิดปกติ
- เส้นเลือดดำอักเสบ ไอมีเลือดปน
- มีอาการเหน็บชา เจ็บตามมือและเท้า
- การมองเห็นผิดปกติ พุดลำบาก

“ให้หยุดยา แล้วรีบไปพบแพทย์ทันที”

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์

- คลื่นไส้ อาเจียน ท้องร่วง ท้องผูก ท้องอืด
- ร้อนวูบวาบ มีเลือดประจำเดือนออกกะปริบกะปรอย
- สมรรถภาพทางเพศลดลง
- ปวดหัว มึนหัว

**“ไม่จำเป็นต้องหยุดยา
แต่ถ้ามีอาการรุนแรงควรไปพบแพทย์”**

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บยาไว้ในภาชนะเดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อบอุ่นโดยตรง โดยทั่วไป ควรเก็บที่อุณหภูมิห้อง ไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- หลังจากใช้ยาทุกครั้ง ให้ปิดฝาภาชนะให้สนิท
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

- ลักษณะยา** สารละลายแขวนตะกอน สีขาวถึงสีเหลืองอ่อน
- ตัวยาสำคัญ** มีเจสทรอลอะซีเทต
- ส่วนประกอบอื่น ๆ** ได้แก่ โพลีออกซิล 35 คาสเตอร์ออยล์, พอลิซอร์เบต 80, กลีเซอริน, ซอร์บิทอล ลิควิด 70%, ซัณฑิสกร, โซเดียมเบนโซเอต, ซีทริก แอซิด แอนไฮไดรต, คอลลอยด์ซิลิโคนไดออกไซด์, โซเมทิโคน, กลิ่นกล้วย และน้ำ

ผู้ผลิต Winston Medical Supply Co., Ltd.
No. 117, Ren Ai St., Yongkong Dist., Tainan City,
Taiwan R.O.C.

ผู้นำเข้า/ผู้แทนจำหน่าย
บริษัท อเมริกัน ใต้หวัน ไบโอฟาร์ม จำกัด
เลขที่ 1 อาคารอีสท์วอเตอร์ ชั้นที่ 16
ซอยวิภาวดีรังสิต 5 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กทม. 10900
เอกสารนี้ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 20 พฤศจิกายน 2562