

**ยูริพริสทอล**  
**5 มิลลิกรัม**  
**ชนิดเม็ด**  
**Esmya (แอสเมียร์)**

**1. ยานี้คืออะไร**

**1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร**

- ยานี้มีชื่อว่า ยู-ริ-พริส-ทอล อะ-ซี-เดท (Ulipristal acetate) เป็นยาในกลุ่มฮอร์โมนเพศ

**1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร**

- ยานี้ใช้เพื่อรักษาอาการที่เกิดจากเนื้องอกในมดลูก ในสตรีวัยก่อนหมดประจำเดือน โดยมีอาการเช่น มีเลือดประจำเดือนออกมาก รู้สึกปวดท้องบริเวณอุ้งเชิงกราน

**2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา**

**2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร**

- เมื่อเคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้
- เป็นโรคตับหรือมีภาวะตับผิดปกติ
- เมื่อตั้งครรภ์ วางแผนจะตั้งครรภ์ หรืออยู่ในระยะให้นมบุตร เพราะทำให้เกิดอันตรายร้ายแรงต่อทารก
- มีเลือดออกทางช่องคลอดผิดปกติที่ไม่ได้มีสาเหตุจากเนื้องอกในมดลูก
- เป็นมะเร็งมดลูก มะเร็งปากมดลูก มะเร็งรังไข่ หรือมะเร็งเต้านม

**2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้ หากท่านมีภาวะต่อไปนี้**

- หากท่านเป็นโรคไต หรือโรคหอบหืด
- ไม่ควรใช้ยานี้ในเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี เพราะยังไม่มีการศึกษายืนยันความปลอดภัย
- ไม่ควรใช้ยานี้ร่วมกับยา สมุนไพร หรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบางชนิดเพราะอาจมีผลต่อการรักษา หรือเกิดอันตรายได้เช่น ยาขับยัก ยาชาเขี้ยวบางชนิด ยาคุมกำเนิด และยาอื่น ๆ อีกหลายชนิด

**3. วิธีใช้ยา**

**3.1 ขนาดและวิธีใช้ ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือ เภสัชกร** เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค

- **ควรเริ่มกินยานี้ทันที** ภายในเวลาไม่เกิน 7 วัน นับจากวันแรกที่มีเลือดประจำเดือนออกมา
- หลังจากนั้นกินยาให้ต่อเนื่องตามขนาดและระยะเวลาที่แพทย์กำหนด

**3.2 หากลืมกินยาควรทำอย่างไร**

- กินยาทันทีที่นึกได้ แต่ถ้าลืมเกิน 12 ชั่วโมงให้รอ กินยาของมื้อต่อไป ห้ามกินยาเพิ่มเป็น 2 เท่า

**3.3 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร**

- ให้สังเกตอาการ หากมีอาการผิดปกติให้รีบไปพบแพทย์

**4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา**

- **คุมกำเนิดระหว่างใช้ยานี้** โดยแนะนำให้ใช้ถุงยางอนามัย
- **ห้ามใช้ยาคุมกำเนิด** ชนิดฮอร์โมน เช่น ยาคุมกำเนิดชนิดเม็ดกิน ยาคุมกำเนิดชนิดฝังใต้ผิวหนัง
- **ห้ามให้นมบุตร** ระหว่างใช้ยานี้ เนื่องจากยานี้สามารถผ่านเข้าไปในน้ำนมได้
- หลังเริ่มกินยานี้ ไม่เกิน 10 วัน เลือดประจำเดือนจะมีน้อยลงหรือไม่มีเลย ถ้าหากยังมีเลือดประจำเดือนออกมาก ควรแจ้งให้แพทย์ทราบ
- พบแพทย์ตามนัด เพื่อติดตามผลการรักษาและตรวจการทำงานของตับเพราะยาอาจทำให้ตับอักเสบ
- ยานี้อาจทำให้มีมึนงง ระมัดระวังการขับขี่ยานยนต์หรือทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกล หรือทำงานที่เสี่ยงต่อการพลัดตกจากที่สูง

**5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา**

**5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที**

- ลมพิษ บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีจ้ำตามผิวหนัง หรือเลือดออกผิดปกติ
- **อาการตับอักเสบ** เช่น คลื่นไส้ อาเจียน เหนื่อยง่าย ตัวเหลือง ตาเหลือง ปัสสาวะสีเข้มผิดปกติ ปวดท้อง

**“เป็นอาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที”**

**5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์ทันที**

- เต้านมคัดตึง ปวดท้องน้อย ร้อนวูบวาบ
- ปวดหัว เวียนหัว อ่อนเพลีย
- ปวดกล้ามเนื้อ ปวดกระดูก ปวดหลัง
- กลั้นปัสสาวะไม่อยู่ ปัสสาวะไหลเอง
- ปากแห้ง ผิวแห้ง มีเหงื่อมาก
- เป็นสิ่ว ผอมลงมากกว่าปกติ น้ำหนักตัวเพิ่ม

**“เป็นอาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์”**

**6. ควรเก็บยานี้อย่างไร**

- เก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อบอุ่น โดยตรง โดยทั่วไป ควรเก็บที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

ผู้นำเข้า บริษัท ซิลลิด ฟาร์มา จำกัด

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ 20 พฤศจิกายน 2561

**เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ  
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร**